

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 01/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 07 - MÉDICO I (Medicina Ocupacional)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 01/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 07

##### MÉDICO I (Medicina Ocupacional)

01.	D	11.	E	21.	C	31.	E
02.	E	12.	B	22.	B	32.	A
03.	B	13.	C	23.	C	33.	B
04.	C	14.	B	24.	A	34.	D
05.	A	15.	A	25.	C	35.	D
06.	C	16.	C	26.	D	36.	A
07.	E	17.	ANULADA	27.	A	37.	E
08.	D	18.	B	28.	C	38.	A
09.	B	19.	C	29.	B	39.	B
10.	C	20.	E	30.	E	40.	A



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS



# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar banheiros nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.7 do Edital de Abertura).
- 11 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** A coexistência de anormalidades metabólicas e vasculares, constituindo uma síndrome, é reconhecida há muitos anos.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta fator de risco para o desenvolvimento da Síndrome Metabólica.

- (A) Fatores demográficos.
- (B) Hereditariedade.
- (C) Baixo peso ao nascer.
- (D) Enxaqueca crônica.
- (E) Estilo de vida sedentário.

**02.** Considere as afirmações abaixo sobre as Dislipidemias.

I - O nível elevado do colesterol LDL, geralmente assintomático, pode contribuir para a progressão mais rápida da aterosclerose.

II - A redução do colesterol total e da fração LDL tem maior impacto por meio da farmacoterapia.

III- A revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados evidencia que o uso de estatinas, por cerca de cinco anos, reduz a mortalidade total em cerca de 23%.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**03.** A hipertensão arterial sistêmica é responsável por aproximadamente \_\_\_\_\_ da etiologia multifatorial da cardiopatia isquêmica e por \_\_\_\_\_ da etiologia dos acidentes vasculares cerebrais, sendo a causa da cardiopatia hipertensiva. É causa também de insuficiência cardíaca. O acometimento isquêmico e as alterações glomerulares diretas tornam a hipertensão arterial sistêmica uma das causas mais \_\_\_\_\_ de insuficiência renal crônica. Valores de \_\_\_\_\_ para a pressão sistólica e de \_\_\_\_\_ para a diastólica, identificados nos estudos isolados como pontos de aumento de risco, repercutem mais acentuadamente, pois já partem de riscos anteriores mais acentuados.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 25% – 15% – raras – 140 a 160 mmHg – 90 mmHg
- (B) 25% – 40% – frequentes – 140 a 160 mmHg – 90 mmHg
- (C) 75% – 15% – frequentes – 160 a 180 mmHg – 100 mmHg
- (D) 75% – 40% – frequentes – 140 a 160 mmHg – 90 mmHg
- (E) 25% – 40% – raras – 160 a 180 mmHg – 100 mmHg

**04.** Quais são os exames que fazem parte de uma rotina mínima indicada na avaliação de pacientes hipertensos, com o intuito de rastrear indicadores de hipertensão secundária e avaliar danos em órgãos-alvo?

- (A) EQU, Creatinina Sérica e Hemograma.
- (B) EQU, Potássio e Hemograma.
- (C) EQU, Creatinina Sérica e Potássio Sérico.
- (D) EQU, Hemograma e Glicemia de Jejum.
- (E) Colesterol Total, Creatinina Sérica e Hemograma.

**05.** O prognóstico da cardiopatia isquêmica depende de inúmeros fatores que vão determinar o impacto dessa doença na capacidade laboral futura do paciente.

Todas as alternativas abaixo são fatores de pior diagnóstico, **EXCETO**:

- (A) o comprometimento da função sistólica do ventrículo direito.
- (B) a obstrução de segmentos proximais das coronárias.
- (C) as arritmias ventriculares.
- (D) a isquemia documentada.
- (E) a gravidade das lesões coronarianas.

**Instrução:** As questões **06** e **07** referem-se ao texto abaixo.

PCF, 30 anos, previamente hígido, chega à emergência de um grande hospital com quadro de gastroenterite, diarreia com vômitos, intensa dor abdominal em cólica, cefaleia, insônia, tremores e *delirium*. O paciente é alcoolista pesado e trabalha em fábrica de baterias há 10 anos. Recebeu medidas de suporte para o quadro agudo, como hidratação vigorosa e medicação sintomática. Teve remissão da dor abdominal com administração de gluconato de cálcio. Após essas medidas, foi diagnosticado e encaminhado para internação.

**06.** No que se refere ao quadro clínico descrito acima, podemos dizer que é compatível com intoxicação

- (A) alimentar.
- (B) por mercúrio.
- (C) por chumbo.
- (D) por manganês.
- (E) por agrotóxico.

**07.** Qual(is) exame(s) específico(s) pode(m) definir o diagnóstico do quadro clínico supracitado?

- (A) Acetilcolinesterase Sérica.
- (B) Manganês Urinário.
- (C) Mercúrio Urinário.
- (D) Chumbo Sérico e Ácido Delta Aminolevulínico Sérico.
- (E) Chumbo no Sangue e Ácido Delta Aminolevulínico Urinário.

**08.** No que se refere à NR 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante expediente normal da empresa e em local apropriado.
- (B) O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões.
- (C) A realização da eleição deve ocorrer no prazo mínimo de 30(trinta) dias antes do término do mandato da CIPA.
- (D) A CIPA poderá ter seu número de representantes reduzido, quando houver redução no número de empregados da empresa.
- (E) Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação.

**09.** Dor na região do processo estiloide do rádio, com ou sem irradiação até o ombro, e que aumenta com abdução radial ativa do polegar. Desvio ulnar do punho, dificuldade para pronossupinação ou pinça e Teste de Finkelstein presente. Esse quadro clínico relaciona-se a que patologia?

- (A) Epicondilite medial.
- (B) Tenossinovite de De Quervain.
- (C) Dedo em gatilho.
- (D) Síndrome do Desfiladeiro Torácico.
- (E) Síndrome do Canal de Guyon.

**10.** Transtornos mentais que acometem os trabalhadores com resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, caracterizados por exaustão emocional, despersonalização e condutas negativas com relação à organização do trabalho. Esse quadro clínico está relacionado com

- (A) Transtorno bipolar.
- (B) Transtorno depressivo relacionado ao trabalho.
- (C) Síndrome de *Burn-Out*.
- (D) Síndrome de reação ao *stress*.
- (E) Neurose profissional.

**11.** JFP, 74 anos, aposentado há 20 anos, tendo trabalhado 30 anos na mesma empresa, internou-se apresentando quadro de dor torácica e dispneia há duas horas. No momento do atendimento, foi diagnosticado infarto agudo do miocárdio. Em exames subsequentes, constataram-se placas em pleura visceral com massa tumoral de 10cm de diâmetro em lobo médio do pulmão direito e derrame pleural associado. O exame anatomopatológico diagnosticou mesotelioma maligno pleural.

Em relação ao caso acima, qual o trabalho mais provável exercido por JFP até a aposentadoria?

- (A) Serviços gerais em fábrica de plástico.
- (B) Serviços gerais em fábrica de ferramentas.
- (C) Serviços gerais em fábrica de fogos de artifícios.
- (D) Serviços gerais em indústria petroquímica.
- (E) Serviços gerais em fábrica de discos de embreamento, pastilhas e lonas.

**12.** AMV trabalha em empresa de grande porte como mecânico de manutenção de caldeiras. Teve um quadro de lombalgia em caráter insidioso há 60 dias, que culminou com seu afastamento do trabalho. Apresentou atestado médico de 5 (cinco) dias em setembro (25/09/11 a 29/09/11), de 5 (cinco) dias em outubro (10/10/11 a 14/10/11) e de 15 (quinze) dias em novembro (01/11 a 15/11). Contudo, ao retornar ao trabalho, permanecia sintomático. De acordo com o decreto nº 3.048, qual a primeira data possível para seu encaminhamento ao INSS?

- (A) 25/09/2011.
- (B) 06/11/2011.
- (C) 11/11/2011.
- (D) 14/11/2011.
- (E) 16/11/2011.

**13.** No que se refere a acidente com material biológico, com curta duração de exposição, de fonte HIV positivo com carga viral baixa e CD4 alto, considere as afirmações abaixo.

- I - Em acidente puntório com agulha de sutura, não há necessidade de investigação, por se tratar de agulha sem lúmen.
- II - O líquido amniótico e a saliva não são considerados fluidos potencialmente infectados.
- III- Em caso de respingo de gotas de sangue em mucosa, a profilaxia pós-exposição oferecida pode ser com zidovudina (AZT) e lamivudina 3TC, por 4 semanas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.



**14.** O uso de AZT, logo após acidente com material biológico de fonte HIV positivo, implica redução de risco de contaminação pelo HIV de aproximadamente

- (A) 50%.
- (B) 81%.
- (C) 90%.
- (D) 95%.
- (E) 100%.

**15.** De acordo com a NR 17, considere as afirmações abaixo, acerca do transporte manual de cargas.

- I - Refere-se a cargas cujo peso é suportado por um só trabalhador.
- II - Não é permitido para trabalhadores menores de 18 anos e para trabalhadoras de qualquer idade.
- III- Compreende o levantamento e a deposição da carga, bem como a distância percorrida com ela.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**16.** Ao avaliar um indivíduo, com relação às atividades com alta exigência para a coluna vertebral, o médico do trabalho deve pesquisar determinados sinais e sintomas. Assinale a alternativa que **NÃO** se refere ao quadro em questão.

- (A) Nos indivíduos dotados de boa robustez, há menor incidência de lombalgia.
- (B) O reflexo patelar alterado pode indicar compressão nervosa.
- (C) A hipertonia da musculatura paravertebral bilateral é um sinal irrelevante.
- (D) Indivíduos muito altos são predispostos a lombalgia.
- (E) O sinal de Laségue indica compressão de nervo por hérnia de disco ou miosite de tensão.

**17.** No que se refere a lombalgia, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os diagnósticos aos seus respectivos fatores desencadeantes.

- (1) Fadiga da musculatura paravertebral
- (2) Conversão psicossomática
- (3) Distensão músculo-ligamentar
- (4) Protrusão intradiscal
- (5) Instabilidade articular da coluna vertebral

- ( ) Deslocamento anterior de L5 – S1.
- ( ) Plano de trabalho muito baixo.
- ( ) Preferência do trabalhador por permanecer em pé.
- ( ) Presença de dor forte com espasmo muscular acentuado.
- ( ) Noites mal dormidas e dor recorrente frequente.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- (C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.

**18.** A doença que é transmitida por aerossóis e para a qual é indicado o uso de máscara respiratória tipo PFF2 durante o período de transmissibilidade é

- (A) tuberculose pleural.
- (B) varicela.
- (C) coqueluche.
- (D) meningite por *Neisseria meningitidis*.
- (E) rubéola.

**19.** Conforme a CLT, no que se refere à licença maternidade, a funcionária grávida deve, mediante atestado médico, notificar o empregador da data do afastamento. Assinale a alternativa correta, com relação ao período em que essa notificação deve ser realizada.

- (A) Até a 32ª semana de gravidez.
- (B) Entre a 32ª e a 36ª semana de gravidez.
- (C) Entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.
- (D) Entre o 36º dia antes do parto e o 7º dia após o parto.
- (E) Entre o 7º dia e o 30º dia após o parto.

**20.** Quanto ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), pode-se afirmar que os trabalhadores possuem responsabilidades. Com relação a isso, considere os itens abaixo.

- I - Colaborar e participar na sua implantação e execução.
- II - Seguir as orientações recebidas nos treinamentos.
- III - Informar a sua chefia direta sobre ocorrência que possa implicar riscos para a saúde dos trabalhadores.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**21.** A avaliação de infecção latente por tuberculose (ILTb) deve ser realizada nos exames admissionais e periódicos, por meio da prova tuberculínica (PT). Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Caso a prova tuberculínica seja  $< 10$  mm, deve-se repeti-la em 1 a 3 semanas para avaliação do efeito *booster*.
- (B) Caso a prova tuberculínica seja  $\geq 10$  mm, deve-se documentar essa informação e afastar tuberculose ativa.
- (C) Independentemente do resultado, a PT deve ser repetida anualmente.
- (D) O *booster* é definido quando a segunda prova tuberculínica é  $\geq 10$  mm, com incremento de pelo menos 6 mm em relação à primeira PT.
- (E) Se o profissional de saúde teve PT prévia  $< 10$  mm, deve-se avaliá-lo como se ele nunca tivesse sido testado.

**22.** Assinale a alternativa que **NÃO** está associada com resultados falso-negativos da PT.

- (A) Tuberculose grave disseminada.
- (B) Obesidade.
- (C) Gravidez.
- (D) Febre durante a realização da PT e nas horas que a sucedem.
- (E) Imunossupressão avançada.

**23.** Em relação à hepatite C, é correto afirmar que

- (A) 80% dos casos apresentam icterícia, dor abdominal e anorexia.
- (B) a soroconversão geralmente acontece após 6 meses da exposição.
- (C) após exposição ao vírus, o RNA-HCV poderá ser identificado no soro antes da presença do anti-HCV.
- (D) a falência hepática fulminante é comum nos casos de infecção pelo vírus.
- (E) o clareamento viral espontâneo após infecção aguda pelo HCV ocorre em cerca de 75% dos casos.

**24.** Em relação aos marcadores virais para hepatite B, é correto afirmar que

- (A) em raras situações, pode ocorrer a presença de anti-Hbs e Hbs Ag no mesmo momento.
- (B) anti-HBe reagente indica replicação viral.
- (C) a presença de Hbs Ag reagente e anti-HBc total indica infecção aguda.
- (D) anti-Hbs reagente sempre indica infecção passada.
- (E) HBs Ag é uma das partículas infecciosas da hepatite B.

**25.** Uma vez obtido o diagnóstico de doença mental relacionada ao trabalho, algumas condutas são recomendadas. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Proporcionar cuidado ao paciente, buscando aliviar a sintomatologia.
- (B) Avaliar, juntamente com o paciente, a perspectiva de que ele precisa modificar sua forma de interagir no local de trabalho.
- (C) Manter o trabalhador noturno em seu horário, uma vez que não há indicação imediata de troca para horário diurno fixo.
- (D) Diminuir a exposição do paciente ao fator que lhe gera conflito.
- (E) Orientar o familiar sobre o distúrbio psíquico.

**26.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de dermatite às suas características.

- (1) Dermatite **irritativa** de contato  
 (2) Dermatite **alérgica** de contato
- ( ) Independe de sensibilização prévia.  
 ( ) Pode aparecer em todos os trabalhadores expostos, dependendo do tempo, periodicidade e concentração do agente exposto.  
 ( ) O *hardening* (espessamento da pele) é considerado protetor nesse tipo de dermatite.  
 ( ) É a causa principal de dermatites por detergente.  
 ( ) O período de incubação pode variar de 5 a 21 dias.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.  
 (B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.  
 (C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.  
 (D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.  
 (E) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.

**Instrução:** As questões **27** e **28** referem-se ao Código de Ética Médica.

**27.** Considere os itens abaixo, no que se refere aos direitos e deveres do médico.

- I - É vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.  
 II - É direito do médico opor-se à realização de junta médica ou de segunda opinião, quando solicitado pelo paciente ou seu representante legal.  
 III- O médico pode exercer simultaneamente a medicina e a farmácia.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**28.** Assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) É vedado ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional.  
 (B) É vedado ao médico deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde.  
 (C) O médico pode revelar informações confidenciais, obtidas por meio do exame médico de trabalhadores, sempre que for solicitado pelos dirigentes de empresas ou de instituições.  
 (D) O prontuário do paciente estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.  
 (E) É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

**29.** No que refere às especificações sobre equipamentos de proteção individual utilizados na indústria da construção, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação.  
 (B) O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a partir de 3,00 (três) metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.  
 (C) O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quadras e estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime.  
 (D) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo paraquedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado.  
 (E) Em serviço de montagem industrial, com movimentação do trabalhador, caso não haja cabo de guia de segurança, existem outras medidas de segurança possíveis.

**30.** Um supervisor que coordena entrada em espaço confinado deve desempenhar a função de

- (A) operar os movimentadores de pessoas.  
 (B) ordenar o abandono do espaço confinado.  
 (C) manter continuamente a contagem dos trabalhadores.  
 (D) adotar os procedimentos de emergência.  
 (E) executar testes e conferir equipamentos e procedimentos.

**31.** Considere os itens abaixo sobre o decreto n.º 3048, no que se refere a empregado de empresa regida pela CLT.

- I - Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
- II - O segurado empregado que, por motivo de doença, se afastar do trabalho durante quinze dias, retornando à atividade no décimo sexto dia, e dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias após o retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.
- III- Independe de carência a concessão do auxílio-acidente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**32.** O aposentado por invalidez terá direito a majoração de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de seu benefício em todas as situações abaixo, **EXCETO**

- (A) baixa visão, com distorção de imagem (aniseiconia).  
 (B) paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.  
 (C) doença que exija permanência contínua no leito.  
 (D) perda de uma das mãos e dos dois pés, quando o uso de prótese for possível.  
 (E) incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

**33.** Na análise de eventos adversos, existem conceitos fundamentais. A \_\_\_\_\_ é definida como o que deve ser feito. A \_\_\_\_\_ indica o que se fez. A \_\_\_\_\_ é uma estratégia de adaptação à situação real de trabalho. Por mais que se tente nunca é possível tornar as condições de produção perfeitamente estáveis, devido às \_\_\_\_\_ técnicas e humanas.

- (A) carga de trabalho – tarefa – atividade – variabilidades  
 (B) tarefa – atividade – atividade – variabilidades  
 (C) carga de trabalho – variabilidade – tarefa – atividades  
 (D) atividade – tarefa – tarefa – cargas de trabalho  
 (E) atividade – tarefa – atividade – cargas de trabalho

**34.** Quanto à mudança transitória de limiar de audição (MTL), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) os ruídos de alta frequência são mais nocivos que os de baixa frequência, principalmente na faixa entre 2kHz e 6kHz.  
 (B) a MTL começa a partir de uma exposição a 75dB(A) e, acima desse nível, ela aumentará proporcionalmente ao aumento de intensidade e duração do ruído.  
 (C) a exposição contínua é mais nociva do que a intermitente.  
 (D) uma pequena parte da MT se recupera em 2 a 3 horas, mas a maior parcela somente em 14 horas.  
 (E) a suscetibilidade individual segue uma distribuição normal.

**35. NÃO** é atribuição dos profissionais de limpeza em instituições hospitalares

- (A) utilizar somente produtos saneantes que estejam com as embalagens rotuladas.  
 (B) transportar resíduos coletados em carros apropriados, mantendo a tampa fechada.  
 (C) realizar as limpezas concorrente, terminal e imediata das áreas internas e externas.  
 (D) realizar o fechamento dos coletores e perfurocortantes.  
 (E) realizar a limpeza e a desinfecção de superfícies que contenham material orgânico.

**36.** A NR-32 classifica os agentes biológicos em classes de risco conforme riscos ao indivíduo e à coletividade e probabilidade de causar doenças no ser humano. Correlacione as classes de risco com as afirmativas abaixo.

- (1) Classe de Risco 1  
 (2) Classe de Risco 2  
 (3) Classe de Risco 3  
 (4) Classe de Risco 4
- ( ) O agente biológico pode causar doenças graves no ser humano, para as quais não existem profilaxia ou tratamento eficazes.  
 ( ) O agente biológico tem baixa probabilidade de disseminação para a comunidade.  
 ( ) O agente biológico oferece risco individual elevado para o trabalhador e tem probabilidade de disseminar-se na comunidade.  
 ( ) O agente biológico tem baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.  
 ( ) É a classe do *Mycobacterium tuberculosis*.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 3.  
 (B) 2 – 3 – 4 – 1 – 2.  
 (C) 4 – 1 – 3 – 2 – 1.  
 (D) 3 – 2 – 4 – 1 – 4.  
 (E) 4 – 3 – 2 – 1 – 3.

**37.** Considere as afirmações abaixo sobre a NR-32.

- I - Serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.  
 II - Para fins da aplicação da NR, são considerados trabalhadores da saúde todos aqueles que exercem suas atividades na edificação, relacionados ou não à promoção e assistência à saúde.  
 III- Todo trabalhador dos serviços de saúde deve receber obrigatoriamente imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**38.** As recomendações dos *Centers for Diseases Control and Prevention* (CDC-USA) em relação à imunização dos profissionais da saúde classificam a prevenção de doenças em duas categorias: aquelas que necessitam de vacinação de rotina ou verificação da imunidade, em função dos riscos de infecção nos profissionais de saúde e pacientes – categoria 1; e aquelas doenças em que está indicada vacinação apenas em determinadas circunstâncias – categoria 2. Relacione as colunas abaixo considerando essas recomendações.

- (1) Categoria 1  
 (2) Categoria 2
- ( ) Hepatite B  
 ( ) *Influenza*  
 ( ) Meningite Meningocócica  
 ( ) Varicela  
 ( ) Poliomielite

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.  
 (B) 1 – 1 – 1 – 1 – 2.  
 (C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.  
 (D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.  
 (E) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.

**39.** As afirmações abaixo referem-se a exposição e administração de quimioterápicos. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O responsável pela administração do quimioterápico é o enfermeiro, conforme Resolução COFEN n.º 210, de 01 de julho de 1998.  
 (B) As funcionárias gestantes e nutrízes não necessitam ser afastadas das atividades de administração dos quimioterápicos.  
 (C) Quando do manuseio de excreções dos pacientes que receberam quimioterápico nas últimas 48 horas, os funcionários devem vestir aventais e luvas de procedimento.  
 (D) As roupas contaminadas com excreções e fluidos corporais do paciente devem ser acondicionadas em saco devidamente identificado para encaminhamento à lavanderia.  
 (E) As áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento, administração e transporte devem manter um *kit* de derramamento identificado e seus profissionais devidamente treinados quanto ao seu uso.

**40.** Quanto ao relatório anual do PCMSO, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser realizado por todas as empresas regidas pela CLT.
- (B) Poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado.
- (C) Deve ser apresentado à CIPA.
- (D) Deve discriminar o número e a natureza dos exames por setor.
- (E) Deve incluir um planejamento para o ano seguinte.