

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 03/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 42 - ENFERMEIRO I para atuar no Serviço de Enfermagem Pediátrica

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 03/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 42

ENFERMEIRO I

para atuar no Serviço de Enfermagem Pediátrica

01.	B	11.	B	21.	E	31.	A
02.	A	12.	A	22.	C	32.	D
03.	C	13.	C	23.	C	33.	D
04.	D	14.	C	24.	E	34.	B
05.	E	15.	C	25.	C	35.	E
06.	C	16.	C	26.	A	36.	B
07.	A	17.	A	27.	B	37.	C
08.	D	18.	D	28.	C	38.	D
09.	E	19.	C	29.	B	39.	B
10.	E	20.	B	30.	D	40.	D



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme item 6.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1 (uma) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos após o início.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Sobre a anemia falciforme, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o acidente vascular cerebral é uma complicação súbita e grave que pode causar graus variáveis de comprometimento neurológico.
- (B) o objetivo da terapia é apenas tratar as emergências clínicas das crises falciformes, pois não é possível prevenir o fenômeno de afoiçamento.
- (C) a terapia de curto prazo com oxigênio pode ser útil se a criança tiver sintomas de dispneia, pois a hipóxia grave pode causar um afoiçamento sistêmico maciço que pode ser fatal.
- (D) as características clínicas são primariamente o resultado de obstrução causada pelas hemácias em forma de foice que bloqueiam a microcirculação, causando vaso-oclusão e consequente hipóxia local.
- (E) a anemia falciforme faz parte de um grupo de doenças denominadas de hemoglobinopatias, na qual a Hgb de um adulto normal (Hgb A) é parcialmente ou completamente substituída por uma Hgb anormal, em forma de foice (HbS).

02. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as principais disfunções gastrointestinais com suas características.

- (1) Doença de Hirschsprung
 - (2) Doença Celíaca
 - (3) Apendicite Aguda
 - (4) Cloaca persistente
 - (5) Cirrose
- () As crianças exibem icterícia, crescimento insuficiente, anorexia, fraqueza muscular e letargia.
 - () As manifestações clínicas geralmente são insidiosas e crônicas. Os principais sintomas são: esteatorreia, emagrecimento, distensão e dor abdominal, irritabilidade e edema.
 - () Intestino aganglionar está cronicamente contraído resultando em ausência de peristaltismo e obstrução intestinal que podem desencadear um quadro de enterocolite.
 - () Má formação anorretal complexa, na qual o reto, a vagina e a uretra drenam em um canal comum que se abre no períneo através da porção uretral comum.
 - () Diagnóstico é baseado, principalmente, na história e no quadro clínico. Os principais sintomas observados são febre, vômitos e dor abdominal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (E) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.

03. A atresia biliar é um processo inflamatório que leva à fibrose e obliteração da via biliar. Qual a principal e mais precoce manifestação clínica?

- (A) Palidez.
- (B) Prurido.
- (C) Icterícia.
- (D) Esplenomegalia.
- (E) Baixo ganho de peso.

04. Considere as afirmações abaixo sobre a síndrome do intestino curto.

- I - Os componentes mais importantes dos cuidados de enfermagem são a administração e a monitorização da terapia nutricional.
- II - O suporte nutricional enteral é a abordagem de tratamento inicial.
- III - É um distúrbio de má absorção que ocorre quando existe uma redução na área superficial da mucosa, geralmente como resultado da ressecção extensa do intestino delgado. A maioria dos casos inclui anomalias congênitas, isquemia e trauma.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

05. Sobre os cuidados com as doenças transmissíveis mais comuns na infância, assinale a alternativa correta.

- (A) A varicela é transmitida através do contato direto, disseminação por gotículas e objetos contaminados, sendo que o período de transmissão ocorre do dia em que inicia a erupção das lesões até 6 dias após o aparecimento das primeiras vesículas.
- (B) Os dois estágios clínicos da coqueluche são o paroxístico e o catarral, sendo que no estágio catarral observa-se a presença de tosses curtas e rápidas seguidas de inspiração súbita associada a um som alto tipo "guincho".
- (C) A administração da imunoglobulina antivaricela-zoster está indicada no período pós-exposição a todas as pessoas que mantiverem contato com doente de varicela em fase contagiosa.
- (D) Os principais sinais e sintomas da rubéola são vômitos, mal-estar, tosse e discreta linfadenopatia.
- (E) A prevenção de doenças transmissíveis consiste em dois componentes: prevenção da doença e controle da sua disseminação para outros.

06. Assinale as principais manifestações clínicas da insuficiência renal aguda.

- (A) Oligúria e polidipsia.
- (B) Hematúria e poliúria.
- (C) Oligúria e anúria.
- (D) Edema e polifagia.
- (E) Hipertensão e icterícia.

07. Em relação à meningite, assinale a afirmativa correta.

- (A) A meningite meningocócica é causada por uma bactéria e necessita isolamento respiratório por 24 horas após o início do tratamento com antibiótico.
- (B) A meningite meningocócica é causada por um vírus e não necessita de isolamento respiratório.
- (C) O risco de meningite bacteriana é maior entre crianças vacinadas.
- (D) É uma doença grave, com baixa mortalidade e sequelas frequentes nos sobreviventes.
- (E) Nos casos de meningite meningocócica é recomendado isolamento respiratório por 72 horas após o início do tratamento com antibiótico.

08. Considere as afirmações abaixo sobre choque.

- I - Uma das características do choque cardiogênico é o aumento do débito cardíaco e da função cardíaca.
- II - Trauma, sangramento, queimadura, vômito e diarreia podem ser a causa do choque hipovolêmico.
- III- Monitorização, acesso venoso, oxigenação e balanço hídrico são cuidados fundamentais no tratamento do choque.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III.

09. Considerando o tema choque, assinale a afirmativa correta.

- (A) Embora existam diferentes tipos de choque, as causas e consequências fisiológicas são as mesmas.
- (B) Na assistência ao paciente em choque é necessário mensurar a infusão e ingesta de líquidos; as eliminações não precisam ser controladas.
- (C) O choque é considerado uma situação de emergência, dispensando observação e cuidados intensivos.
- (D) Os principais sinais de choque são: bradicardia, pulsos finos, perfusão periférica lenta, extremidades aquecidas, alterações no sensorio e oligúria.
- (E) O choque não reconhecido e não tratado rapidamente, pode ser fatal e é capaz de ocasionar disfunção múltipla de órgãos e sistemas.

10. Em relação a processos infecciosos e cateteres venosos centrais, considerar as afirmações abaixo.

- I - No cuidado com cateter venoso central (CVC), é importante a inspeção da inserção e trajeto do cateter, a procura de hiperemia, dor, calor, rubor e edema.
- II - A cultura da ponta do cateter é um exame que pode auxiliar no tratamento e diagnóstico da infecção.
- III- As infecções por cateter podem apresentar manifestações como: febre, piora do estado geral, perda de peso e taquicardia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. Em relação às medidas de controle de infecção, é correto afirmar:

- (A) a infecção hospitalar requer, para ocorrer, somente uma fonte de micro-organismos infectantes, que quase sempre é um paciente infectado ou colonizado.
- (B) os sítios de infecção hospitalar mais frequentes são a corrente sanguínea (sepses, infecção relacionada a cateteres e flebite), trato respiratório superior, trato respiratório inferior, pele, feridas cirúrgicas e trato urinário.
- (C) a lavagem de mãos é um procedimento simples, mas não o mais importante no controle de infecção, que consiste em lavar a mão com água corrente, friccionar com sabão antisséptico alcoólico, enxaguar, secar, friccionar com álcool e deixar secar.
- (D) disponibilidade de pias próximas aos leitos, grande número de circulantes, funcionários sobrecarregados, internação em UTI, unidade de urgência ou outras unidades fechadas são fatores de risco relacionados ao hospedeiro.
- (E) identificação de casos de bactérias multirresistentes, medidas de isolamento, auditoria de antimicrobianos, medidas administrativas e logísticas, é papel exclusivo da equipe de enfermagem da unidade de internação no controle das infecções hospitalares.

12. O desequilíbrio entre a produção e a absorção de líquido cerebrospinal no sistema ventricular provoca condição cerebral denominada

- (A) hidrocefalia.
- (B) meningite bacteriana.
- (C) encefalite.
- (D) neuroblastoma.
- (E) síndrome de Reye.

13. Em relação à criança com encefalite, é correto afirmar que

- (A) a encefalite é um processo inflamatório do Sistema Nervoso Central provocado exclusivamente por bactérias e vírus.
- (B) a encefalite causada pelo vírus herpes simples é uma doença comum em que as crianças afetadas apresentam convulsões generalizadas.
- (C) medidas de isolamento da criança com encefalite são dispensáveis, no entanto, uma boa técnica de lavagem das mãos deve ser seguida, assim como a monitoração neurológica.
- (D) mesmo os casos leves de encefalite caracterizam-se por espasticidade, febre alta, torpor e desorientação.
- (E) é prioritário isolar a criança com quadro de encefalite por até 72 horas após o início dos antibióticos.

14. Considere as afirmações abaixo sobre distúrbios convulsivos.

- I - Cuidados de enfermagem à criança com distúrbios convulsivos incluem cuidados físicos, educação sobre a terapia medicamentosa e aspectos emocionais relacionados à ocorrência do distúrbio na infância.
- II - Convulsão é uma condição patológica crônica que se manifesta por fenômenos sensoriais alucina-tórios, efeitos sensoriais e motores ou perda de consciência.
- III- Na convulsão tônico-clônica generalizada, a criança pode apresentar perda súbita da consciência, queda, rigidez e arqueamento do corpo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Considere as afirmações abaixo sobre tratamento medicamentoso das crises convulsivas.

- I - A fenitoína pode ser diluída apenas em solução fisiológica, pois precipita quando misturada à glicose.
- II - A utilização de diazepam retal é uma opção considerada segura na falta de acesso venoso.
- III- O midazolam não pode ser administrado pelas vias nasal e oral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Quanto à bronquiolite é correto afirmar.

- (A) A bronquiolite é uma infecção aguda, com efeito mínimo em nível bronquiolar e ocorre primariamente na primavera.
- (B) A infecção pelo vírus sincicial respiratório é a causa mais frequente de hospitalização em crianças com mais de 1 ano de idade.
- (C) As crianças internadas com suspeita de infecção pelo vírus sincicial respiratório podem ser alocadas em quartos separados ou agrupadas com outras infectadas pelo mesmo vírus, empregando-se as precauções de contato padronizadas.
- (D) A maioria dos casos de bronquiolite é causada pelos vírus adenovírus e parainfluenza, também são implicados o vírus sincicial respiratório e recentemente o metapneumovírus humano.
- (E) A bronquiolite, no estágio agudo da doença, é tratada sintomaticamente com oxigênio umidificado frio, ingestão adequada de líquidos preferencialmente por via oral, manutenção das vias aéreas e medicações de suporte.

17. Assinale a resposta correta quanto aos tipos de precauções utilizados no controle de infecção.

- (A) A precaução padrão reduz o risco de transmissão de patógenos de substâncias corporais úmidas, envolve o uso de proteção de barreira, como luvas, óculos, avental e máscara.
- (B) A precaução baseada na transmissão aérea reduz o risco de transmissão do agente infeccioso por gotículas. Essa transmissão envolve o contato da conjuntiva ou das membranas da mucosa do nariz ou da boca com gotículas de partículas maiores.
- (C) A precaução de contato reduz o risco de transmissão dos micro-organismos por contato direto com o hospedeiro colonizado. Objetos e a unidade do paciente não são fontes de contaminação.
- (D) A precaução padrão sintetiza as principais características das precauções universais. Criada para o cuidado de todo o paciente, com o objetivo de reduzir o risco de transmissão de fontes reconhecidas de infecção, prevê o uso de luvas essencialmente.
- (E) A precaução contra perdigotos reduz o risco de transmissão dos agentes infecciosos pelo ar. Esse tipo de transmissão ocorre pela disseminação de núcleos de gotículas transportadas pelo ar, resíduo de pequenas partículas.

18. Em relação à Parada Cardiorrespiratória (PCR), considere as afirmações abaixo.

- I - Constituem fatores de risco ou indicativos de risco de parada cardíaca: frequência respiratória maior que 60, febre com petéquias.
- II - Na assistência em PCR ao paciente hospitalizado, a conduta da equipe deve: garantir vias aéreas, ventilar e oxigenar com oxigênio a 100%, iniciar compressões torácicas, obter acesso venoso ou intraósseo, monitorar o paciente.
- III- A parada cardiorrespiratória é uma situação causada por inconsciência, com pouca resposta a estímulos, bradipneia e pulsos filiformes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

19. Sobre a intubação endotraqueal, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) é usada em situações de reanimação, obstrução respiratória alta e insuficiência respiratória que exija ventilação artificial.
- (B) através do tubo endotraqueal pode-se administrar drogas na emergência.
- (C) o posicionamento do paciente no leito deve ser de flexão da cabeça com o pescoço.
- (D) Curare é uma droga utilizada, sendo que com sua administração o paciente não se movimenta e não respira.
- (E) Atropina é uma droga anticolinérgica utilizada nesse procedimento, pois evita bradicardia, diminui secreção oral e melhora visualização da glote.

20. Na insuficiência ventilatória aguda, na forma grave, o paciente apresenta

- (A) sede, fome e irritabilidade.
- (B) desconforto respiratório intenso, cianose e perda de consciência.
- (C) saturação de oxigênio estável e moderada disfunção respiratória.
- (D) diarreia, vômitos e febre.
- (E) choro forte e manchas sugestivas de alergia.

21. Em relação às doenças respiratórias, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando patologias, suas causas e complicações, com seus conceitos, sinais e sintomas.

- (1) Pneumonia
 (2) Pneumotórax
 (3) Asma
 (4) Causas de obstrução respiratória alta
 (5) Causa de insuficiência respiratória parenquimatosa
- () Complicação frequente nas pneumonias necrotizantes graves, sobretudo nos casos submetidos à ventilação mecânica.
 () Pneumonia intersticial, broncopneumonia, edema pulmonar cardiogênico, hemorragia pulmonar.
 () Laringite, traqueíte bacteriana, hipertrofia de amígdala.
 () Infecção pulmonar que se manifesta por febre, tosse e dificuldade respiratória.
 () Doença inflamatória crônica com episódios de tosse, sibilância e dispneia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é:

- (A) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
 (B) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
 (C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
 (D) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
 (E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.

22. Sobre cetoacidose diabética, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) trata-se de uma situação de emergência em que a reposição de volume e de insulina deve ser iniciada assim que o diagnóstico é firmado.
 (B) no paciente grave, com sinais de choque, deve-se suspender a dieta e manter a oxigenioterapia.
 (C) na emergência inicial, a insulino-terapia deve ser administrada por via subcutânea.
 (D) infecções, trauma, problemas emocionais e estresse podem levar a rápido descontrole metabólico caracterizado por hiperglicemia e cetose.
 (E) nos diabéticos já conhecidos, investigar cuidadosamente o regime de insulina em uso, as falhas recentes na sua administração e pesquisar desvios recentes na dieta.

23. Assim que um extravasamento de quimioterápico é reconhecido, deve ser tratado de acordo com um protocolo consistente definido pela instituição. No entanto, alguns passos são incontestáveis. Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Aplicar gelo ou compressas geladas durante 15 a 20 minutos pelo menos, quatro vezes por dia nas primeiras 24 a 48 horas, se a droga extravasada for vincristina ou vimblastina.
 () Manter o membro elevado por 48 horas.
 () Aplicar pressão manual sobre a área afetada.
 () Parar a infusão imediatamente e manter a agulha no local.
 () Conectar uma seringa ao dispositivo e aspirar a medicação residual aí existente e, se possível, parte daquela extravasada para os tecidos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
 (B) V – F – V – F – F.
 (C) F – V – F – V – V.
 (D) F – F – V – V – V.
 (E) V – V – V – F – F.

24. Em relação à infusão da medula óssea ou células-tronco hematopoiéticas, é correto afirmar que

- (A) o dia da infusão dessas células chama-se dia 1 e os dias que precedem são numerados (+1, +2, +3...), e os que sucedem (...-3, -2, -1); quando criopreservadas (as células), seu descongelamento deve ser feito a uma temperatura média de 39°C a 40°C em banho-maria.
 (B) o dia da infusão dessas células chama-se dia 0 e os dias que sucedem são numerados, (... -3, -2, -1), e os que precedem (+1, +2, +3...); quando criopreservadas (as células), seu descongelamento deve ser feito a uma temperatura entre 34°C a 35°C em banho-maria.
 (C) o dia da infusão dessas células chama-se dia 1 e os dias que precedem são numerados (... -3, -2, -1) e os que sucedem (+1, +2, +3...); quando criopreservadas (as células), seu descongelamento deve ser feito a uma temperatura entre 29°C a 30°C em banho-maria.
 (D) o dia da infusão dessas células chama-se dia 0 e os dias que sucedem são numerados (... -3, -2, -1) e os que precedem (+1, +2, +3...); quando criopreservadas (as células), seu descongelamento deve ser feito a uma temperatura média entre 31°C e 32°C em banho-maria.
 (E) o dia da infusão dessas células chama-se dia 0 e os dias que precedem são numerados (... -3, -2, -1) e os que sucedem (+1, +2, +3...); quando criopreservadas (as células), seu descongelamento deve ser feito a uma temperatura média entre 37°C e 38°C em banho-maria.

25. Em relação aos antineoplásicos ifosfamida e metrotexato, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a ifosfamida não possui ação vesicante, no entanto, é irritante, causando dor e queimação quando infundida rapidamente ou concentrada.
- (B) a monitoração do débito urinário e da hematúria é um cuidado de enfermagem quando o paciente recebe ifosfamida.
- (C) a administração da ifosfamida pode se dar por via oral e endovenosa e a do metrotexato exclusivamente por via endovenosa.
- (D) uma complicação relacionada à infusão de ifosfamida pode ser a cistite hemorrágica.
- (E) o metrotexato não possui ação vesicante.

26. Considere as informações abaixo sobre avaliação e controle da dor em paciente pediátrico em uso de opioides.

- I - Sedação, náusea, prurido e retenção urinária são efeitos colaterais possíveis.
- II - Ocorrendo depressão respiratória deve-se interromper imediatamente a infusão endovenosa contínua por não existir medicação antagonista dos opioides.
- III- A diarreia pode ser um efeito colateral dos opioides, pois estes aumentam a peristalse e diminuem o tônus do esfíncter anal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III.

27. Considere a utilização dos princípios do cuidado paliativo na atenção a uma criança diagnosticada com uma doença potencialmente letal e sem possibilidade de cura. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Focalizar o controle de sintomas e o apoio em vez da cura ou prolongamento da vida.
- (B) Respeitar a privacidade, esperando que família e paciente tomem as decisões necessárias sozinhos.
- (C) Fornecer subsídios suficientes para promoção do cuidado domiciliar.
- (D) Retirar os tratamentos que possam causar dor e sofrimento.
- (E) Intervir no alívio dos sintomas mesmo com o risco de acelerar a morte.

28. Na avaliação e controle da dor em pediatria, é correto afirmar que

- (A) por ser muito complexa, não dispomos de instrumentos de avaliação da dor para o uso em crianças pequenas.
- (B) medidas comportamentais são mais confiáveis quando se mede dor de longa duração.
- (C) mudanças fisiológicas profundas podem acompanhar a experiência da dor.
- (D) o adolescente apresenta mais protesto verbal e mais atividade motora em resposta à dor.
- (E) o uso de placebos pode fornecer informação útil sobre a presença ou gravidade da dor.

29. No momento da morte em pediatria, algumas diretrizes para o Cuidado de Enfermagem devem ser observadas. Assinale as alternativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso).

- () Desencorajar os membros da família a comunicarem seus sentimentos, evitando, com isso que perturbem outros parentes.
- () Fazer o possível para assegurar o conforto da criança, especialmente, com relação ao alívio da dor.
- () Evitar que a família banhe ou segure no colo a criança morta, permanecendo com esta por tempo prolongado.
- () Fornecer à criança e à família a oportunidade de visitar experiências pessoais ou lembranças em suas vidas.
- () Fazer todos os esforços para oportunizar que os membros da família, especialmente os pais, estejam com a criança no momento da morte, se assim desejarem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – F.

30. O grande número de células neoplásicas destruídas pela ação dos citostáticos, especialmente nas primeiras aplicações, liberam potássio, fostato, ácido úrico e outros produtos da degradação celular. Este fenômeno denomina-se Síndrome da Lise Tumoral, que é uma complicação metabólica potencialmente fatal que ocorre em pacientes portadores de neoplasias com _____ ou grandes massas tumorais, que são _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) baixa taxa de crescimento celular – insensíveis à quimioterapia.
- (B) alta taxa de crescimento celular – insensíveis à quimioterapia.
- (C) moderada taxa de crescimento celular – sensível à quimioterapia.
- (D) alta taxa de crescimento celular – sensíveis à quimioterapia.
- (E) moderada taxa de crescimento celular – insensíveis à quimioterapia.

31. A mucosite consiste na resposta inflamatória das membranas mucosas à ação das drogas antitumorais. Considerando essa informação, assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Estima-se que a mucosite oral ocorra em 40% dos pacientes que recebem quimioterapia para tumores sólidos e em 60% dos pacientes que recebem quimioterapia para neoplasias hematológicas.
- () As fases da mucosite, são quatro: fase inflamatória/vascular, fase epitelial, fase ulcerativa/bacteriana e fase de cicatrização.
- () A ocorrência e a severidade da mucosite são influenciadas pela dose, protocolo (sequência, intervalo, velocidade, combinação das drogas) e pelo impacto das funções hepática e renal.
- () A radioterapia não pode causar mucosite quando a irradiação inclui cabeça e pescoço, englobando boca e glândulas salivares.
- () Apenas 40% dos pacientes que recebem transplante de medula óssea desenvolvem complicações orais decorrentes do regime de condicionamento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) F – F – F – V – V.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V – F.

32. Sobre fibrose cística, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a doença é herdada como um traço autossômico recessivo, e a criança afetada herda gene com defeito de ambos os pais.
- (B) as crianças apresentam uma diminuição da secreção pancreática de bicarbonato e cloreto e um aumento nos níveis de cloro e sódio, tanto na saliva quanto no suor.
- (C) a obstrução mecânica causada pelo aumento da viscosidade das secreções das glândulas mucosas é responsável por muitas das manifestações clínicas da doença.
- (D) a manifestação pós-natal mais precoce é o prolapso retal, que acontece apenas no recém-nascido.
- (E) as crianças podem apresentar anorexia frequente, como resultado das quantidades abundantes de muco produzidas e expectoradas, fadiga e alteração do sono.

33. Considere as afirmações abaixo sobre Diabetes *Mellitus* (DM).

- I - É classificado como DM tipo 1 (insulino dependente) e tipo 2 (não insulino dependente).
- II - As principais manifestações microvasculares são a nefropatia, retinopatia e neuropatia.
- III- É um distúrbio agudo do metabolismo caracterizado por uma deficiência parcial ou completa do hormônio insulina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

34. Existem padrões definidos e previsíveis para o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, que são contínuos, ordenados e progressivos. Assinale a alternativa correta que define a primeira infância.

- (A) Período de desenvolvimento motor, cognitivo e social rápido, com reciprocidade com seu cuidador (pais); as crianças estabelecem confiança básica no mundo e os fundamentos para relações interpessoais futuras.
- (B) Período que se estende a partir do momento em que as crianças conseguem caminhar eretas até sua entrada na escola, caracteriza-se como sendo um período de atividade e de descobertas intensas.
- (C) Período do desenvolvimento no qual a criança dirige-se para fora do grupo familiar e centra-se no mundo mais amplo de relações com seus colegas.
- (D) Período agitado, de amadurecimento rápido e de mudanças. O amadurecimento biológico e da personalidade vêm acompanhados por agitação física e emocional, e ocorre a definição do autoconceito.
- (E) Taxa de crescimento rápido e dependência total tornam este período um dos mais importantes no processo de desenvolvimento.

35. Considere as afirmações abaixo sobre maus tratos na infância.

- I - A negligência infantil é a forma mais comum de maus tratos e é definida como a falha de um dos pais ou de outra pessoa legalmente responsável pelo bem-estar da criança em prover suas necessidades básicas e cuidados adequados.
- II - Síndrome de Munchausen por Procuração é uma forma grave de abuso infantil, na qual cuidadores deliberadamente exageram ou inventam histórias e sintomas, ou induzem sintomas.
- III- Ocorrem em todos os grupos socioeconômicos, religiosos, culturais, raciais e étnicos. Três fatores de risco são comumente identificados no abuso infantil: características parentais, da criança e do ambiente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

36. Segundo a NANDA International (*North American Nursing Diagnosis Association*), o "Diagnóstico de Enfermagem é definido como um _____ das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. O Diagnóstico de Enfermagem constitui a base para a seleção das _____ para o alcance dos _____ pelos quais o enfermeiro é responsável".

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) processo de trabalho – informações – atendimentos
- (B) julgamento clínico – intervenções de enfermagem – resultados
- (C) instrumento de trabalho – necessidades – resultados
- (D) elemento constitutivo – necessidades – atendimentos
- (E) processo de seleção – necessidades – atendimentos

Instrução: Considere o seguinte Estudo de Caso abaixo, e responda às questões a seguir de números **37 e 38**.

Criança, sexo masculino, oito anos, branco, procedente de Porto Alegre, internada por transtorno de conduta não especificada. Apresentava alterações de comportamento como fugas de casa, dificuldade em aceitar limites e roubo. História de acompanhamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por irritabilidade e conduta sedutora. A situação agravou-se com as fugas para a casa de amigos de 13 e 14 anos e relato de roubo de dinheiro da mãe. A mãe, por incapacidade e inabilidade em lhe impor limites, apelava para intervenção de tio materno, que por sua vez, assumia atitudes violentas com a criança, agredindo-a fisicamente.

Menino mora com a mãe de 40 anos, do lar, ensino médio completo, portadora de Transtorno de Humor Bipolar, com tentativa prévia de suicídio, fazendo tratamento com antidepressivos e psicotrópicos. Pai de 37 anos, com quem não tem contato há mais de três anos. Tem uma irmã, por parte de mãe, de 20 anos, sem envolvimento com os problemas do irmão. Observado no menino alterações no desenvolvimento pessoal social, como atitudes agressivas, descontrole, comportamento opositor, dificuldade de seguir regras e não aceitação de limites.

Mãe apresentando-se com comportamento pueril, queixando-se do menino por ter sido agredida fisicamente, sem condições de cuidá-lo. Deseja a alta do menino, ansiosa para ir embora, pois não tem com quem fazer o revezamento familiar durante a hospitalização do filho. Necessitou de acompanhamento psiquiátrico durante toda a internação do filho.

Texto extraído de: ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; LAURENT, M. C. et al. Processo de enfermagem na prática clínica: estudos clínicos realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre: Artmed, 2011.

37. Na elaboração de um projeto terapêutico em Pediatria, o foco do cuidado deve ser a criança e a família. Com relação ao cuidado à família, qual o diagnóstico de enfermagem associado a sinais, sintomas e fatores de risco identificados, que se aplica ao caso descrito acima?

- (A) Mãe com transtorno de conduta; deprimida; necessitou de acompanhamento psiquiátrico durante toda a internação do filho.
- (B) Mãe com comportamento pueril; queixas de agressão física pelo filho; não tem com quem fazer o revezamento familiar durante a hospitalização.
- (C) Enfrentamento familiar incapacitado; comportamento familiar prejudicial ao bem-estar da família e da criança; mãe incapacitada para o cuidado do menino.
- (D) Mãe, tio e irmã com incapacidade e inabilidade de cuidar do menino; atitudes violentas do tio com o menino; irmã sem envolvimento com os problemas do irmão.
- (E) Enfrentamento familiar incapacitado; mãe portadora de Transtorno de Humor Bipolar; tentativa prévia de suicídio.

38. Considere direitos contidos na Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados que podem respaldar a elaboração de um plano de cuidados de enfermagem à criança e à família.

- I - Direito do familiar cuidador principal de receber autorização para afastamento do hospital, em caso de risco de agressão física por parte da criança.
- II - Direito a que seus pais ou responsáveis, participem ativamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será submetida.
- III- Direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando se fizer necessário.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

39. Quanto ao diagnóstico de enfermagem, é correto afirmar que

- (A) dados levantados na investigação devem ser agrupados e planejados para implementar ou avaliar um plano de cuidados para, em momento posterior, proceder à interpretação.
- (B) os diagnósticos de enfermagem são interpretações científicas dos dados levantados, usados para orientar o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação.
- (C) o processo diagnóstico da enfermagem é semelhante ao da medicina, uma vez que, o foco do atendimento de enfermagem é o bem-estar e a autorrealização da pessoa.
- (D) a enfermagem concentra-se na Saúde e nos seres humanos, e em preocupações científicas objetivas que apontam os diagnósticos envolvidos para o plano de cuidados.
- (E) hipóteses diagnósticas são analisadas no início do processo de levantamento de dados de enfermagem e consistem em dados objetivos oferecidos pela pessoa.

40. Considere as afirmações abaixo sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- I - O enfermeiro tem a responsabilidade e o dever de registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
- II - O enfermeiro tem o direito de participar de prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- III- É permitido ao enfermeiro assinar as ações de enfermagem que não executou, desde que sigam protocolo institucional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.