

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 03/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

## PS 47 - MÉDICO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n.º: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 03/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 47

##### MÉDICO DO TRABALHO I

01.	<b>D</b>	11.	<b>C</b>	21.	<b>E</b>	31.	<b>B</b>
02.	<b>D</b>	12.	<b>D</b>	22.	<b>A</b>	32.	<b>C</b>
03.	<b>A</b>	13.	<b>E</b>	23.	<b>D</b>	33.	<b>E</b>
04.	<b>C</b>	14.	<b>D</b>	24.	<b>B</b>	34.	<b>D</b>
05.	<b>E</b>	15.	<b>C</b>	25.	<b>E</b>	35.	<b>E</b>
06.	<b>B</b>	16.	<b>D</b>	26.	<b>C</b>	36.	<b>A</b>
07.	<b>B</b>	17.	<b>B</b>	27.	<b>D</b>	37.	<b>E</b>
08.	<b>D</b>	18.	<b>A</b>	28.	<b>C</b>	38.	<b>A</b>
09.	<b>A</b>	19.	<b>E</b>	29.	<b>A</b>	39.	<b>B</b>
10.	<b>C</b>	20.	<b>D</b>	30.	<b>E</b>	40.	<b>C</b>



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS



# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme item 6.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1 (uma) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos após o início.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** Em comparação à população geral, as categorias de profissionais de saúde mais vulneráveis, quanto ao risco de infecção tuberculosa, são:

- (A) equipe de enfermagem, tísio-pneumologistas, nutricionistas.
- (B) patologistas clínicos, auxiliar de higienização, técnicos de laboratório.
- (C) estudantes de medicina, enfermagem, nutricionistas.
- (D) equipe de enfermagem, técnicos de laboratório, patologistas clínicos.
- (E) tísio-pneumologistas, radiologistas, recreacionistas.

**02.** Considere as seguintes afirmações sobre tuberculose.

- I - A tuberculose, quando ocorre em profissional de saúde, deve ser notificada em comunicação de acidente de trabalho – CAT, conforme legislação que permite incluir a tuberculose como doença ocupacional (Lei n.º 8.213 de 24 de julho de 1991).
- II - O efeito *booster* representa a reativação da resposta tuberculínica pelas células de memória (BCG ou infecção remota por *M.tuberculosis*).
- III- Existem evidências de que a revacinação pela BCG traz benefício para o profissional de saúde no sentido de proteção contra tuberculose.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**03.** Sobre os riscos biológicos, no âmbito da NR-32, está **INCORRETO** afirmar:

- (A) o descarte dos objetos perfurocortantes deve ser realizado pelos profissionais da higienização treinados.
- (B) são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- (C) o PPRA deve indicar as características dos calçados a serem utilizados nos diversos postos de trabalho.
- (D) após um acidente com agulha contaminada com o HIV, estima-se que o risco de contaminação é cerca de 0,3.
- (E) o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores durante a jornada de trabalho.

**04.** Um instrumentador, durante procedimento cirúrgico, sofreu acidente perfurocortante profundo com um bisturi sujo de sangue de paciente-fonte portador de anti-HCV reagente, anti-HIV reagente, HBsAg não reagente e anti-HBcIgM não reagente. O funcionário não era vacinado para hepatite B, com anti-HBs não reagente.

Considere as afirmações abaixo sobre os procedimentos recomendados no caso descrito acima.

- I - A quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV indicada é o esquema padrão/básico (AZT – zidovudina) associado à 3TC (lamivudina).
- II - Administrar imunoglobulina anti-hepatite B e iniciar a vacinação contra hepatite B.
- III- Em relação à exposição ao HCV, está indicado acompanhamento clínico laboratorial do acidentado, já que inexistem vacinas ou imunoglobulinas capazes de evitar a transmissão por esse vírus.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**05.** Sobre os quimioterápicos, no âmbito da NR-32, está **INCORRETO** afirmar:

- (A) o preparo deve ser feito em cabine de segurança biológica classe II B2.
- (B) o EPI deve ser avaliado diariamente quanto à conservação e segurança.
- (C) ao trabalhador exposto à radiação, é proibido realizar atividades com quimioterápicos.
- (D) o vestiário deve ter lava-olhos ou ducha higiênica.
- (E) gestante pode trabalhar após o terceiro trimestre de gravidez.

**06.** Numere a primeira coluna de acordo com a segunda, associando as doenças com fatores a serem considerados na avaliação para imunização em profissionais de saúde:

- (1) rubéola
- (2) gripe
- (3) varicela
- (4) hepatite C
- (5) hepatite B

- ( ) diagnóstico de herpes zoster é considerado para imunidade.
- ( ) não existe vacina para profissional da saúde.
- ( ) obesidade pode diminuir resposta imunológica vacinal.
- ( ) os profissionais de saúde devem se vacinar anualmente.
- ( ) história da doença não é considerada para imunidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- (B) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (D) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- (E) 1 – 4 – 5 – 2 – 3.

**07.** O uso de máscara cirúrgica, para o profissional da saúde, está indicado nas situações abaixo descritas, **EXCETO**:

- (A) para proteger de projeção de sangue e outros fluidos que possam atingir as vias aéreas.
- (B) para entrar no quarto de paciente com varicela.
- (C) para entrar em quarto de paciente com meningite por *Neisseria Meningitidis*.
- (D) para entrar no quarto de paciente com influenza.
- (E) para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio trabalhador.

**08.** Sobre os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – NR-4, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as empresas privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
- (B) É facultado às empresas públicas, aos órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário manter Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
- (C) As empresas que possuam mais de 50 (cinquenta) por cento de seus empregados em estabelecimentos ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do menor grau de risco.
- (D) O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos Quadros I e II, anexos, observadas algumas exceções previstas na Norma.
- (E) Os canteiros de obras e as frentes de trabalho, situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal, ainda que tenham menos de quinhentos empregados, deverão organizar os próprios Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, independentemente da empresa de engenharia principal responsável.

**09.** Sobre a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – considere as afirmações a seguir.

- I - Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados.
- II - Os empregados designarão, entre seus representantes, o presidente da CIPA, e o empregador escolherá, entre os titulares, o vice-presidente.
- III- As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas quinzenalmente durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**10.** Sobre a NR-6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) – considere as afirmações a seguir.

- I - Cabe ao fabricante fornecer aos trabalhadores orientação e treinamento adequados sobre uso, guarda e conservação do EPI.
- II - Cabe ao empregado responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica de seu EPI.
- III- Nas empresas desobrigadas de manter SESMT, compete à CIPA recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**11.** Os riscos à saúde decorrentes da exposição ocupacional ou ambiental ao chumbo são conhecidos há mais de 2000 anos. Sobre o chumbo e suas consequências à saúde dos trabalhadores expostos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) No Brasil, além dos casos relacionados à produção e reforma de baterias automotivas, têm sido relatados casos entre trabalhadores da indústria de plástico (PVC), instrução e aprendizado de tiro e reparação de radiadores de carro.
- (B) O chumbo não apresenta nenhuma função fisiológica conhecida sobre o organismo de seres humanos e animais.
- (C) O chumbo não é bem absorvido por via inalatória. Em sua forma metálica, é facilmente absorvido via cutânea, razão pela qual essa é considerada a via mais importante do ponto de vista ocupacional.
- (D) Uma vez absorvido, o chumbo é distribuído para o sangue, onde tem meia-vida de 37 dias; nos tecidos moles, sua meia-vida é de 40 dias, e nos ossos, sua meia-vida é de 27 anos, constituindo esses o maior depósito corporal do metal, armazenando 90 a 95% do chumbo presente no corpo.
- (E) As manifestações clínicas evoluem de forma insidiosa e muitas vezes trabalhadores com evidências laboratoriais inequívocas de exposição apresentam-se assintomáticos.

**12.** Como em qualquer especialidade, o Médico do Trabalho enfrenta frequentemente dilemas éticos durante o exercício de sua profissão. Nesse sentido, avalie as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) O Médico do Trabalho da empresa tem a prerrogativa ética e legal de estabelecer incapacidade laboral, para fins de concessão de benefício previdenciário, quando constatar agravo à saúde que comprometa o exercício da atividade ocupacional, após realizar exame clínico em trabalhador.
- (B) Quando o prontuário do trabalhador for judicialmente requisitado, o Médico do Trabalho deverá comparecer perante a autoridade e declarar-se impedido de disponibilizá-lo, integralmente ou parcialmente, salvaguardando assim o sigilo médico.
- (C) Para proteger a saúde dos demais trabalhadores de uma instituição hospitalar, o Médico do Trabalho deverá comunicar imediatamente à chefia do funcionário quando constatar soroconversão de trabalhador da saúde que sofreu acidente pontual com exposição a material biológico de paciente soropositivo para o HIV.
- (D) Os médicos podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado, ou não, quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal. Se o paciente ou representante legal solicitar a colocação de CID, deverá expressar essa concordância no atestado.
- (E) Quando solicitado pelo paciente ou seu representante legal, o Atestado Médico deverá conter obrigatoriamente: o diagnóstico, os resultados dos exames complementares, a conduta terapêutica e o prognóstico, estando facultado aos médicos que atuam em serviços de Pronto Atendimento ou de Emergência informar o tempo de repouso estimado, necessário para a recuperação do paciente.

**13.** Quanto à proteção respiratória dos Trabalhadores de Saúde contra agentes biológicos, analise as afirmações a seguir.

- I - A aplicação hierárquica das seguintes medidas já se provou efetiva no controle da infecção pelo bacilo da tuberculose nos Estados Unidos: 1 - Uso de medidas administrativas para reduzir o risco da exposição a pessoas que possuem TB ativa; 2 - Controles de engenharia para prevenir a disseminação e reduzir a concentração das gotículas e aerossóis infectantes; 3 - Uso de equipamento de proteção respiratória (EPR) em áreas e/ou procedimentos onde haja o risco de exposição ao bacilo.
- II - Doenças de transmissão respiratória por gotículas são aquelas que ocorrem pela disseminação de partículas maiores do que 5 µm, geradas durante tosse, espirro, conversação ou na realização de procedimentos de inalação, aspiração, etc.
- III - Doenças de transmissão respiratória por aerossóis são aquelas que ocorrem pela disseminação de partículas menores ou iguais a 5 µm, geradas durante tosse, espirro, conversação ou na realização de diversos procedimentos, entre os quais podem-se citar a broncoscopia, a indução de escarro, a nebulização ultrassônica e a necropsia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**14.** Embora a higienização das mãos seja considerada um dos pilares da prevenção e do controle de infecções dentro dos serviços de saúde, ainda que seja uma medida simples e primária, a adesão dos profissionais de saúde à higienização de forma constante e na rotina diária ainda é baixa. Sobre a higienização das mãos nos serviços de saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - A higienização apropriada das mãos é considerada a mais importante medida para reduzir a transmissão de infecções nos serviços de saúde. É reconhecidamente uma prática que reduz morbidade e mortalidade dos pacientes, mas também reduz os custos associados ao tratamento dos quadros infecciosos.
- II - As bactérias isoladas das mãos podem ser divididas em duas categorias: transitória e residente. A microbiota transitória, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos, com água e sabonete, por meio de fricção mecânica. A microbiota residente, que está aderida às camadas mais profundas da pele, é mais resistente à remoção apenas por água e sabonete e consiste de agentes mais prováveis de causar infecções veiculadas por contato.
- III- A definição de multirresistência é muito variável e depende da complexidade de cada hospital, mas, em geral, um micro-organismo é considerado multirresistente quando apresenta resistência a duas ou mais classes de antimicrobianos.
- IV- Dentre os principais micro-organismos multirresistentes que causam infecções relacionadas à assistência à saúde, o *Acinetobacter spp.* e a *Pseudomonas aeruginosa* resistentes aos carbapenems são particularmente problemáticos em hospitais do Brasil.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**15.** As diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes biológicos do Ministério da Saúde estabelecem critérios e condições técnicas, procedimentos e instalações físicas necessários para práticas seguras com agentes biológicos de risco relacionados à saúde humana e ao meio ambiente. Sobre essas diretrizes, considere as afirmações abaixo.

- I - Biossegurança pode ser definida como sendo a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente.
- II - Nesse sentido, perigo pode ser definido como qualquer componente químico, físico ou biológico que cause efeito adverso à saúde humana, animal e ambiental.
- III- Em alguns casos em que o trabalho com agente biológico inclui apenas diagnóstico, esse poderá ser realizado em um nível de contenção inferior, por exemplo: baciloscopia de *Mycobacterium tuberculosis*, realizada em laboratório NB 2, utilizando-se Cabine de Segurança Biológica (CSB), mesmo que esse agente seja classificado como Classe de Risco 4.
- IV- A virulência de um agente biológico pode ser avaliada por meio dos coeficientes de letalidade e de gravidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.



**16.** A Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia – visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Nessa perspectiva, considere as afirmações a seguir e assinale a correta.

- (A) Trabalhador jovem é todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de dezesseis anos.
- (B) Transporte manual de cargas é todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento, o transporte e a deposição da carga.
- (C) Quando um trabalhador retornar ao trabalho após qualquer tipo de afastamento, igual ou superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno imediato aos níveis de produção vigentes à época anterior ao afastamento.
- (D) As condições de trabalho, incluindo o acesso às instalações, mobiliário, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho, capacitação, condições sanitárias, programas de prevenção e cuidados para segurança pessoal devem levar em conta as necessidades dos trabalhadores com deficiência.
- (E) Nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, deduzida da jornada normal de trabalho.

**17.** Quadro clínico de perda da força em mãos com disestesias no primeiro, segundo e metade do terceiro dedo são compatíveis com diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo. Quais achados no exame físico e exame complementar mais se aproximam desse diagnóstico?

- (A) Teste de Finkelstein positivo e ecografia de punho com inflamação de extensores do carpo.
- (B) Teste de tinell positivo e eletroneuromiografia com lesão de nervo mediano.
- (C) Teste de Phalem negativo e ecografia de punho com aumento de espessura de nervo mediano.
- (D) Teste de Phalem positivo e eletroneuromiografia com lesão de nervo radial.
- (E) Teste de Cozen positivo e ecografia de punho com nervo mediano espessado.

**18.** A NR 15, anexo 14, classifica como insalubridade em grau máximo as operações ou trabalhos em contato permanente com as situações abaixo descritas, **EXCETO**:

- (A) animais deteriorados e exumação de corpos.
- (B) carnes, glândulas, vísceras e sangue de animais portadores de doenças infecciosas.
- (C) lixo urbano.
- (D) pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa.
- (E) galerias e tanques de esgoto.

**19.** Paciente, 42 anos, é internado em Emergência de hospital regional com quadro de dispneia severa, tosse, cefaleia, diarreia, vômitos e sensação de aperto no tórax. Durante internação, foi diagnosticado edema pulmonar. Os sintomas iniciaram após entrada em silo onde estava armazenado milho.

Qual substância abaixo relacionada, provavelmente, causou o quadro agudo do paciente acima?

- (A) Organofosforado.
- (B) Piretroide.
- (C) Fosfato de tributila.
- (D) Isopropil glicidil éter.
- (E) Hidrogênio fosforoso (fosfina).

**20.** A norma regulamentadora (NR) 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) prevê todos os itens abaixo descritos, **EXCETO**:

- (A) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
- (B) estratégia e metodologia de ação.
- (C) forma de registro e manutenção e divulgação dos dados.
- (D) avaliação dos riscos ambientais: químicos, físicos, biológicos e ergonômicos.
- (E) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

**21.** Considere os itens abaixo, de acordo com a NR 9, Programa de Prevenção de riscos ambientais, no que se refere às exigências mínimas para a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- I - Seleção do EPI, considerando-se a eficiência para o controle da exposição ao risco e o conforto, segundo avaliação do usuário.
- II - Caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores com a respectiva identificação dos EPI's utilizados para os riscos ambientais.
- III- Treinamento dos trabalhadores quanto a sua correta utilização, e orientação sobre as limitações de proteção do EPI.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**22.** Numere a coluna inferior, de acordo com a superior, associando o tipo de indicador biológico com os respectivos agentes químicos utilizados no processo analítico.

- (1) Indicador biológico capaz de mostrar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, designado como EE.
- (2) Indicador biológico que, além de mostrar exposição excessiva, tem também significado clínico ou toxicológico próprio, designado SC.
- (3) Indicador biológico que possui significado clínico ou toxicológico próprio, mas na prática, devido a sua curta meia-vida biológica deve ser considerado como EE, designado SC+.

- ( ) Ácido mandélico urinário
- ( ) Ácido hipúrico urinário
- ( ) Chumbo no sangue
- ( ) Carboxihemoglobina no sangue
- ( ) Acetil-colinesterase no sangue

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses da segunda coluna, de cima para baixo.

- (A) 1 – 1 – 2 – 3 – 2.
- (B) 1 – 2 – 3 – 1 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 2 – 2 – 1 – 1.
- (E) 2 – 1 – 1 – 2 – 3.

**23.** Considere os itens abaixo no que se refere à perda auditiva.

- I - irreversibilidade.
- II - progressão gradual com o tempo de exposição.
- III- frequências mais altas e mais baixas não são afetadas.
- IV- pode ser potencializada por exposição a produtos químicos.

Quais descrevem características relacionadas com a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**24.** O atestado de saúde ocupacional (ASO), de acordo com a NR 7, deve respeitar as seguintes condições, **EXCETO**:

- (A) ser feito em duas vias.
- (B) conter o resultado dos exames médicos realizados.
- (C) apresentar definição de apto ou inapto.
- (D) explicitar nome do médico examinador e forma de contato.
- (E) explicitar nome do médico coordenador com o respectivo CRM.

**25.** Considere as afirmativas abaixo sobre a NR 35 que trata do trabalho em altura. De acordo com essa norma, cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividade em altura, garantindo que:

- I - os exames e a sistemática de avaliação constem no PCMSO.
- II - a avaliação seja realizada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação.
- III- o exame médico seja voltado para patologias que possam causar mal súbito e quedas de altura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**26.** No que se refere ao uso do conjunto de microfone e fone de ouvido (*head-sets*) nas empresas, considere as diretrizes abaixo, segundo a NR 17.

- I - Possibilidade de ajuste individual da intensidade sonora.
- II - Uso individual.
- III- Dispositivos de operações e controles de fácil uso e alcance.
- IV- Proibição do fornecimento para cada posto de trabalho, mesmo que as partes que permitam contágio sejam substituídas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**27.** Considere as afirmações abaixo sobre as condições padronizadas para a correta aferição da pressão arterial.

- I - O paciente deve estar sentado, com braço apoiado na altura do precórdio, a câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço.
- II - A média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia; se os valores observados diferirem em mais de 5 mmHg, medir novamente.
- III- Na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; se discrepantes, considerar a valor mais baixo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**28.** Paciente de 35 anos apresenta quadro clínico de início súbito, temperatura de 39°C, dor pleurítica, tosse produtiva e história recente de infecção de vias aéreas superiores. Qual das alternativas abaixo está **INCORRETA**?

- (A) A radiografia de tórax permite firmar o diagnóstico de pneumonia e fornece indicações para determinação da gravidade.
- (B) Um nível elevado de proteína C-reativa é um indicador sensível no diagnóstico de pneumonia.
- (C) O hemograma não acrescentará informações relevantes para o manejo do paciente.
- (D) A avaliação de comorbidades e anormalidades no exame clínico auxiliam a classificação de gravidade.
- (E) O manejo do paciente deverá incluir cessação do fumo, repouso e hidratação adequada.

**29.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando classe de fármacos para tratamento de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia com os potenciais efeitos adversos.

- (1) Estatinas
- (2) Tiazídicos
- (3) Inibidores da enzima conversora de angiotensina
- (4) Bloqueadores do canal de cálcio
- (5) Sulfonilureias
- (6) Biguanidas

- ( ) Hipoglicemia
- ( ) Desconforto abdominal e diarreia
- ( ) Edema periférico
- ( ) Hipercalemia
- ( ) Alteração de enzimas hepáticas
- ( ) Hiperuricemia

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 6 – 4 – 3 – 1 – 2.
- (B) 5 – 6 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 5 – 6 – 2 – 4 – 3 – 1.
- (D) 6 – 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 6 – 5 – 3 – 2 – 1 – 4.

**30.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os achados clínicos com o diagnóstico mais provável.

- (1) Dor torácica retroesternal que alivia com repouso.
- (2) Dor torácica aguda, contínua, ventilatório-dependente, que melhora com o corpo flexionado para frente.
- (3) Dor torácica pleurítica associada à taquipneia, hemoptise e apreensão.
- (4) Dor pleurítica, ventilatório-dependente.
- (5) Dor torácica persistente, associada a parestesias em extremidades bilaterais.

- ( ) Embolia pulmonar
- ( ) Angina estável
- ( ) Pericardite
- ( ) Pneumonia
- ( ) Dor torácica psicogênica

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
- (B) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- (C) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- (E) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

**31.** É considerado sinal da Síndrome de Quervain:

- (A) dor nos flexores do carpo e nos dedos, percebida na face ventral do punho.
- (B) dor no trajeto do abductor longo do polegar, quando o paciente prende firmemente os dedos sobre o polegar e flexiona a mão em desvio cubital.
- (C) dor no dorso do polegar que se irradia para o processo estilóide do rádio, podendo atingir até o ombro.
- (D) flexão do punho em 90°, durante 1 minuto, com presença de hipoestesia e parestesia na área innervada pelo mediano.
- (E) dor nos extensores do carpo e nos dedos, percebida na face dorsal do punho.

**32.** Considere as afirmações abaixo sobre dor lombar.

- I - A espondilite anquilosante deve ser considerada em pacientes com dor lombar crônica de início insidioso e sacroileíte bilateral.
- II - A ausência de dor e parestesias abaixo dos joelhos reduz a probabilidade de que hérnia de disco ou estenose espinhal sejam as causas dos sintomas.
- III- O principal objetivo do manejo da dor lombar aguda (até 12 semanas) é o alívio da dor, sendo fundamental a definição do diagnóstico específico para escolha da medicação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**33.** Considere as afirmações abaixo sobre a proteção ao trabalho da mulher, de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (C.L.T.).

- I - É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
- II - É vedado exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.
- III- A empregada que adotar uma criança de até 1(um) ano de idade, terá direito a 120 dias de licença-maternidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**34.** Considere as afirmações sobre os benefícios previdenciários, de acordo com a Lei n.º 8213, de dezembro de 1991, e suas alterações posteriores.

- I - O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício.
- II - A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
- III- O valor da aposentadoria, por invalidez, do segurado que necessita da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 10% (dez por cento).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**35.** De acordo com o protocolo de tratamento de influenza do Ministério da Saúde, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A síndrome gripal é definida para indivíduos maiores de seis meses de idade que apresentem febre de início súbito, acompanhado de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia.
- (B) O período de incubação dura de um a quatro dias.
- (C) Anemia falciforme e transtornos neurológicos como epilepsia são fatores de risco para complicações.
- (D) A dose para tratamento de Oseltamivir para adultos é de 75 mg, 2 vezes ao dia, por 5 dias.
- (E) Em pacientes com fatores de risco para complicações, deve-se iniciar o tratamento com Oseltamivir imediatamente após a confirmação laboratorial.

**36.** Em relação à exposição a substâncias químicas, de acordo com o Manual de Interpretação de Informações Químicas – Fundacentro, é correto afirmar:

- (A) o odor é um sinal de presença de substância química no ambiente, mas não deve ser usado como alerta para hora de troca do respirador.
- (B) a maioria das substâncias químicas tem um indicador biológico que se correlaciona quantitativamente à exposição ocupacional.
- (C) a monitorização biológica de exposição deve ser feita independentemente da existência de um índice biológico confiável.
- (D) zinco, cobre e manganês devem ser monitorados porque possuem índice biológico confiável.
- (E) o limite de tolerância de uma substância química representa uma linha fina de separação entre um ambiente saudável e não saudável.



**37.** De acordo com o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, são medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes as abaixo descritas, **EXCETO**:

- (A) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível.
- (B) adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte).
- (C) adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.
- (D) mudanças na organização e nas práticas de trabalho.
- (E) estabelecer medidas disciplinares pelo não cumprimento das normas.

**38.** Uma análise adequada dos acidentes de trabalho revela a rede de circunstâncias em interação e evidencia \_\_\_\_\_. Análises que se encerram nos \_\_\_\_\_ não contribuem para evitar que outros acidentes ou incidentes ocorram. Os fatores latentes geradores de eventos adversos são quase invariavelmente falhas de gestão \_\_\_\_\_ ou de planejamento. Investigações que concluem que falhas \_\_\_\_\_ causaram eventos adversos, além de óbvias, são frágeis tecnicamente, inadequadas e superficiais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto acima.

- (A) fatores subjacentes e latentes – fatores imediatos – organizacionais – humanas
- (B) falhas – fatores subjacentes – humanas – organizacionais
- (C) falha humana – fatores organizacionais – técnicas – de gestão
- (D) fatores imediatos – fatores organizacionais – comunicação – operacionais
- (E) fatores subjacentes e humanos – fatores organizacionais – comunicação – humanas

**39.** São fatores de risco para complicações da influenza, os abaixo descritos, **EXCETO**:

- (A) gravidez em qualquer idade gestacional.
- (B) hipertensão arterial.
- (C) uso prolongado de ácido acetil salicílico por indivíduos com menos de 19 anos de idade.
- (D) idade abaixo de dois anos.
- (E) obesidade.

**40.** São considerados fatores que aumentam a susceptibilidade à exposição ao ruído, **EXCETO**:

- (A) exposição simultânea à vibração.
- (B) hipertensão.
- (C) indivíduos com perda auditiva tipo condutivo.
- (D) traumatismos de crânio.
- (E) diabetes.