



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

# CADERNO DE QUESTÕES

## EDITAL 05/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 44 - ENFERMEIRO I

### Pediatria

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 05/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 44


##### ENFERMEIRO I – Pediatria

01.	B	11.	A	21.	A	31.	A
02.	C	12.	D	22.	D	32.	E
03.	D	13.	E	23.	B	33.	C
04.	D	14.	E	24.	B	34.	B
05.	E	15.	E	25.	A	35.	E
06.	E	16.	A	26.	D	36.	A
07.	D	17.	E	27.	A	37.	C
08.	D	18.	C	28.	D	38.	D
09.	D	19.	C	29.	C	39.	C
10.	ANULADA	20.	C	30.	D	40.	B

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de 40 (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato

**Boa Prova!**



**01.** Considerando a criança e o processo de morte e luto, é correto afirmar que

- (A) a reação da criança à enfermidade ou incapacidade independe do seu nível evolutivo, de mecanismos de enfrentamento, de reação individual e da própria doença.
- (B) os irmãos têm necessidades especiais, inclusive a necessidade de informações, de se assegurarem de que não são responsáveis pela doença ou morte do irmão e precisam de apoio para o seu próprio processo de luto.
- (C) as crianças entre 9 e 10 anos de idade vêem a morte como algo temporário e reversível e o que mais temem é a separação.
- (D) as crianças pequenas têm consciência de que a morte é irreversível, universal e inevitável, mas podem resistir ao pensamento de sua própria morte.
- (E) as reações das famílias à incapacidade ou doença crônica se manifestam nos seguintes estágios: reconhecimento, reintegração, negação, choque e adaptação.

**02.** Segundo Bonassa (2005), existem regras para o manuseio correto dos cateteres. Considere as orientações abaixo com relação ao manuseio.

- I - Sempre limpar a conexão do cateter e as tampas puncionáveis com antisséptico apropriado antes de acessar o sistema.
- II - Com relação a películas transparentes, sugere-se respeitar rigorosamente a rotina de troca de curativos a cada 72 horas, mesmo que estes estejam sujos ou úmidos.
- III- A lavagem rigorosa das mãos imediatamente antes e após o manuseio de cateteres é fundamental, para a prevenção de infecções.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**03.** A enfermeira, ao desenvolver o plano assistencial para uma criança com câncer, deve saber que a complicação mais freqüente nesses casos é a

- (A) insuficiência cardíaca.
- (B) desnutrição.
- (C) insuficiência respiratória.
- (D) infecção.
- (E) hemorragia.

**04.** A mucosite é uma inflamação da mucosa oral. Assinale a alternativa que apresenta os sintomas da mucosite.

- (A) Dor, náuseas, diarreia, vômitos e hiperemia.
- (B) Ulceração, dor, diarreia, sialorreia e edema.
- (C) Hiperemia, ulceração, dor, vômitos e infecção secundária.
- (D) Hiperemia, edema, ulceração, dor e sialorreia.
- (E) Hemorragia, sialorreia, diarreia, náuseas e edema.

**05.** Considere as seguintes afirmativas sobre a dor em pediatria.

- I - A dor é multifatorial e inclui componentes sensoriais, afetivos, comportamentais, cognitivos, sócio-culturais e psicológicos, que devem ser verificados.
- II - As informações verbais e a descrição da dor pelas crianças são os fatores mais importantes na avaliação da dor.
- III- Para se obter a classificação mais confiável da intensidade da dor, deve-se selecionar uma escala que seja adequada à idade, às capacidades e à preferência da criança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**06.** De acordo com o uso de escalas para avaliação da dor, considere as afirmações abaixo.

- I - A escala numérica é indicada para crianças maiores de 5 anos de idade, que consigam ter alguma noção de números e seus valores em relação a outros números.
- II - A escala de faces é indicada para crianças a partir de 3 anos de idade.
- III- A escala análogo-visual é indicada preferencialmente para crianças a partir de 7 anos de idade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III.

**07.** De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1996), tratamento paliativo é definido como cuidados ativos totais de pacientes cuja enfermidade não responde a um tratamento curativo. Em relação a esta modalidade de cuidados, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A morte de uma criança é um evento estressante para a família porque está fora da ordem natural das coisas.
- (B) O tratamento paliativo busca criar um ambiente terapêutico, tão doméstico quanto possível, caso não ocorra na própria casa da criança.
- (C) As crianças precisam de informações honestas sobre a sua doença, sendo estas informações dadas em linguagem clara e simples.
- (D) A intervenção no tratamento paliativo tem a finalidade de encurtar a vida, promovendo a melhor qualidade de vida durante o tempo restante.
- (E) Quando uma criança está em cuidados paliativos é eticamente aceitável suspender tratamentos que possam causar dor e sofrimento, priorizando o conforto e a qualidade de vida.

**08.** Com relação ao HIV/AIDS, considere as afirmações abaixo.

- I - A transmissão horizontal ocorre devido à exposição a sangue ou fluidos corporais, por contato sexual ou por via parenteral.
- II - A transmissão perinatal ocorre quando uma grávida infectada pelo HIV passa a infecção para o seu filho.
- III- O vírus HIV ataca a célula T CD<sub>4</sub><sup>+</sup> usando-a para se replicar, tornando-a não funcional. A contagem destas células sobe gradualmente, levando à imunodeficiência progressiva, chegando a uma contagem que ocasiona riscos para o surgimento de doenças oportunistas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**09.** O tratamento da Leucemia inclui o uso de agentes quimioterápicos com ou sem irradiação, em quatro fases distintas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as fases do tratamento com a sua caracterização.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) terapia de indução</li> <li>(2) terapia de intensificação</li> <li>(3) terapia de manutenção</li> <li>(4) terapia profilática do SNC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Também chamada de consolidação, tem como objetivo eliminar células leucêmicas residuais.</li> <li>( ) Previne a invasão do SNC por células leucêmicas.</li> <li>( ) Ocorre após a consolidação, diminuindo ainda mais o número de células leucêmicas.</li> <li>( ) Tem duração de 4 a 6 semanas, objetivando produzir a remissão completa com menos de 5% de células leucêmicas na medula óssea.</li> </ul> |
|--|--|

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1 – 4.
- (C) 1 – 4 – 3 – 2.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

**10.** Considere as afirmativas a respeito de linfomas e leucemias na infância/adolescência.

- I - A leucemia é uma proliferação irrestrita de leucócitos imaturos nos tecidos hematopoiéticos do organismo.
- II - Os três principais sintomas mais frequentes na leucemia são anemia, infecção e sangramento, sendo o transplante de medula óssea o tratamento mais indicado para esta doença.
- III- Os linfomas surgem no sistema linfático e hematopoiético, dividindo-se em Linfoma de Hodgkin e Linfoma não-Hodgkin (LNH).
- IV- O LNH possui características semelhantes à leucemia, ocorrendo com mais frequência em crianças do que a doença de Hodgkin. Seu tratamento segue fases semelhantes ao tratamento da Leucemia Linfocítica Aguda (LLA).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.



**11.** Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Brasil, 1990), “as instituições de atendimento de saúde deverão proporcionar \_\_\_\_\_ para a \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ de um dos pais ou responsáveis, nos casos de \_\_\_\_\_.”

Assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas da frase acima.

- (A) condições – permanência – tempo integral – criança ou adolescente
- (B) locais – visita - tempo restrito – crianças pequenas
- (C) condições – visita – tempo restrito – criança ou adolescente
- (D) ambiente – permanência – tempo integral – lactentes
- (E) locais – visita – tempo restrito – adolescentes

**12.** Considere as afirmações abaixo sobre o Direito à vida e à saúde estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.

- I - A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante efetivação de programas sociais privados que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
- II - Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
- III- Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**13.** Considere as afirmações abaixo sobre a participação da família durante a internação hospitalar da criança.

- I - Incorporar a família no cuidado à criança visa auxiliá-la na superação das dificuldades de adaptação e na manutenção do vínculo afetivo.
- II - Envolver a família no cuidado possibilita conhecer e reconhecer as potenciais habilidades e demandas de orientação sob o prisma de educação para a saúde.
- III- A família, reconhecida como a unidade que cuida de seus membros, é considerada o principal agente socializador da criança e a responsável pela formação dos referenciais de vida que possibilitem enfrentar as mudanças, inclusive em situações de doença.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**14.** Sobre o Calendário Básico de Vacinação da Criança, está correto afirmar que

- (A) a primeira dose da vacina contra Hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 72 horas de vida do recém-nascido.
- (B) o esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a Vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Viral. O primeiro reforço é aos 24 meses e o segundo, entre 4 a 6 anos.
- (C) a Vacina contra Febre Amarela está indicada para todas as crianças, independentemente da área de residência, a partir dos 9 meses de idade.
- (D) o esquema básico da vacina contra Hepatite B constitui-se de duas doses com intervalo de 60 dias.
- (E) o intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano é de 4 semanas.

**15.** Sobre os Diagnósticos de Enfermagem, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) são interpretações científicas de dados levantados, usados para orientar o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação.
- (B) as intervenções de enfermagem para os diagnósticos das respostas humanas oferecem meios adicionais, além do tratamento dos problemas médicos, a partir do que a saúde das pessoas pode ser promovida, protegida e recuperada.
- (C) habilidades cognitivas de análise, raciocínio lógico e aplicação de padrões são somente três dos processos de pensamento necessários para um diagnóstico preciso em enfermagem.
- (D) são mais bem utilizados por enfermeiros com habilidade interpessoal apurada, especialmente por meio da escuta.
- (E) os dados levantados, gerados por uma revisão dos sistemas biológicos, são suficientes para destacar os dados necessários para os diagnósticos de enfermagem.

**16.** Assinale a alternativa correta no que se refere ao desenvolvimento motor grosso do lactente.

- (A) Por volta dos três meses de vida, os lactentes podem sustentar bem suas cabeças além do plano do corpo e, por volta dos quatro a seis meses de vida, o controle da cabeça já está bem estabelecido.
- (B) O recém-nascido a termo pode sustentar, momentaneamente, a cabeça na linha média e em paralelo quando o corpo está deitado em decúbito ventral sobre um travesseiro.
- (C) O recém-nascido pode rolar acidentalmente por causa do seu dorso arredondado. A capacidade de girar da posição de decúbito ventral para a de decúbito dorsal ocorre por volta dos três meses.
- (D) É recomendado colocar os lactentes para dormir de lado, pois podem facilmente rolar para a posição de decúbito ventral.
- (E) Durante os primeiros meses de vida, o dorso é uniformemente arredondado e, quando a criança começa a sentar, por volta dos três meses, a curvatura lombar convexa aparece. Assim conforme a coluna se retifica, o lactente pode ser colocado sentado, sendo que, por volta dos quatro meses de vida, já pode sentar-se sozinho.

**17.** Assinale a alternativa correta no que se refere aos cuidados à criança com alteração neurológica.

- (A) Nas crianças comatosas, o controle da dor é restrito, pois não se detectam alterações que possibilitem esta avaliação.
- (B) A efetividade respiratória é a principal preocupação no cuidado à criança inconsciente, sendo realizada fisioterapia respiratória regularmente, evitando alterar a posição do paciente para prevenir complicações pulmonares.
- (C) A nutrição é fornecida em uma fórmula balanceada, administrada por sonda. A sonda nasogástrica é fixada com fita adesiva para prevenir a pressão sobre as narinas, sendo substituída de acordo com protocolo da unidade e mantida na narina em uso.
- (D) Os pais precisam de intervenções de enfermagem mais intensivas durante o período de crises e incertezas. Durante a fase de recuperação, devem receber informações, as quais devem ser esclarecidas. Não devem ser estimulados a se envolver nos cuidados com a criança.
- (E) A criança em estado de coma mais profundo deve ser posicionada de modo a prevenir a aspiração de secreções, e o estômago deve ser esvaziado para reduzir a probabilidade de vômitos.

**18.** No que se refere ao cuidado da criança com bronquiolite, assinale a alternativa correta.

- (A) A bronquiolite é uma infecção viral aguda com efeito máximo no nível bronquiolar. A infecção é rara nas crianças com menos de dois anos.
- (B) Crianças admitidas no hospital com suspeita de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) não devem ficar com outras crianças infectadas pelo VSR, pois a transmissão é somente por via respiratória.
- (C) O VSR é responsável por 80%, ou mais, dos casos de bronquiolites durante os períodos endêmicos. Ele é considerado o patógeno respiratório isolado mais importante entre os lactentes e no início da infância.
- (D) Lactentes com menos de três meses de idade apresentam uma taxa de infecção respiratória mais elevada, a qual diminui dos três aos seis meses.
- (E) A desidratação é, frequentemente, um perigo quando a criança está febril e inapetente, especialmente quando vômitos e diarreia estão presentes, sendo indicada a hidratação oral na crise aguda da doença.

**19.** Na fase clônica das convulsões tônico-clônicas, são comuns as seguintes manifestações:

- (A) os olhos do paciente viram para cima e há a perda imediata da consciência.
- (B) os braços do paciente ficam geralmente flexionados; as pernas, a cabeça e o pescoço, estendidos.
- (C) o paciente apresenta movimentos descontrolados e violentos, causados pela contração e pelo relaxamento rítmicos do tronco e dos membros, podendo ocorrer incontinência urinária e fecal.
- (D) o paciente pode despertar em alguns minutos, permanecendo confuso por muitas horas.
- (E) o paciente pode emitir um choro agudo peculiar, apneico, e pode tornar-se cianótico.

**20.** As alternativas abaixo apresentam direitos da criança e do adolescente hospitalizados segundo a resolução nº 41 de 13 de Outubro de 1995 (Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados), **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência no hospital.
- (B) Não permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão alheia ao melhor tratamento de sua enfermidade.
- (C) Não suspensão do poder familiar frente à falta ou carência de recursos materiais dos pais.
- (D) Não ser separado da mãe ao nascer.
- (E) Não sentir dor quando existe meio de evitá-la.

**21.** Com relação ao desenvolvimento e crescimento da criança em fase pré-escolar, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a idade com a habilidade esperada.

- (1) Idade mínima: 3 anos
  - (2) Idade mínima: 4 anos
  - (3) Idade mínima: 5 anos
- ( ) É capaz de saltar e pular com somente um pé.
  - ( ) Arremessa bola sobre a cabeça.
  - ( ) Salta e pula com pés alternados.
  - ( ) Anda de triciclo.
  - ( ) Arremessa e agarra a bola com firmeza.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 2 – 3 – 1 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3 – 1 – 3.
- (C) 1 – 1 – 2 – 3 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2 – 3 – 3.
- (E) 1 – 3 – 1 – 1 – 2.

**22.** Sobre a coleta de amostras de urina, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A coleta de urina de 24 horas sempre começa e termina com a bexiga vazia; portanto, no momento em que se inicia esta coleta, a criança é instruída a urinar, sendo desprezada a amostra pré-coleta.
- (B) O termo "amostra de jato médio" refere-se à amostra de urina coletada após o meato uretral ter sido limpo e os primeiros mililitros terem sido desprezados.
- (C) A aspiração supra-púbica é útil no esclarecimento do diagnóstico de suspeita de infecção do trato urinário em neonatos.
- (D) Cateterizar uma criança requer técnica asséptica, boa iluminação e limpeza suave e completa da vulva ou da glândula. A maioria das crianças, inclusive lactentes femininas, acomodam um cateteres de número de 08 a 12.
- (E) Pode-se confiar em que algumas crianças maiores, em idade escolar e adolescentes, tenham a responsabilidade pela coleta de suas próprias amostras de 24 horas.

**23.** São manifestações clínicas da cirrose e da atresia biliar extra-hepática:

- (A) icterícia e anemia.
- (B) icterícia e retardo do crescimento.
- (C) letargia e urina escura.
- (D) constipação e irritabilidade.
- (E) prurido e icterícia.

**24.** O opistótono é uma atitude contratural comum que se caracteriza por:

- (A) criança em decúbito dorsal, imóvel e rígida no leito, contratura generalizada dos músculos.
- (B) criança em decúbito dorsal, praticamente apoiada em dois pontos (cabeça e calcâneo). Envolve todos os músculos do corpo, parecendo um arco.
- (C) criança sentada sobre os calcanhares, cabeça para trás, formando um arco.
- (D) criança com contratura em musculatura cervical e dorsal, cabeça voltada para trás e membros inferiores fletidos.
- (E) criança em decúbito ventral, cabeça voltada para trás, músculos contraídos e com grande mobilidade.

**25.** Em relação à observação e aos cuidados de pacientes no pós-operatório de cirurgia neurológicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Pupilas desiguais, dilatadas, são um alerta para a enfermagem.
- (B) Pressão intracraniana deve ser monitorizada a cada três horas.
- (C) Não há necessidade de verificação de temperatura.
- (D) Sinais de drenagem em curativos não são importantes e relevantes.
- (E) Sinais vitais devem ser verificados de duas em duas horas.

**26.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando as manifestações clínicas da insuficiência renal aguda com sua especificidade ou inespecificidade.

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| (1) manifestação inespecífica | ( ) Náusea      |
| (2) manifestação específica   | ( ) Edema       |
|                               | ( ) Sonolência  |
|                               | ( ) Hipertensão |
|                               | ( ) Oligúria    |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (C) 2 – 2 – 1 – 2 – 2.
- (D) 1 – 1 – 1 – 1 – 2.
- (E) 2 – 2 – 2 – 2 – 1.

**27.** Sobre a Doença de Hirschsprung na segunda infância, está **INCORRETO** afirmar que apresenta como manifestação clínica

- (A) vômitos biliosos.
- (B) distensão abdominal.
- (C) constipação.
- (D) peristalse visível.
- (E) sinais de anemia e desnutrição.

**28.** Considere as afirmações abaixo sobre diabetes.

- I - O diabetes tipo 1 caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, que produzem insulina.
- II - O diabetes tipo 2 geralmente surge devido à resistência contra a insulina, de forma que o organismo não é capaz de utilizar a insulina adequadamente.
- III- Na criança com diabetes, o exercício deve ser restringido, para evitar a redução dos níveis plasmáticos de glicose.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**29.** Sobre os cuidados com diabetes e insulino terapia, assinale a alternativa correta.

- (A) A insulina é disponibilizada apenas em preparação de ação curta (regular) e intermediária (NPH e lenta).
- (B) A insulina deve ser armazenada no refrigerador, mantendo uma temperatura abaixo de 2° C.
- (C) Para uma amostra de sangue para monitoramento da glicose, devemos priorizar o dedo anular ou o polegar, puncionando-o na lateral.
- (D) Quando a dose de insulina a ser preparada requer a injeção de ação curta e intermediária ao mesmo tempo, devemos injetar primeiro a de ação intermediária e depois a de ação curta.
- (E) O nível de glicose na faixa euglicêmica é de 60 a 140mg/dl.

**30.** Considere as afirmações abaixo sobre cuidados com aspiração de vias aéreas.

- I - Ao aspirarmos as vias aéreas de uma criança, devemos ser breves, não demorando mais que 5 segundos, deixando-a descansar por 30 a 60 segundos depois de cada aspiração.
- II - Os sinais de muco ocluindo parcialmente as vias aéreas incluem aumento da frequência respiratória, queda de saturação e cianose.
- III- A aspiração da cânula de traqueostomia é um cuidado de enfermagem que deve ser realizado em horários pré-determinados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.



**31.** A Fibrose cística se caracteriza por diversos aspectos clínicos: viscosidade \_\_\_\_\_ das secreções das glândulas mucosas, \_\_\_\_\_ dos eletrólitos no suor, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ tanto na saliva quanto no suor.

Assinale a alternativa que completa, adequadamente, as lacunas da frase acima.

- (A) aumentada – elevação – aumento – sódio – cloro
- (B) reduzida – diminuição – diminuição – sódio – cloro
- (C) aumentada – elevação – diminuição – sódio – potássio
- (D) reduzida – diminuição – aumento – sódio – cloro
- (E) aumentada – diminuição – aumento – sódio – potássio

**32.** Em relação à desnutrição proteicocalórica, assinale a alternativa correta.

- (A) A falta de comida é a principal causa da desnutrição proteicocalórica.
- (B) A criança com *Kwashiorkor* apresenta extremidades finas, enfraquecidas, abdome proeminente, com ausência de atrofia muscular.
- (C) O Marasmo resulta de uma desnutrição apenas por falta de proteínas.
- (D) As formas mais leves da desnutrição são o *Kwashiorkor* e o Marasmo.
- (E) No tratamento da desnutrição proteicocalórica, é primordial a proteção contra infecções, a hidratação adequada, o tratamento da pele e a restauração da integridade fisiológica.

**33.** Em relação ao Controle de Infecção Hospitalar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para evitar o risco de infecção hospitalar é necessário conhecer as fontes de infecção, os potenciais hospedeiros e os meios de transmissão.
- (B) A falha no processo de limpeza, desinfecção e esterilização pode contribuir diretamente como causa de infecções hospitalares.
- (C) "Desinfecção" é o processo de destruição de todos os microorganismos, inclusive os esporulados.
- (D) Materiais críticos são aqueles que têm contato com tecidos estéreis, utilizados em procedimentos em que há penetração na pele e nas mucosas, atingindo os tecidos subepiteliais e o sistema vascular.
- (E) Para desinfecção de alto nível de materiais classificados como semicríticos, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar recomenda o uso de Glutaraldeído a 2% e Ácido Peracético a 0,2%.

**34.** Em relação ao Choque, assinale a afirmativa correta.

- (A) No Choque Hipovolêmico, ocorre aumento de pressão arterial.
- (B) Uma das causas mais frequentes do Choque Cardiogênico é a falência primária da bomba, podendo ocorrer arritmias.
- (C) Alcalose Metabólica e Bradipneia são manifestações clínicas do choque na sua forma descompensada.
- (D) A ação inicial na criança em choque consiste na obtenção de um acesso venoso calibroso.
- (E) A Anafilaxia não é considerada uma forma de choque.

**35.** Considere as afirmações abaixo sobre Choque.

- I - São critérios de definição da Síndrome do Choque Tóxico: febre alta, hipotensão, envolvimento de três ou mais sistemas orgânicos.
- II - Podem ser citadas como manifestações clínicas do choque: confusão e sonolência, turgor cutâneo diminuído, enchimento capilar deficiente.
- III- O tratamento de emergência do choque compreende ventilação, administração de líquidos, suporte cardiovascular, administração de medicação específica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III.

**36.** Em relação à entubação do paciente pediátrico, assinale a alternativa correta.

- (A) Cabe à enfermagem o posicionamento da criança, a seleção do material de entubação, a aferição e a disponibilização de fontes de aspiração e oxigênio, o preparo e a administração de medicações específicas solicitadas pela equipe médica, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual.
- (B) Durante o procedimento de entubação, não é necessária a monitorização do paciente, sendo essa instalada logo após o término do procedimento.
- (C) A confirmação da posição correta do tubo endotraqueal é feita pelo enfermeiro.
- (D) Espaço morto do tubo endotraqueal corresponde à medida do tubo desde a comissura labial ou narina até a epiglote.
- (E) Não é recomendado o esvaziamento gástrico no momento da entubação traqueal pois, na instalação da sonda nasogástrica, o paciente poderá apresentar vômito e consequente aspiração, o que poderá agravar seu estado.

**37.** Em relação à Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A parada respiratória frequentemente antecede a parada cardíaca em pacientes pediátricos.
- (B) O "A B C" do atendimento em PCR se refere à permeabilidade das vias aéreas, ao reestabelecimento da respiração e à ação na circulação sanguínea, respectivamente.
- (C) Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a parada cardíaca é a cessação da atividade mecânica cardíaca determinada pela incapacidade de resposta ao chamado, ausência de pulso central, com preservação da função respiratória.
- (D) Alterações do nível de consciência, retrações torácicas, estridor laríngeo, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca alterada, palidez e moteamento são situações clínicas associadas ao risco de PCR.
- (E) Na massagem cardíaca do lactente, é utilizada a técnica dos dois polegares, com as mãos circundando o tórax da criança, para a efetivação das compressões torácicas.

**38.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os métodos de administração de oxigênio com sua descrição.

- (1) cateter nasal tipo óculos
  - (2) CPAP
  - (3) máscara de Venturi
  - (4) máscara de não reinalação
  - (5) ventilação mecânica invasiva
- ( ) Consiste no fornecimento fixo de determinadas pressões tanto na inspiração quanto na expiração, em pacientes que têm ventilação espontânea.
  - ( ) Hipoventilação e apneia são casos para sua indicação.
  - ( ) É possível a oferta de concentrações de oxigênio de baixo e de alto fluxo, permitindo obter concentrações de oxigênio entre 25 e 60%.
  - ( ) O oxigênio é administrado com fluxo baixo.
  - ( ) Durante a inspiração do paciente, uma pressão negativa na máscara fecha a válvula expiratória; ao mesmo tempo, a válvula inspiratória se abre, oferecendo oxigênio ao paciente.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- (B) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (D) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- (E) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

**39.** Serviços de atendimento pediátrico que primam pelo cuidado humanizado, zelam pelo conforto e bem-estar da criança acima de tudo, sendo os cuidados prescritos de forma a evitar os maus tratos institucionais. Segundo Kendrick & Taylor (2000), "maus-tratos institucionais são definidos como \_\_\_\_\_ automatizados e consagrados pelo uso que se constituem em flagrante \_\_\_\_\_ aos \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_".

Assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas da frase acima.

- (A) princípios – prejuízo – costumes – cliente
- (B) indicativos assistenciais – agravo – projetos – paciente ambulatorial
- (C) processos hospitalares – desrespeito – direitos – paciente hospitalizado
- (D) projetos assistenciais – agravo – benefícios – paciente hospitalizado
- (E) processos domiciliares – abuso – direitos – profissional da saúde

**40.** As infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades são regidas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 240/2000). Considere as afirmações abaixo sobre as penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.

- I - A advertência verbal consiste em repreensão divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
- II - A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01(um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- III- A suspensão consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.