

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS



## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 04/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 66 - ENFERMEIRO I (Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Centro Cirúrgico Ambulatorial e/ou Centro de Material e Esterilização)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n.º: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 04/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 66

**ENFERMEIRO I (Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Centro Cirúrgico Ambulatorial e/ou Centro de Material e Esterilização)**

01.	E	11.	D	21.	C	31.	E
02.	D	12.	E	22.	B	32.	D
03.	E	13.	B	23.	B	33.	B
04.	B	14.	C	24.	E	34.	D
05.	D	15.	E	25.	C	35.	B
06.	ANULADA	16.	A	26.	C	36.	A
07.	A	17.	D	27.	E	37.	B
08.	D	18.	C	28.	B	38.	D
09.	C	19.	C	29.	D	39.	E
10.	E	20.	E	30.	D	40.	A



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS



# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 6.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1 (uma) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova 1h30min após o início.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme subitem 6.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** Por determinação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em janeiro de 2000, foi normatizado que toda instituição de saúde utilize a sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Considerando que sua implementação se constitui efetivamente na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, assinale a alternativa que **NÃO** contém nenhuma etapa definida segundo o SAE.

- (A) Visita pré-operatória de enfermagem.
- (B) Planejamento de assistência perioperatória.
- (C) Implementação da assistência.
- (D) Avaliação da assistência – visita pós-operatória de enfermagem.
- (E) Reformulação da assistência a ser planejada, sem levar em conta os resultados obtidos.

**02.** Considere as afirmativas abaixo referentes ao glutaraldeído.

- I - É um desinfetante de alto nível, utilizado em materiais semicríticos.
- II - O tempo de seu processamento é de 20 minutos.
- III - É utilizado como um desinfetante de alto nível em equipamentos médicos como endoscópios, terapia respiratória, transdutores e equipamentos de hemodiálise.
- IV - A exposição ao glutaraldeído acima de 0,2 ppm é irritante para os olhos, garganta e nariz.
- V - Pode ser utilizado em máquinas lavadoras de endoscópios.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**03.** O garrote pneumático é utilizado com o objetivo de ocluir o fluxo sanguíneo para uma extremidade corporal. Com relação ao seu uso, qual das alternativas está **INCORRETA**?

- (A) É contraindicado em casos de infecção na extremidade, circulação prejudicada, extremidade com fístula artereovenosa e tromboembolismo venoso.
- (B) Não insuflar com óxido nitroso ou oxigênio, devido ao risco de incêndio.
- (C) Não mover o garrote após a insuflação, se for necessário recolocar, desinflar e mudar a posição.
- (D) Monitorar o paciente a cada 15 minutos após a desinsuflação do garrote, dando atenção aos sinais vitais, condições de pele no local do garroteamento (temperatura, cor, integridade) e pulso distal.
- (E) Infundir o antibiótico profilático, quando for indicado, após insuflação do garrote.

**04.** O *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) conceitua a infecção do sítio cirúrgico como aquela que ocorre como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, os tecidos, os órgãos ou a cavidade manipulada. Podemos afirmar que a infecção do sítio cirúrgico pode ser diagnosticada

- (A) em até 30 dias após a realização do procedimento ou após 1 ano, em caso de implante de prótese.
- (B) em até 30 dias após a realização do procedimento ou em até 1 ano, em caso de implante de prótese.
- (C) após 30 dias do procedimento e até 1 ano.
- (D) em até 45 dias após a realização do procedimento, ou até 1 ano, em caso de implante de prótese.
- (E) após 45 dias do procedimento ou até 1 ano, em caso de implante de prótese.

**05.** As superfícies externas dos endoscópios e seus canais internos são expostos a fluídos do corpo e outros contaminantes, devendo ser rigorosamente limpos antes do processo de desinfecção. Quanto à limpeza e desinfecção dos endoscópios, considere as afirmações abaixo.

- I - De acordo com a classificação de Spaulding, os endoscópios são considerados artigos semicríticos por entrarem em contato com a mucosa, devendo sofrer desinfecção de alto nível.
- II - A escolha adequada do processo de limpeza, manual ou mecânica, não depende do tipo de solução química utilizada, associada à qualidade de enxágue e secagem.
- III - A limpeza das válvulas deve ser realizada com a mesma técnica de limpeza dos endoscópios.
- IV - A presença de biofilme não impede a ação da solução germicida.
- V - A solução utilizada para desinfecção deve ser submetida ao controle da concentração através da fita teste, diariamente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**06.** O centro cirúrgico é um lugar especial dentro do hospital onde podem ser desencadeadas eventuais ocorrências danosas ao paciente, decorrentes de falhas nas ações da equipe de enfermagem. É correto afirmar que lesão corporal decorrente de falha é classificada como:

- (A) gravíssima.
- (B) leve.
- (C) grave.
- (D) moderada.
- (E) intensa.

**07.** Marque a alternativa que contém os itens que fazem parte do índice de Aldrete e Kroulik.

- (A) Atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
- (B) Atividade muscular, sinais vitais, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
- (C) Sistema termoregulador, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
- (D) Sistema tegumentar, atividade muscular, respiração, circulação e consciência.
- (E) Atividade muscular, respiração, circulação, consciência e sistema sensorial.

**08.** Até pouco tempo atrás, a responsabilidade por ocorrências de danos ao paciente cirúrgico era da equipe médica. Hoje em dia, evidencia-se corresponsabilidade de outros. Quanto a isso, marque a alternativa correta.

- (A) O profissional da saúde tem responsabilidade, exclusivamente, consigo mesmo, com o cliente e com a sociedade.
- (B) O profissional da saúde apenas se corresponsabiliza em decorrência de iatrogenia.
- (C) O profissional de enfermagem poderá responder a um processo crime que o excluirá de responder um processo ético.
- (D) O profissional de enfermagem, no cotidiano do seu processo de trabalho, concorre para equívocos que podem se configurar em: imperícia, imprudência, negligência e omissão de socorro.
- (E) O profissional de enfermagem deve estar atento ao conteúdo da legislação profissional, não importando as demais legislações civis e criminais.

**09.** A alternativa mais recomendada para preservar a integridade do equipamento de videocirurgia e garantir condições de esterilização é

- (A) limpar os cabeçotes com um pano umedecido com solução de detergente enzimático.
- (B) limpar os cabeçotes com um pano umedecido com água e sabão neutro.
- (C) revestir os cabeçotes e o cabo da câmera com capas plásticas específicas esterilizadas.
- (D) limpar a lente da microcâmara com hastes com algodão embebidas em álcool.
- (E) revestir a microcâmara com capas plásticas específicas esterilizadas.

**10.** Como são denominados os eventos que **NÃO** podem ocorrer sob nenhuma circunstância?

- (A) Impactantes.
- (B) Adversos.
- (C) Adversos sérios.
- (D) Sérios.
- (E) Sentinela.

**11.** Quanto à marcação do sítio cirúrgico é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) é utilizada em procedimentos de coluna.
- (B) é utilizada em procedimentos que envolvem dedos das mãos ou pés.
- (C) é utilizada em procedimentos que envolvam contralateralidade, múltiplas estruturas ou múltiplos níveis.
- (D) deve ser realizada durante a cirurgia.
- (E) deve ser visível antes da cirurgia.

**12.** A hemostasia pode ser definida como um processo de paralisação ou impedimento de sangramento no ato cirúrgico.

Marque a alternativa correta quanto às formas de realizar a hemostasia.

- (A) Com fios cirúrgicos, agulhas e afastadores.
- (B) Com suturas mecânicas, esponjas absorvíveis e pinças de campo.
- (C) Com fios cirúrgicos, agulhas e laser.
- (D) Com esponjas absorvíveis, pinças de campo, eletrocoagulação e suturas mecânicas.
- (E) Com fios cirúrgicos e agulhas, suturas mecânicas, esponjas absorvíveis, eletrocoagulação e pinças hemostáticas.

**13.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando os termos cirúrgicos às respectivas definições.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| (1) Ostomia | ( ) Incisão  |
| (2) Centese | ( ) Excisão  |
| (3) Otomia  | ( ) Quebra   |
| (4) Lise    | ( ) Abertura |
| (5) Ectomia | ( ) Punção   |

A ordem correta de preenchimento dos números da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.  
 (B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.  
 (C) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.  
 (D) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.  
 (E) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.

**14.** Sobre a degermação das mãos para a cirurgia, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) tem como objetivos remover a sujeira, oleosidade da pele, micróbios das mãos e dos antebraços.  
 (B) a pele nunca pode ser considerada estéril, mas ela pode se tornar cirurgicamente limpa pela redução do número de microrganismos presentes.  
 (C) existem diferenças significativas na eficácia da escovação entre o uso das escovas reutilizáveis e as descartáveis.  
 (D) a fricção e o enxágue reduzem significativamente o número de bactérias na epiderme.  
 (E) o sabão antimicrobiano ou detergente usado deve agir rapidamente, ter um amplo espectro de ação e ter um efeito de aspereza mínima na pele.

**15.** Considere as afirmações abaixo sobre posicionamento cirúrgico.

- I - A posição de Trendelenburg reversa é usada para oferecer acesso à cabeça e pescoço.  
 II - A postura de decúbito ventral é inicialmente de risco quando o paciente anestesiado é virado do decúbito dorsal para a posição ventral.  
 III- A posição lateral permite abordagem operatória nas regiões superiores da cavidade torácica e na região dos rins.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**16.** A limpeza terminal é realizada para:

- (A) Reduzir a sujidade, reduzindo a possibilidade de contaminação.  
 (B) Manter a boa aparência.  
 (C) Evitar acidentes de trabalho.  
 (D) Repor os materiais descartáveis.  
 (E) Manter a limpeza diária.

**17.** A área de um Centro de Material e Esterilização (CME) deve manter fluxo contínuo e unidirecional do artigo, visando a garantia da qualidade do processo. Para isso, o CME está dividido em subáreas separadas entre si por barreiras físicas.

Segundo essa premissa, observe os itens abaixo.

- I - Área de esterilização.  
 II - Área limpa de preparo e embalagem de materiais.  
 III- Área contaminada e de limpeza de materiais.  
 IV- Área de armazenamento.

Qual alternativa apresenta a ordem correta do fluxo dos materiais a serem processados no CME, considerando as subáreas?

- (A) I, II, III e IV.  
 (B) I, IV, II e III.  
 (C) II, I, IV e III.  
 (D) III, II, I e IV.  
 (E) IV, III, I e II.

**18.** Leia os 4 métodos de esterilização abaixo relacionados.

- I - Autoclave a vapor saturado sob pressão.  
 II - Esterilização por óxido de etileno.  
 III- Esterilização *flash*.  
 IV- Esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio.

Marque a alternativa que indica os métodos corretos de esterilização realizada a baixa temperatura.

- (A) Apenas I e IV.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas II e IV.  
 (D) Apenas I, II e III.  
 (E) Apenas II, III e IV.

**19.** A limpeza é etapa imprescindível no processamento de materiais. Diminui a carga microbiana em 99,99%.

Indique o método que possibilita a reprodutibilidade do processo, o controle dos parâmetros, a maior produtividade e minimiza os riscos ocupacionais.

- (A) Manual.
- (B) Limpeza com detergente enzimático.
- (C) Automatizada.
- (D) Uso de microcâmaras.
- (E) Uso de escovas.

**20.** Considere os itens abaixo sobre fatores que interferem na eficácia da limpeza.

- I - Qualidade da água e tipo de detergente.
- II - Carga microbiana presente no material.
- III- Complexidade e conformação dos produtos para saúde.
- IV - Método de limpeza manual ou automatizada.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**21.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o método de esterilização com o tipo adequado de embalagem.

- (1) Esterilização a vapor úmido
- (2) Esterilização a óxido de etileno
- (3) Esterilização a peróxido de hidrogênio
- (4) Esterilização a formaldeído

- ( ) Cobertura de algodão
- ( ) Papel grau cirúrgico
- ( ) Tyvek<sup>R</sup> – não tecido de fibra 100% polietileno
- ( ) Outro tecido como a manta de SMS

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 3 – 1.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 1 – 4 – 3 – 2.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

**22.** Considere as afirmações abaixo sobre as recomendações básicas para montagem de cargas em autoclave a vapor.

- I - Ocupar entre 70% e 80% da capacidade da câmara.
- II - Posicionar materiais côncavos (bacia, cubas) no sentido vertical e com a concavidade para cima.
- III- Posicionar os pacotes paralelos ao fluxo do vapor.
- IV - Não sobrepor materiais de modo a compactá-los.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**23.** Sobre o armazenamento e transporte de produtos esterilizados, está **INCORRETO** afirmar que devem ser

- (A) armazenados em local limpo e seco.
- (B) armazenados sob luz solar direta.
- (C) submetidos à manipulação mínima.
- (D) transportados em recipientes fechados.
- (E) transportados em recipientes rígidos e exclusivos.

**24.** No CME classe II e na empresa processadora, o processo de esterilização deve estar documentado de forma a garantir a \_\_\_\_\_ de cada lote processado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto acima.

- (A) esterilidade
- (B) qualidade
- (C) validade da esterilização
- (D) distribuição
- (E) rastreabilidade

**25.** Em relação ao paciente neurocirúrgico, considere as afirmações abaixo.

- I - A Hipertensão Intracraniana (HIC) se refere ao aumento do valor normal da Pressão Intracraniana (PIC).
- II - A Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) refere-se à diferença de pressão entre a Pressão Arterial Média (PAM) e a PIC.
- III- O efeito cumulativo de atividades de enfermagem (banho, aspiração, mudança de decúbito) não interfere na PIC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



**26.** Na monitorização invasiva de pressão arterial, as vias de escolha mais comuns incluem as artérias radial e femoral. Para a canulação de artéria radial, é imprescindível a realização do \_\_\_\_\_, que permite certificar-se de que o fluxo da artéria \_\_\_\_\_ supra o fluxo da artéria radial para a região palmar em casos de \_\_\_\_\_ da artéria radial.

Assinale a alternativa que completa, adequadamente, e na ordem correta, as lacunas do enunciado acima.

- (A) Teste de Babinski – braquial – isquemia
- (B) Teste de Allen – braquial – hemorragia
- (C) Teste de Allen – ulnar – isquemia
- (D) Teste de Kernig – femoral – isquemia
- (E) Teste de Allen – radial – sangramento

**27.** A hipotermia é uma das complicações mais comuns no período pós-operatório imediato, estando associada ou não a \_\_\_\_\_ e calafrios, e se caracteriza por uma temperatura corpórea inferior a \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, adequadamente, e na ordem correta, as lacunas do enunciado acima.

- (A) tremores – 37,5 °C
- (B) vômitos – 36 °C
- (C) náuseas – 36,5 °C
- (D) tremores – 37 °C
- (E) tremores – 36 °C

**28.** Os opioides têm ação direta sobre os centros respiratórios do tronco cerebral. Considerando seus efeitos adversos, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) reduzem a responsividade ao CO<sub>2</sub>.
- (B) não alteram o volume corrente da ventilação do paciente.
- (C) diminuem a frequência respiratória.
- (D) promovem sonolência.
- (E) causam irregularidade na frequência respiratória.

**29.** Sobre a função do *cuff* nos pacientes que utilizam via aérea artificial, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) deve promover vedação adequada da traqueia.
- (B) previne a aspiração de secreções da orofaringe para os pulmões.
- (C) sua hiperinsuflação pode ocasionar isquemia local.
- (D) dispensa mensuração de pressão periódica.
- (E) auxilia na proteção da extubação acidental.

**30.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os mecanismos de ação aos respectivos fármacos.

- (1) Nitroprussiato de sódio
- (2) Adrenalina
- (3) Nitroglicerina
- (4) Dobutamina
- (5) Noradrenalina

- ( ) É um medicamento indicado para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, infarto, angina e controle de hipertensão durante o período perioperatório.
- ( ) Esse medicamento é um potente vasodilatador, sendo usado como anti-hipertensivo.
- ( ) Essa droga deve ser empregada para elevar a pressão arterial nos pacientes com choque e baixa resistência vascular sistêmica.
- ( ) Quando administrada por via endovenosa, essa droga provoca rápida elevação da pressão arterial.
- ( ) Este medicamento é indicado para aumentar a contratilidade miocárdica e o débito cardíaco.

A ordem correta de preenchimento dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.
- (B) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- (D) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- (E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.

**31.** O resultado da diminuição aguda do volume sanguíneo circulante pode ser classificado como choque

- (A) séptico.
- (B) metabólico.
- (C) intrínseco.
- (D) condensado.
- (E) hipovolêmico.

**32.** Considere as afirmações abaixo sobre a assistência pós-operatória imediata de enfermagem.

- I - O índice de Aldrete e Kroulik deve ser aplicado.
- II - A analgesia epidural com bupivacaína pode ser utilizada somente em infusão contínua.
- III - O uso de opioides em via epidural tem como possíveis efeitos colaterais: depressão respiratória, prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



**33.** A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão. Contempla as trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e usuários para qualificar a saúde pública do Brasil. Essa política define alguns princípios que orientam as práticas em saúde.

Com base nisso, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o PRINCÍPIO que norteia o SUS a sua respectiva PRÁTICA de atenção e gestão.

- (1) Transversalidade  
 (2) Indissociabilidade entre gestão e atenção  
 (3) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivo
- ( ) É a busca da transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.  
 ( ) É a ampliação da independência e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham compromissos. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um.  
 ( ) É o princípio pelo qual trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a administração dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.  
 (B) 1 – 3 – 2.  
 (C) 2 – 1 – 3.  
 (D) 3 – 1 – 2.  
 (E) 3 – 2 – 1.

**34.** A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Para entender alguns conceitos que norteiam o trabalho da PNH e como fazê-lo, leia o parágrafo e preencha as lacunas com a ordem correta das palavras que completam adequadamente o texto.

\_\_\_\_\_ é o reconhecimento do que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde e deve sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. É construído(a) de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva. Para isso promove-se o(a) \_\_\_\_\_ com espaços saudáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e de encontro entre as pessoas, tendo no(a) \_\_\_\_\_ a contribuição para uma abordagem do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença por meio do enriquecimento dos diagnósticos e a qualificação do diálogo, de modo a possibilitar decisões comprometidas com o(a) \_\_\_\_\_ e a saúde dos usuários do SUS.

- (A) Autonomia – clínica ampliada e compartilhada – ambiência – acolhimento  
 (B) Acolhimento – autonomia – ambiência – clínica ampliada e compartilhada  
 (C) Autonomia – acolhimento – ambiência – clínica ampliada e compartilhada  
 (D) Acolhimento – ambiência – clínica ampliada e compartilhada – autonomia  
 (E) Acolhimento – ambiência – autonomia – clínica ampliada e compartilhada

**35.** A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. A atuação profissional precisa estar alinhada com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o qual considera a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Marque **C** para **CERTO** e **E** para **ERRADO** quanto aos direitos, responsabilidades e deveres pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem.

- ( ) É uma responsabilidade exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- ( ) É um dever exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- ( ) É um direito recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- ( ) É um direito avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- ( ) É um dever proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) E – C – E – C – C.
- (B) E – C – C – E – C.
- (C) C – E – E – C – E.
- (D) C – E – C – E – E.
- (E) E – E – E – E – C.

**36.** A redução de atos não seguros dentro do sistema de assistência à saúde, assim como a utilização das boas práticas para alcançar resultados ótimos para o paciente, constituem a estruturada segurança do paciente. As instituições de saúde, visando a certificação de qualidade, buscam atender os requisitos de conformidades para segurança dos pacientes.

São metas internacionais para a segurança do paciente preconizadas pela *Joint Commission International (JCI)*:

- I - identificar corretamente o paciente, melhorar a eficácia da comunicação e melhorar a segurança dos medicamentos de alto risco.
- II - garantir procedimentos cirúrgicos corretos no paciente certo e no local corporal correto, cumprir orientações relativas à higienização das mãos, melhorar a segurança dos medicamentos de alto risco.
- III- identificar corretamente o paciente, reduzir as lesões decorrentes de queda e melhorar a eficácia da comunicação.
- IV - revisar processos de trabalho, investir em conhecimento e cumprir as orientações relacionadas às cirurgias corretas e higienização de mãos.
- V - revisar processos de trabalho, investir em conhecimento e atender aos requisitos de segurança nas catástrofes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I, IV e V.
- (D) Apenas II, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**37.** Correlacione a primeira coluna com a segunda, sobre as técnicas utilizadas para o tratamento da dor.

- (1) Anestesia regional
  - (2) Sulfato de morfina
  - (3) Fentanil
  - (4) Anestesia espinal
  - (5) Espaço epidural
  - (6) Analgesia peridural contínua
- ( ) Utilizado(a) em procedimentos extensos para tratamento prolongado da dor pós-operatória, reduzindo os requisitos analgésicos com boa analgesia e sedação mínima e deambulação precoce.
- ( ) Opióide mais comumente utilizado para analgesia cirúrgica, apresenta duração da ação de 30 minutos.
- ( ) Perda sensorial reversível em uma área ou região específica quando um anestésico local é utilizado para bloquear as fibras nervosas do sítio operatório e ao redor dele.
- ( ) O sistema nervoso simpático é bloqueado dois dermatomos acima, e o sistema neuromuscular dois dermatomos abaixo com relação ao bloqueio sensorial.
- ( ) Localizado(a) entre o ligamento amarelo e a dura mater, estendendo-se desde o forame magno até a membrana sacrococcígea.
- ( ) Pode ser usado por via intratecal e epidural, libera histamina e tem duração de ação de 4 a 6 horas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 4 – 6 – 3.
- (B) 6 – 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- (C) 1 – 3 – 6 – 4 – 5 – 2.
- (D) 6 – 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (E) 6 – 3 – 4 – 1 – 5 – 2.

**38.** Caracteriza-se como escala visual análoga (EVA) para avaliação da gravidade da dor:

- (A) uma linha basal de 12 cm, ancorada nas extremidades pelos números 0 e 10.
- (B) uma linha basal de 10 cm, ancorada nas extremidades pelos números 0 e 10.
- (C) uma linha basal de 12 cm, ancorada nas extremidades pela expressão "ausência de dor" e "o máximo da dor".
- (D) uma linha basal de 10 cm, ancorada nas extremidades pela expressão "ausência de dor" e "o máximo da dor".
- (E) escala multidimensional de 0 a 10.

**39.** A alternativa que apresenta a completa relação dos indicadores da presença de dor é:

- (A) apenas o relato do paciente por ser esse o parâmetro de maior importância.
- (B) exclusivamente o relato do paciente, acompanhado por alteração dos parâmetros fisiológicos.
- (C) apenas o comportamento de dor, quando há alteração dos parâmetros fisiológicos.
- (D) apenas a exposição do paciente a procedimento doloroso quando acompanhado de sinais comportamentais como gemido ou choro e posição antálgica.
- (E) apenas exposição do paciente a procedimento doloroso, sinais comportamentais, classificação de dor por alguém que conheça bem o paciente, indicadores fisiológicos e o autorrelato.

**40.** Sobre a meperidina, é mais correto afirmar que

- (A) é um analgésico opioide potente cujo metabólito é tóxico para o sistema nervoso central e pode provocar convulsões e morte.
- (B) é um benzodiazepínico e seu antagonista é a naloxona.
- (C) deve ser evitada como analgésico de escolha apesar do metabólito não ser tóxico para o sistema nervoso central, e pode ser utilizada para tratamento de tremores pós-operatórios.
- (D) é um analgésico opioide potente de primeira escolha para analgesia pós-operatória.
- (E) é um analgésico opioide fraco de primeira escolha para analgesia pós-operatória.