



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 05/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 35 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM III **Bloco Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica** **e Centro Cirúrgico Ambulatorial**

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 35

TÉCNICO DE ENFERMAGEM III – Bloco Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica e Centro Cirúrgico Ambulatorial

01.	A	11.	A	21.	A	31.	D
02.	A	12.	ANULADA	22.	D	32.	D
03.	A	13.	D	23.	E	33.	A
04.	D	14.	E	24.	C	34.	E
05.	C	15.	E	25.	ANULADA	35.	B
06.	E	16.	D	26.	E	36.	A
07.	C	17.	E	27.	E	37.	E
08.	D	18.	E	28.	B	38.	C
09.	E	19.	E	29.	B	39.	B
10.	D	20.	D	30.	C	40.	C



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 **O candidato que se retirar da sala de Prova ao concluí-la não poderá utilizar os banheiros destinados a candidatos nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.6 do Edital de Abertura).
- 11 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Os medicamentos analgésicos são mais efetivos no período pós-operatório quando

- (A) a dose e o intervalo entre as doses são individualizadas.
- (B) é observada a resposta do paciente aos efeitos colaterais do medicamento.
- (C) as prescrições médicas são protocolares e institucionalizadas.
- (D) existe a expectativa de que o paciente se queixe de dor intensa.
- (E) a analgesia mantém o paciente sedado boa parte do tempo.

02. O tratamento da dor é considerado parte importante do cuidado de enfermagem. Quando a equipe de enfermagem se refere à dor como o quinto sinal vital, tem por objetivo

- I - enfatizar seu significado, mostrando que a dor é tão importante quanto os demais sinais vitais.
- II - aumentar a consciência dos profissionais sobre a importância do seu tratamento efetivo.
- III- classificar os pacientes em relação aos sinais observados.
- IV- documentar a avaliação do paciente e do tratamento da dor.
- V - avaliar a dor como um sinal percebido pela equipe de enfermagem por meio de escalas de dor, e não como um sintoma.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II, IV e V.
- (E) Apenas III, IV e V.

03. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa política define alguns princípios que devem orientar as práticas em saúde.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o princípio a sua respectiva prática.

- (1) Transversalidade.
 - (2) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
 - (3) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
-
- () As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um.
 - () Trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona o gerenciamento dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
 - () As diferentes especialidades e práticas de saúde podem dialogar com a experiência daquele que é assistido.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1.

04. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população. No que se refere à seção de responsabilidades e deveres do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considere as afirmações abaixo.

- I - É dever do profissional exercer a profissão com equidade, resolutividade e lealdade.
- II - O profissional deve assegurar à pessoa, família e coletividade uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia.
- III- O profissional de enfermagem deve realizar ações que garantam o direito de apenas a pessoa tomar decisões sobre sua saúde, seu tratamento, conforto e bem-estar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

05. No que se refere a precauções padrão em Centro Cirúrgico e à limpeza do ambiente, é correto afirmar que

- (A) não visam controlar a infecção cruzada de um paciente a outro nos estabelecimentos de serviços de saúde.
- (B) devem ser observadas apenas quando houver risco de contato com sangue, fluidos corpóreos, pele íntegra e mucosa.
- (C) são medidas de biossegurança que visam também à proteção dos profissionais da saúde.
- (D) nelas estão incluídas precauções baseadas em mecanismo de transmissão.
- (E) são medidas aplicadas exclusivamente no atendimento de pacientes com doenças de alta transmissibilidade.

06. A terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expressa o segmento corpóreo afetado e a intervenção realizada no tratamento da afecção. O emprego da terminologia cirúrgica visa

- I - descrever os tipos de cirurgias.
- II - fornecer, de forma verbal e escrita, uma definição do termo cirúrgico.
- III- padronizar uma linguagem coletiva e de entendimento universal.
- IV- facilitar o preparo dos instrumentais e equipamentos apropriados a cada tipo de procedimento cirúrgico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

07. Na atualidade, várias organizações têm lançado campanhas visando à redução da infecção do sítio cirúrgico (ISC), como parte de uma preocupação mundial com a segurança do paciente cirúrgico. No que se refere às medidas de segurança que devem ser adotadas pela equipe do Centro Cirúrgico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pelos não são removidos no pré-operatório, a menos que estejam no sítio da incisão ou ao seu redor, interferindo na cirurgia.
- (B) Todos os membros da equipe devem realizar antisepsia cirúrgica pré-operatória de mãos, antebraços, até os cotovelos, por, no mínimo, dois a cinco minutos.
- (C) Deve-se manter as unhas cortadas ou usar unhas artificiais, bem como utilizar dispositivo limpador sob água corrente, removendo a sujeira que se encontra sob elas.
- (D) Deve-se educar o pessoal cirúrgico, encorajando-o, quando tiver sinais e/ou sintomas de uma doença infecciosa transmissível, a se reportar ao serviço de saúde ocupacional.
- (E) Quando da realização da assepsia técnica, deve-se montar todo material estéril e preparar soluções imediatamente antes do uso.



08. No que se refere ao posicionamento cirúrgico do paciente, isto é, ao modo como ele fica acomodado na mesa de operação durante o processo anestésico-cirúrgico, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O cuidado no posicionamento cirúrgico é de caráter multidisciplinar.
- (B) O profissional de enfermagem atuante no posicionamento deve ter como conhecimento básico que a boa posição cirúrgica é aquela que oferece o máximo de segurança ao paciente, com o mínimo de desconforto possível, e que facilite o ato anestésico cirúrgico.
- (C) O corpo do paciente deve manter-se alinhado em qualquer posição: cabeça, tronco (coluna vertebral) e membros superiores e inferiores.
- (D) Uma vez que é necessário descobrir e despir o paciente para facilitar monitorização, colocação de infusões venosas, indução anestésica e acesso à área cirúrgica, a sua privacidade fica prejudicada.
- (E) A fim de evitar formação de úlceras de pressão, trombozes e compressão da circulação, deve-se proteger as proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos.

09. A lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986, dispõe sobre a regulamentação de exercício profissional da enfermagem, ressaltando algumas recomendações. Qual das ações abaixo **NÃO** constitui atribuição do técnico de enfermagem em Sala de Recuperação?

- (A) Prestar cuidado de enfermagem ao paciente designado pelo enfermeiro, conforme prescrição realizada.
- (B) Realizar tarefas diárias e semanais de preparo e manutenção da unidade para atendimento do paciente, conforme planejamento e orientação do enfermeiro.
- (C) Participar da melhoria dos processos realizados na unidade.
- (D) Emitir opiniões e sugestões como parte do grupo de trabalho da Sala de Recuperação.
- (E) Encaminhar o paciente à Sala de Recuperação juntamente com o anestesiológico.

10. A Sociedade Americana de Anestesiologia definiu, em 2002, algumas recomendações para manuseio de pacientes no período pós-operatório. Indique, dentre as funções citadas abaixo, aquela cuja monitorização **NÃO** é incluída como rotina no referido período.

- (A) Neuromuscular.
- (B) Respiratória.
- (C) Cardiovascular.
- (D) Urinária.
- (E) Dor.

11. Na recuperação anestésica do paciente, são utilizadas escalas como instrumentos para avaliar a evolução no pós-operatório imediato até que ele tenha a alta da Sala de Recuperação. Assinale a alternativa que apresenta os autores dessas escalas de avaliação em pacientes submetidos à anestesia ou sedação.

- (A) Aldrete e Kroulik – Steward – Ramsey.
- (B) Aldrete e Kroulik – Steward – Glasgow.
- (C) Aldrete e Kroulik – Glasgow – Ramsey.
- (D) Steward – Glasgow – Ramsey.
- (E) Kroulik – Glasgow – Ramsey.

12. O cirurgião de cabeça e pescoço realiza também procedimentos diagnósticos como a faringolaringoscopia. Dentre os cuidados de enfermagem em pacientes desses procedimentos na Sala de Recuperação, pode-se apontar a necessidade de

- (A) monitorar (ECG, PNI, oximetria de pulso e temperatura).
- (B) aspirar de vias aéreas se necessário.
- (C) observar sangramento oral.
- (D) manter limpo o curativo da traqueostomia, se o paciente o tiver.
- (E) avaliar condições ventilatórias.

13. A terapia com cianoacrilato (Histoacryl[®]), a ligadura elástica, a escleroterapia com adrenalina e o hemoclipse são exemplos de terapêuticas indicadas em casos de

- (A) úlcera gástrica ou duodenal não hemorrágica.
- (B) polipose colônica.
- (C) estenose esofágica.
- (D) hemorragia digestiva alta.
- (E) neoplasia de esôfago.

14. De acordo com a classificação de Spaulding, endoscópios flexíveis são considerados artigos semicríticos por entrarem em contato com mucosas. O processo requerido para reutilização do equipamento é

- (A) desinfecção em ácido peracético por uma hora.
- (B) esterilização em glutaraldeído por doze horas.
- (C) esterilização em água ácida eletrolisada por trinta minutos.
- (D) esterilização em plasma de peróxido de hidrogênio.
- (E) desinfecção em glutaraldeído por trinta minutos.

15. Colonoscopia consiste no exame do intestino grosso realizado com aparelho flexível, com finalidades diagnósticas e terapêuticas. Considere as seguintes afirmações sobre o exame.

- I - É realizado após o preparo intestinal, em geral sob sedação.
- II - É indicado mais para esclarecer quadros de anemias, sangramento, emagrecimento, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, alterações em exames laboratoriais ou radiológicos no seguimento de cirurgias ou como exame preventivo.
- III- Na admissão do paciente para realização do exame, deve ser confirmada a presença de acompanhante adulto.
- IV- Indica-se que o início da realização do exame seja feita com paciente em decúbito lateral esquerdo, podendo ser concluído nessa posição; embora seja comum a mudança de decúbito para dorsal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III, e IV.
- (E) I, II, III e IV.

16. Em relação à gastrostomia endoscópica, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Seus métodos mostram-se seguros e práticos, tendo sido submetidos a longo período de experiência e utilização.
- (B) A relevância da enfermagem durante o ato está no seu conhecimento prévio das etapas do procedimento, que auxilia os médicos endoscopistas na realização da gastrostomia da melhor maneira e no menor tempo possível.
- (C) Recomenda-se, para a sua realização, um jejum de oito a doze horas.
- (D) O curativo, no pós-operatório, pode ser removido no mesmo dia em que se realizou o procedimento.
- (E) A pele em torno da sonda deve ser preservada, pois o vazamento do conteúdo ácido do suco gástrico pode provocar inflamação e feridas ao redor.

17. Com relação a avaliações do processo de segurança do paciente e da instituição de saúde, definidas pela política institucional, consideradas importantes no gerenciamento de risco em Centro Cirúrgico, considere os itens do *checklist* (lista de checagem) abaixo.

- I - Jejum do paciente.
- II - Identificação do paciente.
- III- Local e lado da cirurgia marcado pelo cirurgião.
- IV - Colocação dos exames pertinentes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

18. Considere os procedimentos abaixo.

- I - Aplicação de uma medicação.
- II - Punção venosa.
- III- Tricotomia.
- IV - Realização de um curativo.
- V - Colocação da placa do elétrico cauterio.

Quais constituem risco assistencial?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

19. O termo toracocentese significa

- (A) extirpação total ou parcial de um segmento corpóreo.
- (B) punção de uma cavidade neural com agulha ou trocarte.
- (C) imobilização cirúrgica de articulação.
- (D) isolamento de um órgão ou estrutura por meio cirúrgico.
- (E) punção e aspiração do espaço intrapleural para remoção de líquido.

20. Como se denomina a posição em que o paciente é colocado em decúbito dorsal e toda a mesa é inclinada para que a cabeça fique mais alta que os pés?

- (A) Posição de litotomia.
- (B) Posição ventral.
- (C) Posição de Trendelenburg.
- (D) Posição de proclive (Trendelenburg reversa).
- (E) Posição de Fowler.

21. Assinale os fatores abaixo com **V** (verdadeiro) para os que constituem em fatores extrínsecos de risco potencial para úlcera por pressão e com **F** (falso) para os que não se constituem como risco potencial para essa patologia.

- () uso de antissépticos
- () colchão de mesa cirúrgica inadequado
- () fricção
- () estiramento
- () negatividade
- () posicionamento cirúrgico

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V - V - V - V - V - V.
- (B) V - F - V - F - V - V.
- (C) V - F - F - V - F - F.
- (D) V - V - F - V - V - F.
- (E) F - F - F - F - F - F.

22. Os agentes antissépticos são mundialmente utilizados na área hospitalar para realização do preparo da pele em procedimento invasivo. Qual a finalidade da antisepsia cirúrgica?

- (A) Reduzir o risco de infecção.
- (B) Reduzir a carga microbiana.
- (C) Inibir o crescimento de esporos.
- (D) Reduzir a carga microbiana local e, consequentemente, reduzir o risco de infecção no pós-operatório.
- (E) Destruir bacilos gram negativos de origem fecal.

23. Considere as afirmações abaixo sobre o uso de sabão antimicrobiano na escovação cirúrgica das mãos.

- I - Reduzem os microorganismos da pele.
- II - Têm ação rápida.
- III - Não devem ter efeito irritativo sobre a pele.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Qual dos instrumentos abaixo não é considerado de corte básico?

- (A) Cabo de bisturi.
- (B) Tesoura de Mayo reta.
- (C) Pinça Rochester-Pean.
- (D) Tesoura de Metzembra curva.
- (E) Tesoura de sutura reta.

25. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando os fios de sutura às suas respectivas características.

- | | |
|-------------------|--|
| (1) Categute | () Fio não absorvível, à base de fibras. |
| (2) Seda | () Fio não absorvível, de poliamida, sintético. |
| (3) Algodão | () Fio absorvível, obtido do colágeno de mamíferos. |
| (4) Náilon | () Fio não absorvível, monofilamentar. |
| (5) Polipropileno | () Fio não absorvível, produzido por larva. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 3 - 4 - 1 - 5 - 2.
- (B) 3 - 5 - 1 - 4 - 2.
- (C) 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
- (D) 3 - 4 - 2 - 5 - 1.
- (E) 5 - 3 - 1 - 4 - 2.

26. As duas modalidades usadas para eletrocirurgia são monopolar e bipolar. Quais capacidades os instrumentos eletrocirúrgicos propiciam ao empregar essas modalidades?

- (A) Energia elétrica e fluxo de corrente.
- (B) Corte e eletricidade.
- (C) Corrente e coagulação.
- (D) Eletricidade e corrente.
- (E) Corte e coagulação.

27. Dentre os benefícios proporcionados pelo procedimento videocirúrgico, pode-se citar:

- I - menor agressão física e menor cicatriz.
- II - menor dor e desconforto no pós-operatório.
- III - menor tempo de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



28. Qual dos equipamentos utilizados em videocirurgia possui dispositivo de controle de cor e mecanismo para a realização do *white balance* (balanço do branco)?

- (A) Monitor de vídeo.
- (B) Processador de câmera.
- (C) Fonte de luz.
- (D) Laparoflatores.
- (E) Microcâmera.

29. A assistência de enfermagem em uma unidade de cuidados pós-anestésicos inclui avaliações frequentes e competentes de

- (A) nível de consciência, capacidade de ventilação e deglutição.
- (B) oximetria, nível de consciência e frequência respiratória e cardíaca.
- (C) oximetria, temperatura axilar e nível de consciência.
- (D) capnografia, capacidade de movimentação e frequência respiratória e cardíaca.
- (E) capnografia, temperatura axilar e capacidade de movimentação.

30. No período pós-operatório imediato, o objetivo principal consiste em evitar:

- (A) dor e hipertermia.
- (B) hipoxemia e hipertermia.
- (C) hipoxemia e hipercapnia.
- (D) dor e hipercapnia.
- (E) hipertermia e vômito.

31. Os sinais clássicos de choque hipovolêmico são:

- (A) palidez, respiração prolongada e pulso rápido.
- (B) palidez, aumento do volume urinário e hipertermia.
- (C) pele fria, respiração rápida e urina clara.
- (D) respiração rápida, pressão arterial baixa e urina concentrada.
- (E) pressão arterial baixa, urina concentrada e hipertermia.

32. Considere as afirmações abaixo sobre trombose venosa profunda (TVP).

I - O primeiro sintoma de TVP pode ser uma dor ou câibra na panturrilha.

II - A compressão pneumática e as meias de compressão elásticas em membros inferiores podem ser usadas na prevenção de TVP.

III - Somente a heparina é capaz de prevenir a TVP.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

33. Em relação ao pós-operatório de transplante renal, qual das afirmações abaixo está **INCORRETA**?

- (A) Os pacientes submetidos a transplante renal não mais precisarão de hemodiálise.
- (B) O rim de um doador cadavérico pode não funcionar por duas a três semanas.
- (C) O débito urinário é medido a cada hora.
- (D) Os líquidos endovenosos são administrados de acordo com o volume urinário e com os níveis de eletrólitos séricos, conforme prescrição médica.
- (E) É necessário que o paciente receba terapia imunossupressora após o transplante renal.

34. A escala mundialmente mais utilizada para avaliar as alterações do nível de consciência é a de:

- (A) Aldrete e Kroulick.
- (B) Chipps.
- (C) Braden.
- (D) Waterlow.
- (E) Glasgow.

35. Em relação à monitorização hemodinâmica, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) o tamanho do manguito e a sua posição no membro podem interferir na exatidão da medida da pressão arterial.
- (B) a frequência respiratória pode ser medida pela observação do tórax do paciente, considerando os movimentos inspiratórios e expiratórios, durante o período de quinze segundos.
- (C) o oxímetro de pulso determina a saturação periférica de oxigênio pela hemoglobina.
- (D) a capnografia é a representação gráfica da curva de pressão parcial de CO₂, sendo utilizada como um parâmetro indicativo de acidose respiratória.
- (E) a pressão arterial média é útil para o manejo da terapia medicamentosa com fármacos vasoativos e no controle da manutenção de perfusão dos órgãos e tecidos.

36. O período que abrange as fases da experiência cirúrgica chama-se

- (A) perioperatório.
- (B) transoperatório.
- (C) pré-operatório.
- (D) pós-operatório.
- (E) paraoperatório.

37. A anestesia _____ é realizada mediante a aplicação de anestésico local no espaço subaracnoide, enquanto que na anestesia _____, o anestésico é aplicado no espaço peridural.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) local – epidural
- (B) local – raquidiana
- (C) venosa – peridural
- (D) epidural – raquidiana
- (E) raquidiana – epidural

38. No pós-operatório imediato, é importante avaliar os pulsos periféricos e o tempo de enchimento capilar, principalmente em cirurgias

- (A) ginecológicas e proctológicas.
- (B) vasculares e oftálmicas.
- (C) vasculares e ortopédicas.
- (D) ginecológicas e otorrinolaringológicas.
- (E) cardíacas e proctológicas.

39. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a droga com sua respectiva ação vasoativa.

- (1) Adrenalina
- (2) Noradrenalina
- (3) Nitroprussiato de Sódio
- (4) Nitroglicerina

- () Droga de eleição para elevar a pressão arterial.
- () Vasodilatador indicado para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva.
- () Droga utilizada para manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
- () Hipotensor ideal em situações clínicas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 1 – 4 – 3 – 2.

40. Nas cirurgias torácicas, os drenos colocados fornecem um conduto para a passagem de ar, sangue e outros líquidos dos espaços intrapleurais ou mediastinais. Em qual cirurgia esses drenos devem permanecer clampeados no pós-operatório imediato?

- (A) Lobectomia.
- (B) Ressecção em cunha.
- (C) Pneumectomia.
- (D) Drenagem de empiema.
- (E) Biópsia pulmonar.