

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 03/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 33 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Adulto: Clínica, Cirúrgica e/ou Obstétrica)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 03/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 33

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

(Internação Adulto: Clínica, Cirúrgica e/ou Obstétrica)

01.	C	11.	C	21.	E	31.	A
02.	A	12.	A	22.	D	32.	E
03.	E	13.	C	23.	B	33.	C
04.	B	14.	E	24.	C	34.	A
05.	D	15.	ANULADA	25.	E	35.	C
06.	B	16.	A	26.	C	36.	D
07.	E	17.	D	27.	B	37.	B
08.	D	18.	B	28.	A	38.	D
09.	C	19.	A	29.	E	39.	B
10.	D	20.	ANULADA	30.	B	40.	A



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Conforme o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, as infrações que provocam perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa, ou as que causam danos patrimoniais ou financeiros, são consideradas infrações

- (A) leves.
- (B) atenuadas.
- (C) graves.
- (D) suspensivas.
- (E) gravíssimas.

02. Constituem-se como diretrizes da política de humanização no nível de atenção hospitalar de saúde, **EXCETO**:

- (A) garantia da presença do acompanhante junto a pacientes adultos internados nos hospitais privados/convênios e a critério da equipe médica nos hospitais públicos.
- (B) existência de mecanismos de desospitalização, visando a criar alternativas às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares.
- (C) equipe multiprofissional de atenção à saúde para seguimento dos pacientes internados.
- (D) garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e contrarreferência.
- (E) ouvidoria em funcionamento, permitindo escuta a pacientes, familiares e trabalhadores.

03. As alterações emocionais mais frequentes que acometem de 50% a 70% das pessoas, conforme o Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério (Brasil, 2006), são:

- I - hiperemotividade
- II - alterações de humor
- III- sentimentos de incapacidade

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. No que se refere à prevenção da morte súbita do lactente, considere as posições para o recém-nascido dormir:

- I - prona
- II - supina
- III- lateral

Quais são recomendadas pelo Ministério da Saúde do Brasil?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

05. Viviane, 15 anos, está no alojamento conjunto e tem muitas dúvidas quanto à amamentação. Pergunta o que fazer para ter uma boa produção de leite materno para a sua filha Milena, pois tem receio de que ela não ganhe peso adequadamente se lhe oferecer apenas o seu leite. Qual a recomendação preconizada, além da técnica correta para o aleitamento, a fim de que o bebê tenha um aporte calórico adequado durante a amamentação exclusiva?

- (A) Oferecer apenas uma mama em cada mamada.
- (B) Trocar de mama a cada 5 minutos.
- (C) Estipular mamadas curtas e mais frequentes.
- (D) Estimular o bebê a esvaziar uma mama antes de oferecer a outra.
- (E) Ingerir bastante líquido durante a amamentação, em torno de 2 litros por dia.

06. Referente ao tratamento das lesões mamilares, pode-se afirmar que

- (A) é recomendado o tratamento seco (banho de luz, banho de sol e secador de cabelos).
- (B) o uso do próprio leite ordenhado é indicado para formar uma camada de proteção.
- (C) a aplicação de casca de banana ou de mamão é recomendada para acelerar a cicatrização.
- (D) é importante limitar a duração das mamadas para alívio da dor.
- (E) é recomendada a aplicação de chás nos intervalos das mamadas.

07. As gestantes com pré-eclâmpsia leve normalmente são internadas visando maior controle de seus níveis tensionais e das condições fetais. São importantes alguns cuidados de enfermagem durante a hospitalização, como a busca por sintomas que possam indicar o agravamento da doença. Entre tais sintomas, podemos destacar

- (A) cefaleia, azia, formigamento nas extremidades.
- (B) cansaço, sede intensa e náuseas.
- (C) dor nas articulações, ansiedade e náuseas.
- (D) escotomas, ardência miccional e angústia.
- (E) cefaleia persistente, dor epigástrica e escotomas.

08. As Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e têm como objetivo a segurança do paciente e do profissional de saúde. Qual das alternativas abaixo **NÃO** constitui uma dessas metas?

- (A) Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, determinando o local específico e identificação para os mesmos nas unidades.
- (B) Identificar o paciente, usando os identificadores determinados pela Instituição.
- (C) Reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de quedas, implementando avaliação inicial para risco de queda.
- (D) Melhorar a comunicação efetiva, comunicando o resultado de exame alarmante para toda a equipe de enfermagem que acompanha o paciente.
- (E) Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde, prevenindo a infecção cruzada por meio da higienização das mãos.

09. São cuidados de enfermagem prioritários no pós-operatório de mulheres submetidas à histerectomia, visando à detecção precoce de complicações:

- I - observação de sangramentos vaginais pelo risco de hemorragias.
- II - observação das mamas pelo risco de tumefação e dor.
- III- observação da eliminação urinária pelo risco de disfunções vesicais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. Um paciente com sistema de drenagem torácica em aspiração contínua necessita realizar um Raio-X de tórax, no setor de radiologia do hospital. Em relação ao transporte desse paciente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Deve-se clampar o dreno torácico durante o transporte para evitar um pneumotórax hipertensivo.
- (B) Deve-se manter o aparelho de drenagem ao mesmo nível do tórax do paciente.
- (C) Deve-se aguardar até que seja suspensa a aspiração contínua para que o paciente possa ser transportado para a realização do Raio-X.
- (D) Deve-se manter o aparelho de drenagem em um nível inferior ao tórax do paciente.
- (E) Deve-se clampar o dreno torácico durante o transporte para evitar uma embolia pulmonar.

11. Paciente J.C.B., 73 anos, realizou cirurgia para ressecção de tumor intestinal. Quais as complicações potenciais no pós-operatório relacionadas a essa cirurgia?

- (A) Infecção, endocardite e dor.
- (B) Retenção urinária, ruptura da ferida e dor.
- (C) Formação de abscesso, íleo paralítico e fístulas.
- (D) Infecção da ferida abdominal, peritonite e disfagia.
- (E) Gastroenterite, infecção intraperitoneal e deiscência da anastomose.

12. Segundo Brunner & Suddarth (2009), "a secreção do efluente e o grau em que ela é irritativa variam com o tipo de ostomia. Com uma colostomia _____, as fezes são _____, polpudas e irritantes para a pele. Com uma colostomia _____, as fezes são bastante _____ para a pele".

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do segmento acima.

- (A) transversa – macias – descendente ou de sigmoide – sólidas e menos irritantes
- (B) descendente ou de sigmoide – macias – ascendente – sólidas e mais irritantes
- (C) transversa – sólidas – ascendente – macias e menos irritantes
- (D) ascendente – macias – transversa – sólidas e menos irritantes
- (E) descendente ou de sigmoide – sólidas – ascendente – macias e menos irritantes

13. Considere os procedimentos abaixo sobre o cuidado de enfermagem ao paciente com dor.

- I - Avaliação e registro da dor e suas características: localização, qualidade, frequência e duração.
- II - Administração de analgésicos conforme prescrição médica para promover o alívio da dor.
- III- Reavaliação da dor após administração de analgesia, dispensável caso o paciente esteja tranquilo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. São cuidados de enfermagem essenciais ao paciente submetido à cirurgia renal e que apresenta sistema de drenagem urinário, **EXCETO**:

- (A) monitorar a drenagem urinária rigorosamente quanto a alterações no volume, coloração e odor.
- (B) realizar, com cuidado, a irrigação quando for necessária e estiver prescrita, empregando-se solução estéril.
- (C) coletar adequadamente a urinálise e as culturas, uma vez que estão indicadas para acompanhar a evolução do paciente.
- (D) garantir que a bolsa de coleta esteja suspensa abaixo da bexiga, a fim de evitar o refluxo da urina para dentro do trato urinário.
- (E) higienizar o meato urinário a cada troca de solução de irrigação.

15. Os cuidados de prevenção de infecção são fundamentais, especialmente em casos de pacientes submetidos a transplantes. Os sinais e sintomas de infecção em pacientes pós-transplante renal incluem

- (A) sudorese intensa, taquicardia, oligúria e febre.
- (B) calafrios, oligúria, taquipneia e sudorese intensa.
- (C) taquicardia, taquipneia, aumento da pressão arterial e icterícia.
- (D) febre, perda de consciência, taquipneia e sudorese.
- (E) calafrios, febre, taquicardia, taquipneia.

16. A luxação da prótese de quadril é uma das potenciais complicações do paciente submetido à substituição total do quadril. Na prevenção dessa complicação, é correto afirmar que os membros inferiores devem ser mantidos em

- (A) abdução, não flexionando o quadril a mais de 90°.
- (B) adução, não flexionando o quadril a mais de 90°.
- (C) adução, não flexionando o quadril a mais de 45°.
- (D) abdução, não flexionando o quadril a mais de 45°.
- (E) adução, não flexionando o quadril em hipótese alguma.

17. O risco de tromboembolia venosa é elevado após cirurgia reconstrutiva do quadril. Os sinais de tromboembolia venosa incluem

- (A) hematoma, tumefação e dor intensa nos joelhos.
- (B) febre, sangramento na ferida operatória e dor nas articulações.
- (C) febre e dor na ferida operatória.
- (D) dor, tumefação e hipersensibilidade na panturrilha.
- (E) cefaleia, dor na ferida operatória e febre.

18. No monitoramento das complicações no pós-operatório de um paciente submetido a cirurgia intracraniana é indicado:

- (A) baixar a cabeceira, visando a reduzir a pressão intracraniana, e observar quanto ao mal epilético.
- (B) elevar a cabeceira, visando a reduzir a pressão intracraniana, e manter a função respiratória.
- (C) baixar a cabeceira, visando a elevar a pressão intracraniana, e manter a função respiratória.
- (D) elevar a cabeceira, visando a elevar a pressão intracraniana, e observar quanto ao mal epilético.
- (E) baixar a cabeceira, visando a reduzir a pressão intracraniana, e manter a função respiratória.

19. Paciente J.P., 79 anos, é submetido a cirurgia para remoção de tumor intestinal. Na prevenção de complicações no pós-operatório é correto afirmar:

- (A) deve ser estimulada a deambulação precoce a fim de diminuir o desconforto gastrointestinal e prevenir problemas circulatórios.
- (B) deve ser mantido repouso nas primeiras 24h devido ao risco de o paciente apresentar hipotensão ortostática.
- (C) o paciente deve ser desencorajado a movimentar-se nas primeiras 24h do pós-operatório para melhor controle da dor.
- (D) o paciente só poderá sair do leito a partir do segundo dia do pós-operatório.
- (E) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, evitando alternar decúbito pelo risco de evisceração.

20. É cuidado de enfermagem necessário para a prevenção de complicações ao paciente com traqueostomia:

- (A) aspirar a cânula de traqueostomia em intervalos regulares, mesmo se o paciente não apresentar secreção.
- (B) orientar o paciente sobre a necessidade de NPO, a fim de evitar aspiração.
- (C) monitorar a saturação de oxigênio.
- (D) administrar oxigênio sempre que o paciente apresentar tosse ou sentir-se desconfortável.
- (E) trocar o curativo somente uma vez ao dia para evitar deslocamento da cânula.

21. Para se obter valores mais fidedignos de medidas de pressão arterial, é correto afirmar que

- (A) o tamanho do manguito escolhido para aferição não influencia no resultado obtido.
- (B) a calibragem de rotina do esfigmomanômetro hospitalar é desnecessária, uma vez que a equipe de enfermagem recebe treinamento para o emprego da técnica correta.
- (C) o braço do paciente deve estar posicionado abaixo do nível do coração.
- (D) deve-se evitar a palpação da pressão sistólica antes da ausculta, pois poderá haver redução dos níveis tensionais.
- (E) o paciente deve evitar conversar durante a aferição, pois poderá haver aumento dos níveis tensionais.

22. De acordo com Brunner & Suddarth (2009), estima-se que 1,5 a 3 milhões de pacientes desenvolvem úlceras de pressão por ano. Considere as afirmações abaixo.

- I - A imobilidade, a cognição ou percepção sensorial prejudicada, a diminuição da perfusão tecidual e do estado nutricional, as forças de atrito e cisalhamento, a umidade aumentada e as alterações da pele relacionadas com a idade contribuem para o desenvolvimento das úlceras de pressão.
- II - As alterações frequentes de posição são necessárias no sentido de aliviar e redistribuir a pressão sobre a pele do paciente e de evitar o fluxo sanguíneo reduzido prolongado para a pele e tecidos subjacentes.
- III- Em geral, uma úlcera de pressão em estágio I é uma área de eritema que não embranquece; sendo assim, para melhorar a perfusão tecidual, recomenda-se a massagem nas áreas eritematosas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

23. Referente à técnica de curativo para úlceras de pressão em estágio II, que têm como característica o rompimento da pele, assinale a alternativa correta.

- (A) Utiliza-se meio seco para ajudar na cicatrização da ferida.
- (B) Aplicam-se jatos de soro fisiológico estéril para a limpeza da ferida.
- (C) Aplica-se a técnica de fricção para a limpeza da ferida.
- (D) Recomenda-se o uso de lâmpada de aquecimento para secar a ferida aberta.
- (E) Curativos oclusivos e semipermeáveis não são indicados.

24. Em relação à hipoxemia, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) pode levar a hipóxia.
- (B) alterações no estado mental e agitação são alguns dos seus sinais.
- (C) a frequência e o ritmo cardíaco permanecem inalterados.
- (D) cianose central é considerado um sinal tardio.
- (E) presença de membros frios e sudorese não são incomuns.

25. Considere os sinais e sintomas abaixo:

- I - dor torácica súbita e contínua, apesar do repouso e medicamento.
- II - frequência cardíaca e respiratória possivelmente mais rápidas que o normal.
- III- náuseas, vômitos e dor epigástrica.

Quais são compatíveis com um paciente com infarto agudo do miocárdio?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

26. A testagem de sonda nasointestinal em pacientes que recebem dieta por essa via, em sistema aberto, deve ser realizada com que frequência?

- (A) Uma vez ao dia.
- (B) Uma vez ao turno.
- (C) Antes de administrar cada dieta e/ou medicamentos.
- (D) Apenas quando a sonda é inserida.
- (E) A cada 48h.

27. O choque é definido como um estado fisiológico em que existe fluxo sanguíneo inadequado para os tecidos e células do organismo. Considerando as classificações de choque, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda:

- | | |
|------------------|---|
| (1) Hipovolêmico | () causado por alterações no tônus do músculo liso vascular. |
| (2) Cardiogênico | () causado por um quadro infeccioso. |
| (3) Séptico | () causado pela diminuição no volume intravascular. |
| (4) Anafilático | () causado por uma reação de hipersensibilidade. |
| (5) Neurogênico | () causado pela reduzida capacidade de bombeamento cardíaco. |

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 5 – 4 – 1.
- (B) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- (D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.

28. Referente aos cuidados de enfermagem ao paciente com dreno de tórax, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Orientar o paciente a manter repouso no leito e evitar tossir, para não deslocar o dreno.
- (B) Ordenhar delicadamente o equipo na direção do compartimento de drenagem.
- (C) Certificar-se de que as tampas e os intermediários do dreno estejam corretamente ajustados e sem presença de escape de ar.
- (D) Observar a oscilação da coluna de líquido no interior do frasco coletor – que deve estar de acordo com os movimentos respiratórios do paciente.
- (E) Manter o dreno mergulhado em solução estéril, em frasco coletor (selo d'água).

29. A broncoaspiração do conteúdo gástrico para os pulmões é uma grave complicação que pode provocar pneumonia. Existem fatores de risco para sua ocorrência, tais como:

- I - atividade convulsiva
- II - parada cardíaca
- III- sedação excessiva

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. São cuidados de enfermagem ao paciente com edema agudo de pulmão:

- (A) garroteamento dos membros superiores, verificação da oximetria de pulso e manutenção de decúbito dorso horizontal.
- (B) manutenção do paciente em posição ereta, preferencialmente com os membros inferiores pendentes, verificação da oximetria de pulso e tranquilização do paciente.
- (C) posicionamento do paciente com a cabeceira elevada em 30° para passagem de cateter venoso central em jugular e oferta de dieta líquida.
- (D) manutenção do carro de parada próximo ao leito, oferta de líquidos por via oral, posicionamento do paciente em decúbito dorso horizontal.
- (E) garroteamento dos membros inferiores, posicionamento do paciente em *trendelenburg*, oferta de líquidos por via oral não superior a 1000ml.

31. Os diferentes tipos de diabetes melito variam segundo a etiologia, evolução clínica e tratamento. Sobre o diabetes é correto afirmar que

- (A) é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia, decorrente da alteração na produção, secreção e ação da insulina.
- (B) a cetoacidose diabética é desencadeada por aplicação de doses elevadas de insulina.
- (C) no diabetes tipo I, há uma produção acentuada de glicose pelo pâncreas, o que torna o paciente dependente da insulina.
- (D) todas as mulheres que desenvolvem diabetes gestacional permanecem diabéticas após o parto.
- (E) dentre as insulinas usadas no controle do diabetes, a lispro e a regular têm seu pico de ação entre 4h e 6h, enquanto que a NPH e a glargina alcançam o pico entre 1h e 3h.

32. Considere as definições abaixo sobre hemorragias.

Denomina-se _____ o vômito com sangue que pode ser vermelho vivo ou com aparência de borra de café escura; _____, as fezes com cor de piche por causa da hemoglobina digerida; _____, a expectoração de sangue do trato respiratório, considerado um sintoma tanto de distúrbio pulmonar quanto cardíaco; _____, a hemorragia nasal causada pela ruptura de vasos na mucosa da região do nariz.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima.

- (A) hematêmese – enterorragia – epistaxe – hemoptise
- (B) hematêmese – melena – epistaxe – hemoptise
- (C) epistaxe – melena – hemoptise – hemostasia
- (D) hemoptise – hematêmese – hemostasia – epistaxe
- (E) hematêmese – melena – hemoptise – epistaxe

33. Considere as afirmativas sobre alterações vasculares periféricas.

- I - Na insuficiência venosa deve-se manter os membros afetados elevados, já na insuficiência arterial deve-se manter os membros afetados posicionados abaixo do nível do coração.
- II - Tipicamente, as úlceras arteriais são pequenas ulcerações circulares e profundas nas extremidades dos arcos, enquanto que as venosas são grandes, exsudativas e superficiais na área do maléolo medial ou lateral.
- III- Deve-se aplicar compressas geladas para diminuir a dor na insuficiência arterial, e calor para facilitar o retorno venoso na insuficiência venosa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

34. Referente aos conceitos relacionados às doenças infectocontagiosas, assinale a alternativa correta.

- (A) Infecção é a condição em que o hospedeiro interage fisiológica e imunologicamente com um micro-organismo.
- (B) O intervalo de tempo entre o contato com o agente e o aparecimento dos sinais e sintomas denomina-se latência.
- (C) Colonização é a consequência da invasão do corpo por um micro-organismo que pode provocar sintomas no hospedeiro e potencialmente levar à morte.
- (D) O intervalo de tempo depois da infecção primária durante o qual um micro-organismo é abrigado pelo hospedeiro sem provocar manifestação clínica chama-se período de incubação.
- (E) Bacteremia é a presença de bactérias e fungos na corrente sanguínea comprovada por exames laboratoriais.

35. Paciente com dor tem prescritos 3 mg de morfina via endovenosa (EV). A apresentação dessa medicação é em ampola de 1 ml contendo 10 mg/ml. Para a administração EV, deverá ser diluída em 9 ml de água destilada. Quantos ml dessa solução deverão ser administrados ao paciente?

- (A) 1 ml.
- (B) 2 ml.
- (C) 3 ml.
- (D) 5 ml.
- (E) 10 ml.

36. Paciente C.C.L. tem prescrição de Vancomicina 500 mg endovenosa de 12/12h. Em quantos ml você diluiria essa medicação em SG 5% ou SF 0,9%, cuja concentração máxima é 5 mg/ml?

- (A) 10 ml.
- (B) 20 ml.
- (C) 50 ml.
- (D) 100 ml.
- (E) 200 ml.

37. Um paciente está recebendo SG 5% (1.000 ml com 30 ml de NaCl 20% e 10 ml de KCl 10%) a 30 gotas/min de início às 9h. Qual o volume de soro que o paciente receberá até às 14h e 30 min?

- (A) 165 ml.
- (B) 495 ml.
- (C) 500 ml.
- (D) 595 ml.
- (E) 600 ml.

38. Referente à Norma Regulamentadora (NR-32) que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, examine as afirmações abaixo.

- I - É opcional ao empregador a entrega de instruções da capacitação oferecida sobre tais normas, mediante a assinatura do recibo pelo trabalhador.
- II - Todos os lavatórios e pias utilizados pelos trabalhadores devem possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato com as mãos quando do fechamento da água.
- III- O empregador deve vedar que o trabalhador fume, use adornos e manuseie lentes de contato nos postos de trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

39. Com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, a higiene das mãos é importante para a redução do risco de infecções. Em relação à higiene das mãos, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) deve ocorrer antes e após o contato com o paciente.
- (B) o uso de aliança é proibido somente nas áreas fechadas, pelo risco maior de infecção.
- (C) a higienização poderá ser feita com preparação alcoólica quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- (D) familiares e visitantes devem higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente.
- (E) a eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada.

40. Segundo Brunner & Suddarth (2009, p. 29), "O Processo de Enfermagem é uma conduta deliberada de resolução de problemas para satisfazer os cuidados de saúde e as necessidades de enfermagem das pessoas". Tal processo envolve várias etapas. Após a execução dessas etapas, a equipe de saúde procede aos registros referentes à assistência prestada. Com relação a esses registros assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os registros seguem as determinações de cada profissional de saúde, que define o local e a forma de registro que julgar apropriado.
- (B) Os registros nos prontuários dos pacientes servem como base legal diante de problemas éticos e ações judiciais.
- (C) Os registros servem para avaliar a qualidade do cuidado prestado e, por meio deles, é possível propor mudanças no cuidado implementado ao paciente.
- (D) Os registros fornecem dados úteis para a pesquisa e planejamento de ações de cuidado.
- (E) Os registros funcionam como um meio de comunicação entre os membros da equipe de saúde.