



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

### **MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## **EDITAL Nº 03/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS**

# **PS 16 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Psiquiatria)**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.**

**Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.**

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 03/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 16

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Psiquiatria)

01.	<b>E</b>	11.	<b>E</b>	21.	<b>D</b>	31.	<b>A</b>
02.	<b>A</b>	12.	<b>D</b>	22.	<b>A</b>	32.	<b>B</b>
03.	<b>B</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>E</b>	33.	<b>D</b>
04.	<b>E</b>	14.	<b>C</b>	24.	<b>D</b>	34.	<b>C</b>
05.	<b>A</b>	15.	<b>C</b>	25.	<b>E</b>	35.	<b>B</b>
06.	<b>B</b>	16.	ANULADA	26.	<b>D</b>	36.	<b>C</b>
07.	<b>A</b>	17.	<b>D</b>	27.	<b>C</b>	37.	<b>D</b>
08.	<b>E</b>	18.	<b>E</b>	28.	<b>D</b>	38.	<b>E</b>
09.	<b>E</b>	19.	<b>B</b>	29.	<b>C</b>	39.	<b>D</b>
10.	<b>B</b>	20.	<b>C</b>	30.	ANULADA	40.	<b>A</b>

# INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA contém **40** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** Os pacientes \_\_\_\_\_ podem ter comportamentos opostos aos dos pacientes com depressão, no sentido de que são \_\_\_\_\_ em relação aos seus sentimentos e, com freqüência, \_\_\_\_\_, precisando da ajuda da enfermagem para ajustar e modelar seu comportamento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) maníacos – pouco expansivos – hipoverbais
- (B) psicóticos – pouco expansivos – hiperverbais
- (C) psicóticos – demasiadamente expansivos – hipoverbais
- (D) psicóticos – demasiadamente expansivos – hiperverbais
- (E) maníacos – demasiadamente expansivos – hiperverbais

**02.** São cuidados de enfermagem para com paciente que apresenta quadro de depressão, além do monitoramento da dieta,

- (A) promover padrões de sono e o autocuidado.
- (B) incentivá-lo a permanecer na cama e promover o autocuidado.
- (C) incentivar cochilos freqüentes e promover o autocuidado.
- (D) incentivar cochilos freqüentes e apressá-lo no autocuidado.
- (E) promover padrões de sono e apressá-lo no autocuidado.

**03.** São características de pacientes maníacos:

- (A) auto-estima elevada, sintomas vegetativos, hipoa-tividade.
- (B) auto-estima elevada, ausência de vergonha ou culpa, hiperatividade.
- (C) humor não-reativo, sintomas vegetativos, hiperatividade.
- (D) baixa auto-estima, ausência de vergonha ou culpa, hipoa-tividade.
- (E) baixa auto-estima, sentimento de vergonha ou culpa, hipoa-tividade.

**04.** A necessidade intensa e desagradável de se mover, associada a uma sensação subjetiva de impossibilidade de se movimentar, ocasionada pelo uso de antipsicóticos de alta potência e demais antipsicóticos, denomina-se

- (A) acinesia.
- (B) distonia.
- (C) vertigem.
- (D) sialorréia.
- (E) acatisia.

**05.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os transtornos de personalidade aos grupos nos quais podem ser enquadrados.

- 1 - de natureza excêntrica ( ) Paranóide
- 2 - de natureza instável ( ) Esquizóide
- 3 - de natureza ansiosa ( ) *Borderline*  
( ) Histriônica  
( ) Dependente  
( ) Obsessivo-Compulsivo

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3.
- (B) 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 3.
- (C) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1.
- (D) 2 – 1 – 2 – 3 – 3 – 2.
- (E) 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2.

**06.** O indivíduo com Transtorno de Personalidade *Borderline* pode ser autodestrutivo. Para ele, pode ser necessário um ambiente social encontrado em hospitais. O trabalho de enfermagem com esse tipo de paciente deve ter como foco

- (A) identificar-se com o paciente, colaborar ativamente e clarificar conflitos.
- (B) manter expectativas realistas, manter ambiente estruturado e clarificar conflitos.
- (C) manter expectativas realistas, identificar-se com o paciente e manter ambiente estruturado.
- (D) identificar-se com o paciente, manter ambiente estruturado e clarificar conflitos.
- (E) manter ambiente estruturado, clarificar conflitos e manipular as emoções do paciente.

**07.** Os pesquisadores têm tentado identificar os pacientes mais propensos a se tornarem violentos. As pesquisas indicam, particularmente, duas populações de pacientes em risco. Quais são elas?

- (A) Pacientes com sintomas psicóticos ativos e pacientes com transtorno de abuso de substâncias.
- (B) Pacientes com sintomas psicóticos ativos e pacientes com nível sócio-econômico baixo.
- (C) Pacientes com transtorno de abuso de substâncias e pacientes com nível sócio-econômico baixo.
- (D) Pacientes adolescentes e pacientes com sintomas psicóticos inativos.
- (E) Pacientes adolescentes e pacientes com transtorno psiquiátrico.

**08.** O uso de uma intervenção verbal e não-verbal precoce, com pacientes que estejam em risco para comportamento violento, pode evitar uma situação de crise. Considere as estratégias de comunicação abaixo.

- I - Não permitir que o paciente fale, a fim de que não "cresça" na sua conduta violenta.
- II - Falar com o paciente em um tom calmo e baixo, usando frases curtas e simples.
- III- Demonstrar controle sobre a situação, sem assumir uma posição excessivamente autoritária.
- IV- Não falar de modo provocador, criticando o paciente.

Quais podem ser utilizadas na prevenção do comportamento agressivo?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**09.** O comportamento suicida geralmente é dividido nas categorias: ameaça de suicídio, tentativas de suicídio e suicídio consumado. Em relação à ameaça de suicídio, considere as afirmações abaixo.

- I - Pode ser velada, geralmente ocorrendo antes da tentativa de suicídio manifesta.
- II - É uma indicação de ambivalência, geralmente presente no comportamento suicida.
- III- Pode ser um esforço daquele que a realiza para descobrir se alguém se preocupa o suficiente com ele a ponto de evitar que faça algum mal a si mesmo.
- IV- Pode ser revelada através de comunicação não-verbal, tal como distribuir objetos de valor, afastar-se dos amigos e fazer arranjos para o funeral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**10.** Sabendo que, para investigar o risco de suicídio, a história do paciente constitui um dos aspectos que deve ser avaliado pela enfermagem, contendo informações fundamentais para a identificação e avaliação desse risco, considere os aspectos abaixo.

- I - história de tentativas anteriores de suicídio
- II - história de gastos excessivos e conduta promíscua
- III- história familiar de tentativas de suicídio
- IV - história familiar de abuso de substâncias

Quais constituem fatores de risco para suicídio?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**11.** A ansiedade é uma emoção e uma experiência individual subjetiva, provocada pelo desconhecido e precedendo todas as novas experiências de vida. Um estado de ansiedade pode provocar no ser humano respostas fisiológicas, comportamentais e afetivas.

Entre as respostas afetivas abaixo, identifique aquelas relacionadas a um quadro de ansiedade.

- (A) alucinação – delírio – tensão – inquietação
- (B) hipersonia – delírio – nervosismo – medo
- (C) alucinação – mutismo – tensão – medo
- (D) delírio – mutismo – tensão – medo
- (E) tensão – nervosismo – medo – inquietação

**12.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere a intervenções que podem ser contempladas pelo plano de tratamento de enfermagem dirigido a um paciente com nível de ansiedade intensa e com pânico.

- ( ) Propiciar muito estímulo ambiental, ampliando o máximo possível a interação do paciente com as demais pessoas.
- ( ) Ter uma postura calma com o paciente.
- ( ) Identificar e modificar situações ansiogênicas para o paciente.
- ( ) Envolver membros da família tanto quanto possível.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – V – F.

**13.** O esquizofrênico apresenta alterações no movimento e no comportamento. Uma dessas alterações é a catatonía, cuja definição é

- (A) dificuldade de executar uma tarefa voluntária organizada e relativamente complexa.
- (B) presença de movimentos faciais anormais, os quais estão além do controle do paciente.
- (C) estado estuporoso, no qual o paciente pode necessitar de cuidados físicos completos de enfermagem.
- (D) presença de movimentos oculares anormais, incluindo dificuldade para acompanhar algo em movimento.
- (E) presença de gestos não apropriados à situação, como, por exemplo, parar de falar no meio de uma frase para girar dois dedos no ar.

**14.** A esquizofrenia é uma doença mental séria e persistente, que resulta em comportamento psicótico, atingindo cerca de uma em cada cem pessoas. Ocasionalmente sérios problemas no funcionamento cognitivo, alterando o conteúdo do pensamento.

Uma dessas alterações é

- (A) a insônia.
- (B) o afeto eufórico.
- (C) o delírio.
- (D) a hiperatividade.
- (E) a perda de apetite.

**15.** Um importante sistema de classificação dos sintomas de esquizofrenia relaciona-os como "positivos" (comportamentos adicionais) e "negativos" (*deficit* de comportamentos). Considere os sintomas abaixo.

- I - delírios paranóides e grandiosos
- II - incapacidade de sentir prazer
- III- incapacidade de manter contatos sociais
- IV - alucinações auditivas

Quais constituem sintomas "negativos" da esquizofrenia?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**16.** Os pacientes lidam com o delírio de diversas maneiras, exigindo que a enfermagem identifique estratégias para trabalhar com o paciente delirante. Considere as estratégias de trabalho abaixo.

- I - Usar frases claras, diretas e simples.
- II - Concordar com os delírios, tentando obter a cooperação do paciente.
- III- Tentar encontrar uma explicação lógica para o delírio.
- IV - Nunca permitir que o paciente fale de seu delírio, mudando de assunto sempre que ele tentar fazê-lo.

Quais podem ser adotadas, pelo enfermeiro, quando do atendimento desses pacientes?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**17.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os tipos de drogas psicoativas às suas respectivas características.

- 1 - São um meio de obter sensação de euforia com rápido início, baixo custo e facilidade de obtenção.
- 2 - Criam experiências muito similares às que são típicas de um estado psicótico.
- 3 - Os mais comuns são anfetamina e cocaína.
- 4 - Embora algumas pessoas os utilizem com fins terapêuticos durante anos, pessoas com adicção freqüentemente apresentam deterioração mental e física.

- ( ) estimulantes
- ( ) opiáceos
- ( ) inalantes
- ( ) alucinógenos

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 2 - 3 - 4.
- (B) 1 - 2 - 4 - 3.
- (C) 3 - 4 - 2 - 1.
- (D) 3 - 4 - 1 - 2.
- (E) 4 - 2 - 1 - 3.

18. A maconha às vezes é classificada como uma droga alucinógena que \_\_\_\_\_ causa alucinações. Ela acarreta \_\_\_\_\_, mas não é primariamente um \_\_\_\_\_ do sistema nervoso central. Os ingredientes ativos da maconha são os tetraidrocanabinóides.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) sempre – euforia – estimulador
- (B) nunca – sedação – depressor
- (C) raramente – euforia – estimulador
- (D) sempre – sedação – depressor
- (E) raramente – sedação – depressor

19. No que se refere às injeções intramusculares, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Há medicamentos que exigem grande massa muscular, uma vez que uma maior superfície possibilita acentuada velocidade de absorção. Caso a injeção do medicamento corresponda a um volume superior ao permitido, pode haver aumento da tensão local, compressão vascular e edema local.
- (B) Deve-se escolher a região dorso-glútea como a última alternativa a ser utilizada para aplicação, em virtude do nervo circunflexo e das ramificações de vasos na sua porção superior esquerda.
- (C) Não é recomendado realizar repetidas injeções no mesmo local.
- (D) Deve-se escolher adequadamente a agulha e a seringa a serem utilizadas.
- (E) Deve-se aspirar o êmbolo antes de injetar o medicamento, pois, se introduzido no vaso, poderá causar embolia seguida de isquemia e de necrose.

20. No que se refere à administração de medicamentos, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O volume máximo de medicamento a ser introduzido no deltóide não deve ultrapassar 4 ml. Além disso, não se deve realizar um grande número de aplicações medicamentosas consecutivas nessa área, visto apresentar uma massa relativamente pequena.
- ( ) A injeção endovenosa consiste na introdução de droga diretamente na corrente sanguínea. Seu uso permite administração de grande quantidade de volume de líquidos e rapidez de efeito.
- ( ) A região subcutânea é uma via que não tolera substâncias irritantes, recebendo somente drogas em soluções isotônicas, oleosas, aquosas, cristalinas ou coloidais.
- ( ) A via oral constitui um dos métodos de administração de medicamentos mais comuns, por ser uma via prática, econômica e segura. Os medicamentos orais são de uso ilimitado, inclusive no caso de pacientes com dificuldade para deglutir.
- ( ) A via parenteral é um método antieconômico de administração de medicamentos, por ser necessário utilizar material caro e por exigir uma técnica especializada. É indolor, propicia uma melhor adesão ao tratamento, constituindo uma vantagem desse método.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) F – V – V – F – F.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – F – V – F – F.

21. Considere as afirmações abaixo no que se refere a benzodiazepínicos.

- I - Causam sonolência.
- II - Causam dependência física, mas não psicológica.
- III- Levam aos mesmos sintomas de abstinência que o álcool.
- IV - Aliviam ansiedade e possuem amplo índice terapêutico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22. Em relação aos cuidados de enfermagem para com pacientes que apresentam transtorno de personalidade, assinale a conduta **INCORRETA**.

- (A) Aceitar o comportamento social desadaptado do paciente.
- (B) Incentivar o paciente a identificar seus pontos fortes.
- (C) Manter um comportamento consistente em toda equipe de enfermagem.
- (D) Reforçar as respostas sociais adequadas do paciente.
- (E) Sugerir ao paciente comportamentos alternativos.

23. Quanto ao comportamento autodestrutivo ou automutilador de alguns pacientes com transtornos psiquiátricos, a enfermagem deve manter alguns cuidados, **EXCETO**

- (A) oferecer ao paciente medicamentos prescritos.
- (B) oferecer ao paciente vigilância atenta e individualizada.
- (C) retirar do paciente objetos potencialmente perigosos.
- (D) sugerir comportamentos alternativos ao paciente.
- (E) evitar que o paciente fale de seus sentimentos relativos à automutilação.

24. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os efeitos colaterais de medicamentos às suas respectivas características.

- 1 - *rash* cutâneo
- 2 - roda denteada
- 3 - sialorréia
- 4 - xeroftalmia
- 5 - hipotensão postural

- ( ) constitui o ressecamento da conjuntiva ocular
- ( ) constitui a produção excessiva de saliva
- ( ) causado por alergia ao fármaco
- ( ) constitui rigidez provocada por antipsicóticos
- ( ) constitui queda da pressão arterial

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
- (C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- (E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.

25. Sabendo-se que o *delirium* é uma perturbação aguda no nível de consciência, geralmente de causa metabólica, tóxica, infecciosa ou secundária ao uso de drogas, considere os cuidados de enfermagem abaixo.

- I - Manter o paciente em ambiente bem iluminado, mas com poucos estímulos.
- II - Usar indicadores que facilitem a orientação do paciente (ex.: relógio, calendário).
- III- Explicar ao paciente, de forma clara, a razão de sua contenção mecânica, quando esse procedimento for necessário.

Quais são necessários para com o paciente que apresenta *delirium*?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

26. No que se refere às responsabilidades do profissional de Enfermagem, assinale a afirmação que está de acordo com o Código de Ética de Enfermagem.

- (A) Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem ao cliente sob sua responsabilidade.
- (B) Prestar à clientela uma assistência de Enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.
- (C) Exercer a profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais de Enfermagem.
- (D) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, da coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- (E) Facilitar a fiscalização do exercício profissional.

27. É **PROIBIDO**, ao profissional de enfermagem,

- (A) prestar informações adequadas ao cliente e à sua família acerca da assistência de enfermagem, tais como possíveis benefícios, riscos e conseqüências que possam ocorrer.
- (B) colaborar com a equipe de saúde na orientação do cliente ou de seu responsável quanto aos riscos dos exames ou de outros procedimentos aos quais o paciente se submeterá.
- (C) fazer com que o paciente participe de tratamento sem o seu consentimento ou do seu responsável legal.
- (D) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento, em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos por lei.
- (E) responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.

**28.** A nutrição é o processo pelo qual o organismo utiliza o alimento para alcançar e manter a saúde. A ocorrência de um jejum prolongado ou de desnutrição agrava as condições gerais e retarda o processo de cura dos pacientes hospitalizados. Assim, para auxiliar nas necessidades básicas em desequilíbrio, revertendo-as, muitos precisam de suporte nutricional de apoio.

Considere as afirmações abaixo no que se refere à nutrição parenteral.

- I - A administração de nutrientes, carboidratos, lipídios, eletrólitos, vitaminas e lipo-elementos pode ser realizada por via sistêmica.
- II - Também tem por objetivo a cicatrização de feridas e anastomoses.
- III- Não é indicada para pacientes portadores de insuficiências renais e hepáticas, em pré e pós-operatórios de grandes cirurgias gastrointestinais e em comas prolongados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**29.** Em um homem adulto, a frequência de movimentos respiratórios é considerada normal quando entre \_\_\_\_\_ mpm. Um aumento anormal da frequência respiratória é chamado de \_\_\_\_\_ e um decréscimo anormal é denominado \_\_\_\_\_. A respiração normal chama-se \_\_\_\_\_, enquanto a ausência de movimentos respiratórios chama-se \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 10 e 18 – bradipnéia – taquipnéia – apnéia – dispnéia
- (B) 10 e 20 – taquipnéia – dispnéia – apnéia – eupnéia
- (C) 12 e 18 – taquipnéia – bradipnéia – eupnéia – apnéia
- (D) 12 e 18 – dispnéia – bradipnéia – eupnéia – apnéia
- (E) 12 e 20 – dispnéia – bradipnéia – eupnéia – apnéia

**30.** No que se refere a um paciente que necessite de oxigenoterapia, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O oxigênio resseca e irrita as membranas mucosas, por isso deve ser umidificado.
- (B) O enfermeiro deve orientar o paciente para que respire somente pelo nariz ou pela boca, para um maior aproveitamento do O<sub>2</sub> administrado.
- (C) Para evitar lesões na narina e desconforto, é necessário que o enfermeiro meça a distância da ponta do nariz ao lobo da orelha para, então, introduzir o cateter na narina.
- (D) O enfermeiro deve realizar a troca de cateter nasal de uma narina para outra a cada 6 horas, evitando o ressecamento em excesso da narina do paciente.
- (E) O enfermeiro deve desprezar o cateter a cada 24 horas, visando à profilaxia de infecções.

**31.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as patologias às suas respectivas características.

- 1 - anorexia nervosa
- 2 - bulimia nervosa
- 3 - transtorno de compulsão periódica

- ( ) Episódios recorrentes de hiperfagia, com uma sensação de falta de controle sobre o comportamento alimentar e uma preocupação excessiva com o peso.
- ( ) Medo intenso de ganhar peso, mesmo em pessoas abaixo do peso ideal.
- ( ) Episódios recorrentes de vômitos provocados e de utilização de laxantes.
- ( ) Episódios recorrentes de hiperfagia, que causam sofrimento, com uma sensação de falta de controle sobre o comportamento alimentar, mas sem comportamentos destinados a evitar ganho de peso.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 1 – 1 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2 – 3.
- (E) 2 – 1 – 3 – 1.

32. São características psicológicas associadas a transtornos alimentares:

- (A) perfeccionismo, pensamento desagregado, vergonha.
- (B) medo da sexualidade, depressão, intolerância à frustração.
- (C) baixa auto-estima, ansiedade, transtorno afetivo bipolar.
- (D) auto-imagem distorcida, choro fácil, pensamento desagregado.
- (E) hipersexualidade, obsessões, vergonha.

33. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a uma das características da anorexia nervosa.

- (A) rituais com alimentos
- (B) perda de peso mais grave
- (C) introversão
- (D) uso abusivo de diuréticos e/ou laxantes
- (E) amenorréia

34. A Naltrexona é um antagonista de

- (A) benzodiazepínicos.
- (B) barbitúricos.
- (C) opiáceos.
- (D) anfetaminas.
- (E) cocaína.

35. As alternativas abaixo correspondem a características relacionadas ao paciente agressivo, **EXCETO**

- (A) apresentar conteúdo da fala exagerado.
- (B) manter pouco ou nenhum contato visual.
- (C) manter postura tensa.
- (D) realizar gestos ameaçadores ou expansivos.
- (E) invadir o espaço pessoal alheio.

36. Quais as respostas fisiológicas do paciente com sintomas de ansiedade?

- (A) Hipervigilância, inibição e hiperventilação.
- (B) Nervosismo, impaciência e desconforto.
- (C) Taquicardia, hipertensão arterial e palpitações.
- (D) Cegueira, paralisia e descontrole de impulso.
- (E) Tensão, impaciência e tremores.

37. Qual a forma mais comum de comportamento auto-abusivo?

- (A) Tatuagem o corpo.
- (B) Realizar circuncisão.
- (C) Furar as orelhas.
- (D) Morder os dedos.
- (E) Roer as unhas.

38. Sabendo ser a alimentação uma fonte de nutrição da maior importância para o paciente, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (Falso) no que se refere à nutrição enteral.

- ( ) O alimento é introduzido através de uma ostomia ou sonda nasoenteral.
- ( ) Durante a administração da alimentação ou de medicações, deve-se manter o paciente sempre no leito, em decúbito ventral.
- ( ) Considera-se nutrição enteral a introdução de alimentos na via digestiva fisiológica, ao nível gástrico duodeno-jejunal.
- ( ) A presença de sonda naso-entérica (SNE) no pulmão pode ser observada através de tosse e cianose.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – F – V – V.

39. Considere as afirmações abaixo no que se refere a procedimentos de verificação da sonda naso-entérica (SNE) no estômago.

- I - Quando a SNE se encontra no pulmão, ao mergulharmos a parte externa da SNE em um copo com água, a água não borbulha.
- II - O ar injetado através da SNE, no estômago, produz ruídos que são auscultados através do estetoscópio.
- III- Ao aspirar a SNE com auxílio de uma seringa, a presença de suco gástrico e resíduos nos dá a certeza de que a sonda está no lugar desejado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

40. As intervenções terapêuticas de enfermagem, quando das alucinações, envolvem a compreensão das características da alucinação e a identificação do nível de ansiedade relacionado. As alternativas abaixo constituem tipos de alucinações, **EXCETO**

- (A) mística.
- (B) visual.
- (C) gustativa.
- (D) olfativa.
- (E) auditiva.