



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 18 – ENFERMEIRO (Internação Obstétrica)

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 18

ENFERMEIRO (Internação Obstétrica)

01.	E	11.	E	21.	C
02.	D	12.	E	22.	E
03.	B	13.	C	23.	B
04.	D	14.	A	24.	C
05.	C	15.	A	25.	D
06.	C	16.	A		
07.	E	17.	D		
08.	ANULADA	18.	A		
09.	B	19.	D		
10.	ANULADA	20.	B		

INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA contém **25** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. A importância do aleitamento materno tem sido exaustivamente documentada em diversas publicações, porém a ênfase na amamentação exclusiva é um fato relativamente recente.

Dentre as alternativas abaixo, indique a que corresponde ao período de amamentação exclusiva recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

- (A) 1 a 2 meses
- (B) 2 a 3 meses
- (C) 3 a 4 meses
- (D) 4 a 6 meses
- (E) 6 meses

02. Com relação à amamentação, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Na técnica de amamentação adequada, é importante que o corpo do bebê esteja voltado para o corpo da mãe e próximo a ela, permitindo que sua boca permaneça na altura do mamilo e da aréola.
- () A pega e ordenha inadequadas podem acarretar uma mamada ineficiente, tornando-se difícil para o bebê retirar o leite posterior (do final da mamada), mais rico em calorias.
- () As práticas hospitalares, incluindo o tipo de parto, a amamentação precoce, o alojamento conjunto e a orientação e auxílio dos profissionais de saúde na prática de amamentação, não são fatores que interferem na continuidade do aleitamento materno.
- () Para a mulher, do ponto de vista biológico, a amamentação contribui para a retração do útero no pós-parto, diminuindo a perda sanguínea e protegendo, portanto, as reservas maternas de ferro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – F.

03. Considere as recomendações abaixo, dadas por um enfermeiro, ao orientar uma gestante diabética quanto à auto-aplicação de insulina, no caso de utilização de insulinas de ações diferentes em uma única seringa, para injeção simultânea.

I - Nunca se deve aspirar primeiramente a insulina regular, e a aplicação deve ser de cinco (5) a dez (10) minutos após o preparo.

II - A insulina de ação intermediária deve ser aplicada até cinco (5) minutos após o preparo, pois pode "contaminar" a insulina regular, retardando seu tempo de ação.

III- Deve-se aspirar primeiramente a insulina Lispro e, após, a regular, aplicando conforme rodízio dos locais de injeção subcutânea.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

04. É fator de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional a ocorrência de

- (A) convulsões antes da gestação.
- (B) emagrecimento durante a gestação.
- (C) infecção urinária durante a gestação.
- (D) obesidade ou ganho excessivo de peso durante a gestação.
- (E) idade da gestante menor do que 25 anos.

05. Indique a alternativa que menciona manifestações ocorridas durante o puerpério que **NÃO** são consideradas alterações anatômicas e fisiológicas.

- (A) Ocorre o aumento da temperatura axilar (36,8° C a 37,9° C) nas primeiras 24 horas.
- (B) Ocorrem calafrios, mais freqüentes nas primeiras horas após o parto.
- (C) Ocorre leucopenia durante o puerpério.
- (D) O útero atinge a cicatriz umbilical após o parto e, posteriormente, regride em torno de 1 cm ao dia.
- (E) Aumenta o volume circulante, devido à presença de sopro sistólico de hiperfluxo.

06. Indique a alternativa que **NÃO** apresenta um cuidado de enfermagem durante o quarto período do parto.

- (A) Verificar sinais vitais a cada 15 minutos.
- (B) Avaliar o fundo uterino e massagear o útero até que seja constatado um aumento do tônus (globo de segurança de Pinard).
- (C) Observar o intervalo e a duração das contrações uterinas.
- (D) Manter uma bolsa de gelo no períneo.
- (E) Avaliar o aspecto dos lóquios.

07. Com relação aos cuidados de enfermagem com o recém-nascido, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Ao nascer, o vérnix caseoso não deve ser totalmente removido.
- () A higiene do coto umbilical é feita com álcool a 70%, quatro vezes ao dia.
- () A remoção do *cord clamp* deve ocorrer após 48 horas de vida.
- () A área retal das meninas deve ser limpa de frente para trás, evitando levar germes para a uretra.
- () No banho diário, quando ainda houver coto umbilical, a higiene corporal deve ser feita com pano úmido em movimentos de massagem sobre a pele.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V – V.

08. Considere as afirmações abaixo, relativas ao puerpério.

- I - As transformações que se iniciam no puerpério ocorrem não somente nos aspectos endócrino e genital, mas no organismo da mulher como um todo.
- II - Didaticamente, divide-se puerpério em imediato (1º ao 10º dia), remoto (11º ao 42º dia) e tardio (a partir do 43º dia).
- III- Puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu término imprevisto, devido a modificações que ocorrem durante a lactância (amamentação).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. O nascimento pré-termo continua sendo uma importante causa de mortalidade perinatal. Considerando as ocorrências abaixo, indique as que são fatores de risco para o parto pré-termo, assinalando **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () gestação múltipla
- () ruptura prematura de membranas
- () corioamnionite
- () idade materna inferior a 35 anos
- () tabagismo

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) F – F – V – V – F.

10. Indique, dentre as manifestações abaixo, as que são sinais e sintomas de trabalho de parto prematuro.

- I - dor em baixo ventre
- II - diminuição da frequência urinária
- III- ruptura prematura de membranas

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

11. Considere as afirmações abaixo, relativas aos aspectos bioéticos da confidencialidade e privacidade.

- I - A garantia da preservação do segredo das informações é um dever *prima facie* de todos os profissionais e também das instituições.
- II - A preservação das informações é um compromisso de todos, sendo a confidencialidade um valor que deve ser transmitido aos alunos dos hospitais universitários.
- III- Pode existir exceção à preservação de informações, desde que por justa causa e com amparo na legislação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

12. A atenção obstétrica e neonatal humanizada, baseada em evidências científicas e preconizada pelo Ministério da Saúde como política nacional, está fundamentada em vários princípios e diretrizes. Assinale a alternativa que **NÃO** constitui um desses princípios ou diretrizes.

- (A) Respeito às características fisiológicas da gestação, do parto, do nascimento e do puerpério, ao fortalecimento da autonomia da mulher e à preservação da sua privacidade.
- (B) Adoção de práticas e rotinas cujos benefícios estejam comprovados por evidências científicas, evitando-se manobras e intervenções desnecessárias.
- (C) Estímulo ao parto normal e ao aleitamento materno, com alojamento conjunto.
- (D) Resgate dos processos da gestação, do parto, do puerpério e do nascimento como experiências humanas mais significativas, que envolvem não só a mulher, mas seu parceiro e sua família.
- (E) Forte ênfase na utilização de tecnologia e intervenções segundo níveis crescentes de complexidade.

13. O Processo de Enfermagem é a metodologia utilizada para sistematizar a assistência de enfermagem, organizando as informações sobre os pacientes e determinando as intervenções que atendam as suas necessidades. Assinale a alternativa correta quanto à ordem dos cinco passos do Processo de Enfermagem.

- (A) identificação do problema – investigação – coleta de dados – planejamento do cuidado – implementação do cuidado – avaliação dos resultados
- (B) investigação – planejamento do cuidado – implementação do cuidado – identificação do problema – diagnóstico – avaliação do resultado
- (C) investigação – identificação do problema – planejamento do cuidado – interpretação do problema (implementação do cuidado) – avaliação do resultado
- (D) avaliação do resultado – identificação do problema – planejamento do cuidado – coleta de dados – implementação do cuidado
- (E) diagnóstico – planejamento do cuidado – coleta de dados – implementação do cuidado – avaliação do resultado

14. Julgamentos clínicos sobre as respostas do paciente, de sua família ou da comunidade, com relação aos problemas de saúde ou os processos de vida, vigentes ou potenciais.

A definição acima refere-se a

- (A) Diagnóstico de Enfermagem.
- (B) Coleta de Dados.
- (C) Planejamento do Cuidado.
- (D) Investigação.
- (E) Implementação do Cuidado.

15. A gestação é um fenômeno cuja evolução se dá, na maior parte das vezes, sem intercorrências. Contudo, existem gestações com maior probabilidade de ter uma evolução desfavorável, tanto para o feto quanto para a mãe – as chamadas Gestações de Alto Risco.

Com relação à gestação de alto risco, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Para a mãe, o risco se estende até 30 dias após o nascimento, pois as complicações maternas costumam se resolver durante o mês posterior ao parto.
- () É maior a incidência em mulheres com menos de 17 anos ou mais de 35 anos.
- () Considerando que uma gestação se dá diferentemente de outra, a história reprodutiva anterior não é fator de risco na gestação.
- () O desvio quanto ao crescimento uterino, ao número de fetos e ao volume de líquido amniótico e o ganho ponderal inadequado materno são considerados fatores de risco reprodutivos.
- () O peso inferior a 45 kg ou superior a 75 kg e a estatura inferior a 1,45 m são fatores predisponentes de risco na gestação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – F – F – V – F.

16. No início da gravidez, ocorrem várias alterações fisiológicas (sinais e sintomas), que o profissional da saúde deve avaliar antes de considerar um diagnóstico investigativo de gestação.

Relacione os sinais abaixo apresentados à sua classificação.

- (1) sinais de presunção
 - (2) sinais de certeza
 - (3) sinais de probabilidade
-
- () presença de batimentos cardíacos fetais – movimentação fetal – presença de feto (confirmada por ecografia obstétrica)
 - () aumento uterino – contrações de Braxton Hicks – gravidez (confirmada por teste de gravidez)
 - () amenorréia – náuseas com ou sem vômitos – modificações nas mamas – aumento de frequência urinária – movimentação fetal

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

17. A Incompatibilidade Sangüínea Materno-Fetal ocorre quando o organismo de uma mulher grávida é estimulado a produzir anticorpos contra as células vermelhas do fator Rh ou do sistema ABO do feto.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta cuidados de enfermagem com gestante ou parturiente isoimunizada.

- (A) Avaliar os batimentos cardíacos fetais cuidadosamente, investigando sinais de sofrimento fetal.
- (B) Coletar sangue da mãe e do cordão do recém-nascido logo após o parto, para realização de teste de Coombs direto e indireto e de tipagem sangüínea e de fator Rh do bebê.
- (C) Orientar sobre os riscos para as gestações futuras.
- (D) Aplicar imunoglobulina anti-D até 72 horas posteriores ao parto, após amniocentese, gestação ectópica e abortamento.
- (E) Orientar a gestante quanto ao controle diário dos movimentos fetais.

18. Considere as afirmações abaixo, relativas a intercorrências e complicações do período gestacional.

- I - A ruptura uterina é caracterizada por dor repentina e aguda no baixo ventre e sinais de sofrimento fetal, podendo levar a gestante a choque hipovolêmico.
- II - O descolamento prematuro de placenta geralmente ocorre a partir da 28ª semana de gestação e é caracterizado por sangramento vermelho vivo, indolor, recorrente, progressivo, sem causa aparente e com início e cessar súbitos.
- III - A placenta prévia é caracterizada por dor abdominal de intensidade variável, hipertonia uterina e perda sangüínea de cor vermelho-escura, podendo ser interna ou externa e em quantidade variável, discordante com o quadro de choque materno.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

19. Com relação à gestante parturiente ou puérpera portadora do vírus HIV é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o uso de AZT deve ser iniciado a partir da 14ª semana, até o parto.
- (B) a ruptura das membranas amnióticas aumenta o risco de transmissão vertical.
- (C) se deve proceder ao clampeamento do cordão umbilical imediatamente após a expulsão do neonato.
- (D) se deve estimular a amamentação em livre demanda.
- (E) a via de parto a ser adotada dependerá da situação imunológica (CD4+) e virológica (Carga Viral) da gestante.

20. Com relação aos aspectos emocionais durante a gestação, o parto e o puerpério, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O medo do parto, o medo de não ser capaz de parir, o sentimento de solidão e o medo da morte podem ser responsáveis por reações desesperadas da gestante em trabalho de parto.
- () As manifestações emocionais na gestação são decorrentes apenas das intensas alterações hormonais.
- () A ambivalência afetiva é a vivência básica da gestação e só se manifesta no terceiro trimestre da gravidez.
- () No segundo trimestre, a percepção dos movimentos fetais é a característica mais marcante, quando há a confirmação de gestação e a comunicação entre a mãe e o bebê se intensifica.
- () A puérpera precisa adaptar-se aos novos papéis de mãe e nutriz, sendo essas mudanças tão intensas que a tornam sensível, confusa e ansiosa, especialmente nos primeiros dias do puerpério.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

21. Na área obstétrica, as doenças infectocontagiosas podem causar vários comprometimentos ao binômio mãe-bebê, como, por exemplo, abortamento, morte fetal, malformação congênita, trabalho de parto prematuro e gestação ectópica. Considerando-se isso, pode-se afirmar que

- I - se deve vacinar a gestante contra rubéola.
- II - na toxoplasmose, deve-se orientar, como medida de prevenção, a ingestão de verduras bem lavadas ou cozidas e de carnes bem cozidas. As gestantes que possuem gato em casa devem ser alertadas para que lavem as mãos após contato com o animal, não o alimentem com carnes cruas e não limpem pessoalmente o local em que ele dorme.
- III - a transmissão transplacentária da sífilis ocorre somente no 1º trimestre da gestação, e o grau de risco está relacionado com a quantidade de espiroquetas na corrente sanguínea materna.
- IV - se deve evitar o parto vaginal em parturiente que apresente herpes genital ativo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

22. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2000), a ruptura prematura de membranas é responsável por 1/3 dos partos pré-termos, contribuindo assim para a mortalidade perinatal. Quanto aos cuidados de enfermagem na ruptura prematura de membranas, **NÃO** é correto

- (A) verificar a temperatura corporal da mãe a cada 4 horas, enquanto está acordada.
- (B) avaliar o odor e a alteração de cor do líquido amniótico.
- (C) realizar higiene perineal após micção ou evacuação e manter forro perineal para melhor avaliação das perdas.
- (D) orientar sobre as vantagens do repouso no leito.
- (E) realizar o exame de toque quando a gestante estiver em fase latente de trabalho de parto.

23. Na gestação de risco, a enfermeira deve estar atenta aos sinais e sintomas das patologias, a fim de realizar as intervenções adequadas. Relacione os sinais e sintomas abaixo com o problema provável, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Hipertensão, edema e proteinúria de 24 horas maior ou igual 300 mg.
- (2) Irritabilidade, sudorese e visão turva.
- (3) Perda de líquido amniótico antes do trabalho de parto, independente da idade gestacional.
- (4) Hipertensão, proteinúria significativa e convulsão.
- (5) Pele seca, sede, pulso fraco e odor de frutas no hálito.

- () hipoglicemia
- () eclâmpsia
- () hiperglicemia
- () ruptura prematura de membranas
- () pré-eclâmpsia

A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
- (B) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- (C) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- (E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

24. Logo após o nascimento do bebê, são cuidados prioritários

- (A) aquecer, pesar e identificar o bebê.
- (B) secar o bebê, realizar lavado gástrico e banhar o bebê.
- (C) desobstruir vias aéreas, secar e aquecer o bebê.
- (D) secar o bebê, desobstruir vias aéreas e aplicar vitamina K.
- (E) pesar e identificar o bebê, aplicar vitamina K.

25. Há cuidados de enfermagem que devem ser realizados nas primeiras horas pós-parto. Dentre os cuidados mencionados abaixo, qual **NÃO** pertence a essa categoria?

- (A) Avaliar perdas vaginais.
- (B) Avaliar o fundo uterino e a formação do globo de segurança de Pinard.
- (C) Avaliar as condições das mamas.
- (D) Avaliar as contrações de Braxton-Hicks.
- (E) Satisfazer as necessidades de alimentação e hidratação.