

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 23 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Terapia Intensiva Pediátrica e Oncologia Pediátrica)

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

Planejamento e Execução:



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 23

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Terapia Intensiva Pediátrica e Oncologia Pediátrica)

1.	B	11.	D	21.	E
2.	E	12.	A	22.	B
3.	A	13.	A	23.	A
4.	D	14.	D	24.	C
5.	B	15.	E	25.	A
6.	D	16.	C		
7.	D	17.	B		
8.	C	18.	B		
9.	C	19.	ANULADA		
10.	E	20.	E		

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS
PS 23 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Terapia Intensiva Pediátrica e Oncologia Pediátrica)

INSTRUÇÕES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
2. Esta PROVA consta de 25 questões objetivas.
3. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
4. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
5. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
6. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
7. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
8. A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
9. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Em geral, as crianças diabéticas são hospitalizadas por ocasião do diagnóstico inicial, durante uma doença ou cirurgia, ou por episódios de cetoacidose. A criança com cetoacidose diabética requer assistência intensiva de enfermagem, com todos os cuidados descritos a seguir, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Realizar balanço hídrico rigoroso.
- (B) Manter NPO prolongado.
- (C) Fazer HGT de hora em hora.
- (D) Administrar insulina regular EV, conforme prescrição médica.
- (E) Verificar cetonúria e glicosúria a cada micção.

02. O choque é uma síndrome que se caracteriza por perfusão tecidual insuficiente, levando à disfunção da membrana celular, ao metabolismo anormal e à morte celular. Pode ser desencadeado por vários mecanismos iniciais que interferem na tríade: volume sanguíneo circulante, bomba cardíaca e tônus vascular.

Considere as seguintes causas para o choque.

- I - Sangramento gastrointestinal, hemotórax e hemoptise.
- II - Vômitos, diarreia, poliúria e queimaduras.
- III - Peritonite, pancreatite e obstrução intestinal.
- IV - Septicemia e reação anafilática.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

03. Uma criança de oito anos interna dez dias após tratamento quimioterápico com quadro de neutropenia.

Assinale a afirmativa correta em relação aos cuidados com a criança.

- (A) Lavar as mãos antes e após a verificação dos sinais vitais.
- (B) Usar luvas ao verificar os sinais e máscara no contato com a criança.
- (C) Manter a criança na cama o maior tempo possível.
- (D) Evitar a higiene oral durante a fase neutropênica.
- (E) Proibir qualquer tipo de atividade recreativa.

04. A parada cardiorrespiratória é a cessação súbita e não prevista da respiração e da circulação em indivíduos sem expectativa imediata de morte. As manobras realizadas para a manutenção da vida seguem uma seqüência padronizada internacionalmente, também chamada de ressuscitação ABC.

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os cuidados correspondentes a cada significado do ABC.

- (1) Airway = Via aérea
- (2) Breathing = Respiração
- (3) Circulation = Circulação

- () Localizar o pulso, em RN, nas artérias braquiais e, em lactentes, nas braquiais ou femorais.
- () Ventilar com máscara e bolsa auto-inflável com reservatório.
- () Iniciar a compressão torácica ao nível do meio do esterno nos RNs e na terceira porção do esterno nos lactentes, crianças e adolescentes.
- () Aspirar a boca e a faringe.
- () Utilizar uma cânula de guedel para evitar obstrução passiva das vias aéreas superiores pela base da língua.

A seqüência numérica correta, na segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 1 – 3 – 2 – 3.
- (B) 2 – 2 – 3 – 1 – 1.
- (C) 3 – 1 – 3 – 1 – 2.
- (D) 3 – 2 – 3 – 1 – 1.
- (E) 3 – 2 – 3 – 1 – 2.

05. Assinale a afirmativa correta com relação aos cuidados de enfermagem no controle de infecção hospitalar.

- (A) As mãos não precisam ser lavadas, após o cuidado de um paciente com uso de luvas, para cuidados com outros pacientes.
- (B) Para evitar lesões, as agulhas usadas não devem ser encapadas.
- (C) Segundo VAN e outros (1991) no *Manual de Enfermagem de Whaley e Wong*, as fraldas de pano retêm melhor a urina, e seu emprego pode reduzir a contaminação no ambiente.
- (D) Quando a criança está internada, pode-se liberar qualquer tipo de brinquedo para alegrá-la.
- (E) Andadores podem ser permitidos nos hospitais, pois não proporcionam riscos.

06. Considere as seguintes afirmações sobre o preparo do corpo após o óbito.

- I - Higienizar o corpo após a morte.
- II - Colocar vestes adequadas.
- III - Tamponar os orifícios naturais.
- IV - Conversar com familiares só depois de preparar o corpo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

07. Em relação aos cuidados pré-operatórios, assinale **V** (verdadeira) ou **F** (falsa) conforme se apresentem as afirmativas abaixo.

- () Deixar a criança sozinha para ela ficar mais tranqüila antes do procedimento cirúrgico.
- () Manter a criança em dieta zero de acordo com prescrição para evitar aspiração durante a anestesia.
- () Vestir adequadamente (avental especial) para a sala de cirurgia, pois isto faz parte dos cuidados.
- () Não permitir que objetos significativos da criança acompanhem até a sala de preparo.
- () Permitir que os pais segurem a criança até que ela durma, quando possível.

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – V.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – F – F – V – F.

08. No seu livro Guia Prático de Enfermagem, Garijó classifica as complicações do pós-operatório em imediatas e tardias.

Assinale abaixo a alternativa que se enquadra nas **tardias**.

- (A) Obstrução respiratória.
- (B) Vômitos pós-anestésicos.
- (C) Infecção da ferida operatória.
- (D) Prolongamento do jejum.
- (E) Perdas gastrintestinais excessivas.

09. Relativamente a aspectos que envolvam o curativo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se observar se as bordas das feridas estão rosadas ao executar um curativo.
- (B) Nos cateteres venosos são feitos curativos para prevenir infecções.
- (C) Curativo séptico é aquele feito em uma ferida limpa.
- (D) Um dos objetivos do curativo é auxiliar a cicatrização.
- (E) Deve-se prestar atenção a sinais de inflamação: calor, rubor, dor e edema.

10. Dentre as afirmativas abaixo sobre enema, qual está **INCORRETA**?

- (A) É realizado em crianças em casos de constipação grave.
- (B) Há necessidade de um intestino limpo antes da cirurgia.
- (C) É realizado pela introdução de uma sonda na ampola retal.
- (D) Auxilia em procedimentos de diagnóstico.
- (E) A solução utilizada não deve ser isotônica.

11. Existem aspectos importantes relativos à segurança dos profissionais e do ambiente os quais devem ser do conhecimento de toda equipe de saúde que trabalha em atividades relacionadas à quimioterapia.

Analise as afirmações abaixo, considerando esses aspectos.

- I - As drogas devem ser administradas sempre com as mãos enluvasadas, o que dispensa a lavagem das mãos.
- II - Frascos vazios de soro com quimioterápicos, equipamentos, gases e luvas contaminados devem ser desprezados em recipientes fechados e identificados como "lixo tóxico".
- III - Se houver contato de quimioterápicos com a pele do profissional, este deve lavar exaustivamente a área atingida com água corrente e sabão.
- IV - O uso correto da técnica dispensa a necessidade de área especialmente estruturada para o preparo de quimioterápicos, como as capelas de fluxo laminar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

12. A prevenção e a detecção precoce de extravasamento dos quimioterápicos devido à toxicidade dermatológica local são importantes cuidados de enfermagem ao paciente submetido à quimioterapia.

São sinais e sintomas de extravasamento:

- (A) queimação, desconforto no local da punção e eritema.
- (B) queimação, urticária e alopecia.
- (C) náuseas, edema e eritema no local da punção.
- (D) náuseas, vômitos e diarreia.
- (E) cefaléia, náuseas e edema.

13. Avalie as seguintes afirmativas sobre sono e repouso, assinalando com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A criança com oito ou nove meses dorme uma ou duas vezes durante o dia e 12 horas à noite.
- () Os lactentes amamentados ao seio dormem por períodos mais curtos que os lactentes alimentados por mamadeiras.
- () A criança em idade escolar necessita dormir durante o dia e dorme 11 a 12 horas por noite.
- () O sono da criança integra cinco estados diferentes: sono regular, sono irregular, sonolência, inatividade alerta e, por fim, vigília e choro.
- () Na primeira hora após o nascimento, o recém-nascido está acordado com os olhos abertos e o reflexo da sucção é presente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – F.

14. Considere as afirmações abaixo sobre distúrbios nutricionais no primeiro ano de vida.

- I - O kwashiorkor é uma deficiência calórica com suprimento adequado de proteínas.
- II - O marasmo corresponde a má nutrição de calorias e proteínas.
- III - As deficiências de vitamina A, D, E e K causam, respectivamente, cegueira noturna, raquitismo, anemia hemolítica e hemorragia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Conforme a Resolução nº 41 do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de outubro de 1995, são assegurados direitos à criança e ao adolescente hospitalizados, os quais devem ser seguidos pelas instituições que prestam assistência a essa clientela.

Considere os abaixo citados.

- I - Direito de serem acompanhados por sua mãe, pai ou responsável durante todo o período de sua hospitalização, bem como de receber visitas.
- II - Direito de não sentirem dor, quando existam meios para evitá-la.
- III - Direito de desfrutarem de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar.
- IV - Direito de seus pais ou responsáveis participarem ativamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que serão submetidos.

Quais estão corretos, segundo a supra-referida Resolução?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

16. A alopecia é descrita pelos pacientes como um dos mais terríveis efeitos colaterais do tratamento quimioterápico, pois interfere nas relações sociais.

Quanto aos cuidados de enfermagem prestados a essa clientela, qual das afirmativas abaixo **NÃO** está correta?

- (A) Dedicar um tempo maior para estar com o paciente, permitindo-lhe a expressão dos seus sentimentos e emoções.
- (B) Orientar a proteção da cabeça contra o sol.
- (C) Desestimular o uso de perucas, chapéus ou lenços, auxiliando o paciente a enfrentar sua situação atual de vida, sem subterfúgios estéticos.
- (D) Reforçar o fato de que os cabelos voltam a crescer.
- (E) Recomendar o uso de xampus neutros.

17. A apresentação da solução de manitol é a 20% e a dose prescrita é de 5 gramas de 4/4 horas.

O volume a ser administrado em cada horário é

- (A) 500 mL.
- (B) 25 mL.
- (C) 20 mL.
- (D) 10 mL.
- (E) 5 mL.

18. Na monitorização da PAM invasiva, costuma-se manter a infusão contínua de uma solução de heparina em soro fisiológico.

Qual é o volume de heparina necessário para preparar um SF 250 mL + 250 UI heparina, sabendo que o frasco de heparina contém 5.000 UI/mL?

- (A) 0,01 mL.
- (B) 0,05 mL.
- (C) 0,1 mL.
- (D) 0,2 mL.
- (E) 0,5 mL.

19. Na assistência de enfermagem à criança com drenagem de tórax, considere os cuidados abaixo citados.

- I - Movimentar a criança com frequência e cuidadosamente.
- II - Pinçar o dreno ao mobilizar o paciente.
- III - Observar flutuação no líquido da tubulação.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

20. A crise convulsiva é um dos distúrbios neurológicos mais frequentes observados em Pediatria.

Considerando uma crise convulsiva, analise as seguintes manifestações clínicas.

- I - Movimentos tônico-clônicos.
- II - Hipertermia.
- III - Movimentos mastigatórios.
- IV - Olhar fixo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

21. A oxigenação consiste numa das necessidades mais importantes e vitais para o equilíbrio orgânico.

Considere as seguintes afirmações sobre o processo da oxigenação.

- I - Na etapa de ventilação, acontece a troca de ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares.
- II - A difusão dos gases na respiração ocorre nos alvéolos pulmonares.
- III - São consideradas manifestações mais comuns de má oxigenação: dispnéia, sibilos, cianose e tosse.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

22. A diálise peritoneal é um processo de instilação de solução de glicose estéril e eletrólitos dentro da cavidade peritoneal, via cateter, com drenagem de toxinas após difusão e osmose.

O procedimento é um substituto da função

- (A) cardíaca.
- (B) renal.
- (C) respiratória.
- (D) neurológicas.
- (E) pancreática.

23. O coma caracteriza-se por uma depressão da atividade cerebral e pode apresentar-se em graus variados, desde leve torpor até inconsciência.

As manifestações clínicas do coma se caracterizam por

- (A) má resposta a estímulos dolorosos e fotomotor.
- (B) icterícia e tremores.
- (C) lesões cutâneas vesiculares.
- (D) agitação psicomotora e hipertonia.
- (E) salivação excessiva.

24. Pensando nos cuidados de enfermagem na extubação da criança pós-ventilação mecânica, **NÃO** está correto afirmar que

- (A) se deve observar NPO antes da extubação.
- (B) se deve reunir material para nebulização com adrenalina.
- (C) a aspiração de vias aéreas superiores não deve ser feita, pois a criança já pode estar traumatizada.
- (D) o decúbito deve ser mantido elevado.
- (E) a observação da criança deve ser rigorosa.

25. No procedimento da intubação traqueal e instalação de ventilação mecânica, cabe à equipe de enfermagem

- I - providenciar ambu com máscara ligado à fonte de oxigênio.
- II - aplicar medicação sedativa e miorelaxante imediatamente.
- III - permitir que a família esteja presente, visto que pode ser uma situação de urgência.
- IV - instalar oxímetro de pulso.

Quais atribuições estão corretas?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.