

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

**EDITAL Nº 03/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS**

**PS 28 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
(Centro de Tratamento Intensivo)**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

**Planejamento e Execução:**



*Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS**

**Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.**

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 03/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 28

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Centro de Tratamento Intensivo)

1.	<b>E</b>	11.	<b>Anulada</b>	21.	<b>C</b>	31.	<b>Anulada</b>
2.	<b>A</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>D</b>	32.	<b>A</b>
3.	<b>A</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>C</b>	33.	<b>E</b>
4.	<b>D</b>	14.	<b>B</b>	24.	<b>D</b>	34.	<b>C</b>
5.	<b>C</b>	15.	<b>E</b>	25.	<b>E</b>	35.	<b>D</b>
6.	<b>A</b>	16.	<b>C</b>	26.	<b>B</b>	36.	<b>C</b>
7.	<b>B</b>	17.	<b>A</b>	27.	<b>B</b>	37.	<b>A</b>
8.	<b>E</b>	18.	<b>D</b>	28.	<b>B</b>	38.	<b>D</b>
9.	<b>B</b>	19.	<b>D</b>	29.	<b>D</b>	39.	<b>B</b>
10.	<b>A</b>	20.	<b>A</b>	30.	<b>E</b>	40.	<b>E</b>

---

**EDITAL Nº 03/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS**  
**PS 28 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Centro de Tratamento Intensivo)**

---

**INSTRUÇÕES**

1. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
2. Esta PROVA consta de 40 questões objetivas.
3. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
4. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
5. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 41 serão desconsideradas.
6. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
7. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
8. A duração da prova é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
9. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Considerando as vias de administração de drogas durante uma parada cardiorrespiratória, sabe-se que, na impossibilidade de via venosa, pode-se utilizar outra via para infusão de medicamentos. No entanto, apenas algumas medicações podem ser administradas nessa via.

Trata-se da via

- (A) intramuscular.
- (B) intradérmica.
- (C) subcutânea.
- (D) intra-ocular.
- (E) tubo-endotraqueal.

**02.** Um paciente acaba de ser internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com quadro de arritmia. Após alguns minutos, observa-se no monitor que a frequência cardíaca está diminuindo, e o paciente evolui para PCR (parada cardiorrespiratória) em assistência. O atendimento de urgência a ser prestado ao paciente nessa situação consiste em \_\_\_\_\_ para posteriormente \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas do texto acima.

- (A) intubá-lo – realizar massagem cardíaca – administrar medicação
- (B) verificar sinais vitais – realizar massagem cardíaca – ventilar comambu
- (C) desfibrilar – posicioná-lo em decúbito elevado – verificar a oximetria
- (D) medir glicemia capilar – intubá-lo – administrar medicação
- (E) posicioná-lo em decúbito elevado – realizar massagem cardíaca – verificar sinais vitais

**03.** A traqueostomia é um procedimento usual em pacientes que permanecem intubados por longo período no CTI.

No que se refere ao procedimento de aspiração da cânula de traqueostomia, está correto afirmar que se deve

- (A) instilar até 2 mL de SF 0,9% antes da aspiração, quando a secreção for espessa.
- (B) trocar a sonda de aspiração a cada 6 horas.
- (C) introduzir toda a sonda de aspiração na cânula.
- (D) lavar as mãos apenas antes do procedimento.
- (E) registrar o aspecto da secreção uma vez por turno.

**04.** Grande parte dos pacientes internados no CTI necessitam de cateter central devido à gravidade do quadro clínico que apresentam.

No que se refere aos cuidados com esse tipo de cateter, assinale **V** para os que forem verdadeiros e **F** para os que forem falsos.

- ( ) Realizar curativo uma vez por turno para evitar infecção no local.
- ( ) Observar o local de inserção para detectar sangramento, hiperemia ou secreção.
- ( ) Quando houver sangramento no local de inserção, optar por curativo transparente.
- ( ) Sempre que for observada secreção purulenta no sítio de inserção, comunicar o fato ao Enfermeiro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – V.

**05.** As doenças hepáticas em estágio terminal geralmente são tratadas por meio de transplante hepático. O pós-operatório dessa cirurgia exige muita atenção por ser a pessoa transplantada um paciente de alto risco.

Relacione as colunas, associando o sinal ou sintoma característico à respectiva complicação hepática que se pode esperar após um transplante de fígado.

- (1) Hemorragia intra-abdominal
- (2) Falência hepática
- (3) Rejeição do enxerto

- ( ) Alta taxa de mortalidade e icterícia.
- ( ) Febre, dor abdominal e aumento da ascite.
- ( ) Hipotensão e drenagem de sangue aumentada pelos drenos.

A ordem numérica correta, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

**06.** Como a heparina tem ação anticoagulante e antitrombótica, em uma prescrição de hemodiálise foi feita a solicitação de se administrar 2.500 UI de heparina em *bolus* a cada 12 horas.

Sabendo-se que a apresentação da heparina em frasco-ampola é de 5.000 UI/mL (frascos com 5 mL), quantos mL deverão ser administrados nesse caso?

- (A) 0,5 mL.
- (B) 0,75 mL.
- (C) 0,90 mL.
- (D) 1 mL.
- (E) 5 mL.

**07.** Quanto à coleta de urina para exame microbiológico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) É indispensável a higiene do meato urinário com água e sabão antes da coleta de urina.
- (B) Em pacientes com sonda vesical de demora, deve-se aspirar a urina com agulha de maior diâmetro possível.
- (C) O ideal é coletar a primeira urina da manhã para esse exame.
- (D) Ao coletar urina de uma paciente, o profissional deverá utilizar luvas de proteção, retirando-as imediatamente após o procedimento.
- (E) É importante colher a urina sem que a pessoa interrompa o ato de urinar, ou seja, com o jato constante.

**08.** O IAM (infarto agudo do miocárdio) é caracterizado pela morte do tecido miocárdico devido à diminuição do aporte de oxigênio.

Quanto aos cuidados imediatos que devem ser prestados ao paciente nesse caso, assinale o que está **INCORRETO**.

- (A) Proporcionar repouso absoluto.
- (B) Administrar oxigenioterapia.
- (C) Puncionar acesso periférico.
- (D) Mediar com analgésico.
- (E) Encaminhar para teste de esforço.

**09.** O edema agudo de pulmão é a manifestação mais dramática da congestão pulmonar. Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes são dispnéia, taquipnéia, cianose, agitação e ansiedade.

Considere os seguintes cuidados de enfermagem e assinale com **V** (verdadeiros) os que fazem parte dos cuidados no edema agudo de pulmão e com **F** (falsos) os que não fazem.

- ( ) Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo.
- ( ) Obter acesso venoso .
- ( ) Providenciar máscara de venturi.
- ( ) Administrar drogas, como diurético e broncodilatador, conforme orientação.
- ( ) Mudar a posição do paciente de 2 em 2 horas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V – F.

**10.** O quadro clínico típico de IAM (infarto agudo do miocárdio) caracteriza-se pelos seguintes sinais e sintomas:

- (A) dor subesternal, vômitos e dispnéia.
- (B) dor mandibular, palidez e escarro hemoptóico.
- (C) dor torácica, sangramento e sudorese.
- (D) dor epigástrica, dispnéia e incontinência urinária.
- (E) dor em baixo ventre, febre e vômito.

**11.** Os sinais e sintomas clínicos de rejeição aguda pós-transplante renal são

- (A) ganho de peso e redução do volume urinário.
- (B) hipotensão arterial e dor local.
- (C) vertigens matinais e sudorese.
- (D) icterícia e confusão.
- (E) sangramento e hipertensão arterial.

**12.** Os pacientes submetidos à hemodiálise veno-venosa contínua (HDVVC) podem apresentar diversas complicações.

Todas as alternativas abaixo são possíveis complicações da hemodiálise, **EXCETO**

- (A) perda de sangue pelo sistema.
- (B) presença de bolhas de ar no sistema.
- (C) hiperglicemia.
- (D) hipotensão.
- (E) peritonite.

**13.** Considere as afirmativas abaixo sobre nutrição enteral e assinale com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A nutrição enteral não mantém a integridade gástrica.
- ( ) Na administração da dieta por SNE (sonda nasoentérica), o paciente deve estar com a cabeça elevada entre 30 a 45 graus.
- ( ) Na administração da dieta por SNE, pode ocorrer deslocamento da sonda para o estômago.
- ( ) É comum a sonda encontrar-se obstruída em razão de sua lavagem não ter sido feita corretamente após a administração de dieta e/ou de medicamentos.
- ( ) A velocidade de infusão da dieta está relacionada à diarreia.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – V – V – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – F.

**14.** "O alívio da dor do paciente deve ser prioridade para a equipe de enfermagem." (Cintra, 2000).

Tomando por norte a afirmativa acima, está **INCORRETO** dizer que

- (A) a dor pode produzir alterações no humor e interrupção do sono.
- (B) a dor é um dado objetivo de intensidade igual para todos.
- (C) pacientes com dor podem apresentar aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea.
- (D) pacientes que não conseguem se comunicar devido à presença do tubo endotraqueal (TET) podem estar com dor.
- (E) o profissional da enfermagem deve ser o defensor do paciente, insistindo na administração de analgésicos, quando outros profissionais de saúde planejarem iniciar procedimentos dolorosos.

**15.** A equipe de enfermagem que assiste ao paciente crítico tem papel fundamental na prevenção das úlceras de pressão não só por ser um indicador de qualidade dentro do processo assistencial, mas também por interferir no tempo de permanência desse paciente no CTI.

Com base nessa afirmação, considerando os cuidados na prevenção de úlceras de pressão, está **INCORRETO**

- (A) aliviar pontos de apoio com travesseiros e coxins.
- (B) alterar decúbito de 2/2 horas.
- (C) utilizar colchão piramidal.
- (D) utilizar somente um lençol móvel.
- (E) utilizar luvas d'água em pontos de apoio.

**16.** Quanto à terapia com insulina intravenosa contínua, pode-se afirmar que

- I - a insulina utilizada para infusão contínua é a NPH.
- II - a hipoglicemia é o mais freqüente efeito adverso.
- III - a insulina adere a frascos e linhas de infusão plásticos, devendo a administração ser precedida pela lavagem das linhas.
- IV - o preparo da infusão é com insulina e água destilada.
- V - o frasco-ampola de insulina deve ser mantido sob refrigeração.

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas I e V.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II, III e V.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**17.** Quais dos sinais e sintomas abaixo citados estão relacionados à insuficiência respiratória?

- (A) Agitação, cianose e taquipnéia.
- (B) Incontinência urinária, taquicardia e sudorese.
- (C) Hipertensão, febre e letargia.
- (D) Sudorese, insônia e dor abdominal.
- (E) Taquiarritmia, agitação e frequência respiratória inalterada.

**18.** Leia o texto abaixo e as afirmativas subsequentes feitas com base nele e assinale nos parênteses **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas.

“A palavra isolamento em nosso meio tem sido acompanhada de temor, seja pela gravidade da doença do paciente (temor pela morte), seja pelo medo de aquisição da infecção por aqueles que entrem em um quarto de isolamento.”

- ( ) O quarto individual é indicado quando a infecção for transmitida por meio do ar a longas distâncias do paciente.
- ( ) Somente em casos de tuberculose é indicado o uso de máscara; a varicela e o sarampo dispensam o seu uso.
- ( ) Em caso de precaução respiratória, deve-se transportar o paciente usando máscara.
- ( ) O uso de avental é indicado para contatos próximos do paciente portador de patologia causada por germes multirresistentes, como durante o banho de leito.
- ( ) O uso de luvas de procedimentos dispensa a lavagem de mãos.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – F.

**19.** São técnicas de responsabilidade dos Técnicos de Enfermagem no CTI, no Rio Grande do Sul,

- (A) dar banho de leito e verificar a pressão intra-abdominal.
- (B) medir a pressão arterial não-invasiva e realizar sondagem naso-enteral.
- (C) trocar equipos e extensores conforme rotina e realizar sondagem vesical de demora.
- (D) aspirar tubo endotraqueal e testar sonda naso-enteral antes de administrar dieta.
- (E) administrar soro conforme a pressão venosa central e realizar higiene perineal após as evacuações.

**20.** Analise as afirmações abaixo, considerando a nutrição parenteral total (NPT).

- I - As fórmulas parenterais de nutrição devem ser preparadas com técnica rigorosamente asséptica, em local apropriado no serviço de farmácia.
- II - Complicações infecciosas podem ser reduzidas se a infusão for administrada em via exclusiva.
- III - A NPT é administrada sempre que possível por via endovenosa.
- IV - As transfusões de sangue podem ser administradas na mesma via da nutrição parenteral total.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**21.** Um paciente é admitido no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com diagnóstico médico de insuficiência respiratória aguda, tendo como causa uma pneumonia (infecção aguda que causa inflamação no parênquima pulmonar, tornando-o edemaciado e cheio de líquido, dificultando as trocas gasosas).

Dentre as conseqüências desse processo infeccioso, há a produção de secreção que precisa ser removida por meio da aspiração.

Quanto à técnica de aspiração de secreção respiratória, considere as seguintes afirmações.

- I - Sempre aspirar através de sistema a vácuo, evitando o sistema de ar comprimido.
- II - Usar luvas e cateteres estéreis para cada procedimento.
- III - Usar água destilada ou solução fisiológica estéril para remover secreções do cateter.
- IV - Instalar fluidos estéreis (solução salina, água destilada ou soro glicosado), por meio de seringa estéril, diretamente no TET ou na traqueostomia quando as secreções forem muito espessas.
- V - Introduzir o cateter com o extensor clampeado antes de iniciar a aspiração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas IV e V.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e V.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

**22.** O médico prescreveu a administração de 500 mL de soro fisiológico (SF) em 2 horas ao seu paciente.

Qual é o número correto de gotas por minuto para que a infusão seja administrada no prazo determinado?

- (A) 8 gts/min.
- (B) 16,6 gts/min.
- (C) 41 gts/min
- (D) 83 gts/min.
- (E) 166 gts/min.

**23.** Em relação à administração de medicações subcutâneas, pode-se afirmar que

- I - os locais mais comuns para administração de medicamentos no tecido subcutâneo são deltóide e região periumbilical.
- II - o volume máximo de medicação a ser administrado por via subcutânea não deve exceder a 3 mL.
- III - uma complicação possível após a administração de medicações no tecido subcutâneo é a formação de tecido fibrótico.

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**24.** Paciente com insuficiência renal aguda (IRA) deve receber 850 mg de vancomicina EV.

Sabendo-se que o frasco de vancomicina tem 500 mg e é diluído em 250 mL de solução salina, que volume o paciente deve receber?

- (A) 125 mL.
- (B) 212 mL.
- (C) 250 mL.
- (D) 425 mL.
- (E) 850 mL.

**25.** Paciente submetido à cirurgia cardíaca tem seu quadro agravado na ocorrência de complicações imediatas.

Quais são as complicações mais comuns no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca?

- (A) Infecção e congestão pulmonar.
- (B) Complicações neurológicas e convulsões.
- (C) Hipoglicemia e poliúria.
- (D) Disfunção respiratória e tromboembolismo.
- (E) Hipotensão e sangramento.

**26.** Uma das complicações mais comuns relacionadas à administração de nutrição parenteral total (NPT) em Terapia Intensiva é a

- (A) hipovolemia.
- (B) hiperglicemia.
- (C) oligoanúria.
- (D) hipoalbuminemia.
- (E) hiperpotassemia.

**27.** Analise as afirmativas abaixo relacionadas à administração de noradrenalina em infusão contínua e assinale com **V** as verdadeiras ou **F** as falsas.

- ( ) Deve-se diluir a noradrenalina em SF 0,9%.
- ( ) Deve-se administrar a solução de noradrenalina com o auxílio de bomba de infusão.
- ( ) A solução de noradrenalina deve ser trocada de 4/4 horas.
- ( ) A noradrenalina é uma medicação que aumenta a pressão arterial.
- ( ) A administração de noradrenalina deve ser feita preferencialmente em veia periférica.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V – F.

**28.** Alguns medicamentos são amplamente utilizados em Terapia Intensiva.

Relacione as colunas, associando o nome do fármaco à sua principal função.

- (1) Midazolan
- (2) Amiodarona
- (3) Morfina
- (4) Nitroprussiato de sódio

- ( ) Anti-arrítmico
- ( ) Analgésico opióide
- ( ) Hipotensor
- ( ) Sedativo

A seqüência numérica correta, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2.



29. Relacione as colunas, associando o conceito à terminologia.

- (1) Bradicardia sinusal
- (2) Fibrilação ventricular
- (3) Taquicardia sinusal
- (4) Assistolia
  
- ( ) Impulsos elétricos com uma frequência maior que 100 bpm.
- ( ) Impulsos elétricos repetitivos e irregulares.
- ( ) Impulsos elétricos com uma frequência abaixo de 60 bpm.
- ( ) Ausência de atividade elétrica.

A seqüência numérica correta, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 2 – 4 – 3 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

30. A enfermagem tem um papel muito importante na prevenção das complicações advindas de procedimentos invasivos cada vez mais freqüentes e complexos em Centros de Tratamento Intensivo (CTI).

Assinale a afirmativa **INCORRETA**, considerando essa prevenção.

- (A) Infecções relacionadas a cateteres podem ocorrer devido a um grande número de fatores, incluindo o tempo de cateterização e o tipo de cateter intravascular.
- (B) Cateteres com muitos lumens aumentam o risco de infecção, e o uso de material descartável diminui os riscos.
- (C) Manipulação inapropriada e técnica de inserção inadequada aumentam o índice de infecção.
- (D) O curativo oclusivo com gaze deve ser realizado no local de inserção do cateter e trocado quando estiver molhado ou houver presença de secreção.
- (E) O calibre do cateter não interfere no risco de infecção, podendo-se optar sempre por cateteres de maior calibre.

31. Dentre as recomendações para a prevenção de infecções hospitalares em pacientes internados em Centros de Tratamento Intensivo (CTI), considere as seguintes:

- I - Retirar, tão cedo quanto possível, tubos traqueais, cânulas de traqueostomia e sondas gastroenterais.
- II - Manter com fluidos estéreis frascos de umidificação de oxigênio que não estiverem sendo usados.
- III - Realizar higiene oral a cada 3 horas em pacientes intubados, traqueostomizados ou com sondas gastroenterais.
- IV - Trocar cânulas de Guedel, Ayres e intermediárias do mesmo paciente a cada 24 horas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

32. O monitor cardíaco capta sinais gerados pelo coração, mostrando-os numa tela sob a forma de um eletrocardiograma contínuo.

Com base na afirmação acima, assinale **V** (verdadeira) ou **F** (falsa) conforme cada frase a seguir se apresenta.

- ( ) Cada batimento cardíaco é o resultado de um estímulo mecânico.
- ( ) De acordo com a forma das ondas eletrocardiográficas, é possível identificar alterações na frequência, ritmo ou condução cardíaca.
- ( ) Os eletrodos que captam os sinais provenientes do coração não precisam estar bem fixados à parede torácica do paciente.
- ( ) Sempre que necessário, é possível suspender alarmes da monitorização cardíaca para se evitarem falsos alarmes de bradicardia.
- ( ) Podem ocorrer reações inflamatórias nas áreas em que os eletrodos estão fixados, necessitando que a pele local seja tratada e o eletrodo recolocado alguns centímetros adiante.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) F – F – F – V – V.
- (D) V – V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V – F.

**33.** A enfermagem desenvolveu códigos de ética que mostram os ideais quanto à conduta profissional. Os códigos refletem os princípios éticos aceitos pela equipe de enfermagem, ajudando os profissionais em seus próprios raciocínios morais.

Analise as afirmações abaixo.

- I - O Código de Ética Profissional de Enfermagem proporciona orientação para a prática de enfermagem competente.
- II - As emoções, a religião, as leis e a cultura influenciam o raciocínio moral do indivíduo.
- III - Um dilema ético resulta dos conflitos entre valores e crença, causando dificuldades na tomada de decisão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**34.** O espaço pleural tem importante papel para manter a função normal dos pulmões. Qualquer distúrbio no espaço pleural acarreta complicações, como coleção de líquido ou ar com conseqüente alteração da função pulmonar. Nesses casos, está indicada a drenagem de tórax para restituir a função do pulmão.

Considerando os cuidados ao paciente com dreno de tórax, assinale, nos parênteses, **V** para os verdadeiros e **F** para os falsos.

- ( ) Ordenhar o dreno de hora em hora, prevenindo a obstrução com coágulos e fibrina.
- ( ) Orientar o paciente sobre a importância de não se mobilizar no leito devido ao risco de deslocamento do dreno.
- ( ) Trocar curativo do sítio de inserção do dreno a cada 72 horas.
- ( ) Observar vazamento de ar no sistema (borbulhamento) e aspecto da drenagem.
- ( ) Manter selo d'água a uma altura de 20 cm da haste.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V - V - V - F - V.
- (B) V - F - F - V - V.
- (C) V - F - F - V - F.
- (D) F - V - F - V - F.
- (E) F - F - V - F - F.

**35.** As infecções são as causas mais freqüentes de mortalidade no pós-operatório de transplante hepático.

Assinale **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) O quarto do paciente transplantado pode ser compartilhado com outro paciente acometido de infecção respiratória.
- ( ) A lavagem de mãos deve ser realizada antes e após os cuidados de enfermagem.
- ( ) O paciente transplantado tem de usar vários imunossuppressores a fim de evitar infecções.
- ( ) O Técnico de Enfermagem deve comunicar ao Enfermeiro quando estiver com algum processo infeccioso antes de cuidar de um paciente transplantado.
- ( ) As trocas de cateteres e sondas são realizadas de acordo com a rotina de cada instituição.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V - V - V - F - F.
- (B) V - F - V - F - F.
- (C) F - V - V - F - V.
- (D) F - V - F - V - V.
- (E) F - F - F - V - F.

**36.** O paciente com tétano necessita de vários cuidados intensivos.

Quais dos cuidados abaixo é específico na assistência desse paciente?

- (A) Manter a cabeceira da cama a 90°.
- (B) Controlar diurese de hora em hora.
- (C) Manter o quarto escuro e silencioso.
- (D) Oferecer dieta pastosa.
- (E) Administrar soro aquecido.

**37.** Um paciente necessita receber 80 gotas de um frasco de solução de morfina com 50 mL, mas não foi encontrado o conta-gotas.

Que atitude deve ser tomada pelo Técnico de Enfermagem nesse caso?

- (A) Administrar ao paciente 4 mL da solução.
- (B) Administrar ao paciente 8 mL da solução.
- (C) Administrar ao paciente 10 mL da solução.
- (D) Modificar o horário, alterando-o para o próximo turno.
- (E) Não administrar a medicação ao paciente e avisar o Enfermeiro.

**38.** Relacione o procedimento invasivo com a sua respectiva função.

- (1) Cateter arterial
- (2) Cateter de Swan-Ganz
- (3) Balão intraórtico
- (4) Marcapasso

- ( ) Restabelece o ritmo cardíaco por estimulação elétrica do coração.
- ( ) Aumenta o suprimento de oxigênio para o miocárdio.
- ( ) Realiza a monitorização contínua da pressão arterial média.
- ( ) Faz a mensuração da pressão venosa central.

A seqüência numérica correta, na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 4.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 3 – 4 – 2 – 1.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

**39.** Entre os cuidados de enfermagem destinados a minimizar os efeitos adversos e as reações alérgicas na administração de medicamentos, **NÃO** se inclui:

- (A) verificar a data de validade do medicamento a ser administrado.
- (B) administrar as drogas incompatíveis pela mesma via de infusão.
- (C) verificar a solução regularmente em busca de sinais como cristalização ou mudança de cor.
- (D) questionar o paciente a respeito de reações anteriores.
- (E) verificar a compatibilidade com a solução de diluição e infusão contínua.

**40.** Para o cálculo do balanço hídrico total de 24 horas, devem ser incluídos líquidos administrados e líquidos eliminados.

Qual dos dados abaixo **NÃO** faz parte do balanço hídrico total?

- (A) Eliminação intestinal.
- (B) Perdas insensíveis.
- (C) Peso corpóreo do paciente.
- (D) Dieta administrada via oral.
- (E) IMC (Índice de Massa Corpórea).