

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

**- CARGO 03 -
ENFERMEIRO**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.**

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

GABARITO APÓS RECURSOS

- CARGO 03 - ENFERMEIRO

01.	D	11.	C	21.	C	31.	E	41.	D
02.	B	12.	A	22.	E	32.	D	42.	C
03.	C	13.	D	23.	C	33.	E	43.	C
04.	A	14.	C	24.	B	34.	C	44.	B
05.	D	15.	C	25.	A	35.	E	45.	B
06.	D	16.	D	26.	C	36.	E	46.	E
07.	A	17.	A	27.	A	37.	C	47.	C
08.	E	18.	D	28.	C	38.	A	48.	E
09.	D	19.	E	29.	A	39.	B	49.	D
10.	B	20.	E	30.	B	40.	D	50.	E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **50** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 20 questões e **Conhecimentos Específicos** – 30 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 51 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **4 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. De acordo com a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, a estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, conforme os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve:

- I - ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- II - atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.
- III- desenvolver atividades de acordo com a demanda espontânea e tendo como foco o indivíduo e sua doença.
- IV - buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- V - ser um espaço de construção de cidadania.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas III, IV e V.
- (D) Apenas I, II, IV e V.
- (E) Apenas I, III, IV e V.

02. São algumas das características do processo de trabalho da Saúde da Família, **EXCETO**:

- (A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.
- (B) Hierarquizar relações com a comunidade, de modo a promover e estimular o controle social no planejamento, na execução e na avaliação das ações.
- (C) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.
- (D) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde/doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade.
- (E) Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização contínua.

03. Qual das alternativas **NÃO** descreve as atribuições do Agente Comunitário de Saúde dentro da Equipe de Saúde da Família?

- (A) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- (B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- (C) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- (D) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
- (E) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.

04. O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.

Sendo assim, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A magnitude, extensão, natureza do evento, forma de transmissão e tipo de medidas de controle são elementos que sempre orientam a equipe para a investigação de amostras individuais de casos.
- (B) As epidemias também devem ser encaradas com experimentos naturais, cuja investigação permite a identificação de novas questões a serem objetos de pesquisa, e seus resultados poderão contribuir para o aprimoramento das ações de controle.
- (C) É essencial a detecção precoce de epidemias/surtos para que as medidas de controle sejam adotadas oportunamente, a fim de se evitar grande número de casos e óbitos.
- (D) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, sempre devem ser submetidos à investigação profunda.
- (E) Além da prevenção de novos casos e surtos, a investigação pode contribuir para descoberta de novos agentes, novas doenças e novos tratamentos, fazendo com que a população passe a ter mais confiança no serviço público de saúde.

05. As hepatites virais são um importante problema de saúde pública, apresentado distribuição universal e magnitude que varia de região para região.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A Hepatite A apresenta alta prevalência em países com precárias condições sanitárias e socioeconômicas, sendo que, no Brasil, estima-se que ocorreram 130 casos novos/ano por 100 mil habitantes.
- () Os padrões de intermediária e alta endemicidade de distribuição da Hepatite B, vêm se modificando consideravelmente em várias regiões do Brasil, alcançando índices menores, graças à política de vacinação contra a Hepatite B.
- () As principais fontes notificadoras das hepatites virais são a comunidade, escolas, creches, serviços de assistência médica, hemocentros, bancos de sangue e laboratórios.
- () É considerado suspeito assintomático, o indivíduo exposto a uma fonte de infecção bem documentada, como: acidentes ocupacionais com fonte positiva, exposição ao uso de drogas com compartilhamento de seringas, comunicante de caso confirmado de Hepatite, entre outros.
- () Como forma de barreira, a vacina contra Hepatite B é indicada para pessoas não vacinadas, após exposição comprovada ao vírus da Hepatite B.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) F – F – V – V – V.
- (D) V – V – V – V – F.
- (E) V – V – V – F – F.

06. Quanto aos aspectos epidemiológicos do HIV, podemos afirmar que:

- I - O sexo feminino está menos exposto ao risco de contaminação pelo HIV, pois sua entrada mais tardia na dinâmica da epidemia não o enquadra nos denominados grupos de risco.
- II - A transmissão vertical do HIV vem diminuindo, não sendo a principal causa de contaminação indivíduos menores de 13 anos.
- III - A faixa etária que concentra os maiores percentuais de casos de AIDS em mulheres é a de 25 a 34 anos, ou seja, são atingidas em plena fase reprodutiva, devido ao comportamento sociossexual da população, associado a aspectos de vulnerabilidades biológica.
- IV - Existe uma diminuição do número de casos de AIDS no sexo masculino, entre os indivíduos com mais de oito anos de escolaridade.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

07. Relacione as ações descritas na primeira coluna com as doenças de notificação compulsória, na segunda coluna:

- (1) Após a identificação de um surto, atenção especial deve ser dada para detecção da doença em mulheres em idade fértil.
 - (2) Suas manifestações clínicas são: febre alta, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik, e os objetivos da estratégia "operação limpeza" é interromper a cadeia de transmissão do vírus numa área geográfica determinada, através da busca exaustiva de todos os casos suspeitos.
 - (3) Sua incidência é significativamente maior em indivíduos HIV positivos, do que entre os soro negativos, cuja ocorrência é preditiva de soropositividade para HIV em populações de risco.
 - (4) Para identificação da área de risco deve-se determinar forma e local provável de infecção, sendo importante pesquisar: contato com a água, solo ou alimentos, contato direto com reservatórios animais, ocorrência de enchentes, níveis de precipitação pluviométrica e atividades de lazer em áreas potencialmente contaminadas.
 - (5) Em caso de intervenção, cabe aos serviços de saúde retirar os animais do domicílio, ou via pública e encaminhar à unidade de saúde todos os indivíduos que tenham sido agredidos, ou tiveram contato com o animal.
- () Herpes Zoster.
() Raiva.
() Leptospirose.
() Rubéola.
() Sarampo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (B) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- (C) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (D) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
- (E) 3 – 5 – 4 – 3 – 2.

08. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as afirmações sobre Dengue:

- () Por ser uma doença de notificação compulsória, todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância epidemiológica, o mais rapidamente possível.
- () Todos os casos confirmados devem ser referenciados para as unidades de emergência, ou de maior complexidade a fim de receberem hidratação venosa e observação contínua.
- () Na maioria das vezes os pacientes que apresentam a forma clássica da doença, não necessitam de cuidados hospitalares.
- () Logo que se tenha conhecimento da suspeita de casos de dengue deve-se organizar ações de bloqueio na área provável de transmissão, visando a diminuição da população adulta de mosquitos.
- () A adoção de medidas de controle deve aguardar os resultados de exames laboratoriais para confirmação dos casos suspeitos.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – F – V – V – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – V – V – V – F.
- (E) V – F – V – V – F.

09. Quanto à Tuberculose, podemos afirmar que:

- I - Pacientes imunodeprimidos e, principalmente, com HIV+ são os que apresentam maior susceptibilidade, exigindo medidas mais severas para o controle da infecção.
- II - Se o contatante de uma criança com diagnóstico de tuberculose não quiser comparecer à unidade de saúde, a visita domiciliar torna-se obrigatória.
- III - No tratamento supervisionado da Tuberculose torna-se indispensável a realização de baciloscopia de controle, realização de consultas de acompanhamento e realização de visita domiciliar.
- IV - Atualmente a contaminação por Tuberculose não está relacionada à má distribuição de renda e à pobreza, sendo prevalente em áreas de grande concentração populacional.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

10. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () O Tétano acidental ainda constitui problema de saúde pública nas áreas onde os níveis de desenvolvimento humano e de cobertura vacinal são inadequados.
- () O Tétano acidental tem acometido com mais frequência o sexo feminino, principalmente entre a faixa etária dos 20 aos 49 anos de idade.
- () A letalidade do Tétano acidental está acima dos 30%, afetando principalmente os menores de cinco anos e os idosos.
- () Os fatores ou situações de risco para o Tétano Neo-Natal estão relacionados a: baixa cobertura vacinal e mulheres em idade fértil, ocorrência de partos domiciliares, cobertura e qualidade do pré-natal, dificuldades de acesso aos serviços de saúde, capacitação técnica específica dos profissionais de saúde.
- () A incidência de Tétano Neo-Natal tem sido reduzida sensivelmente, no mundo todo, devido à implementação de políticas de eliminação do Tétano Neo-Natal, prevalecendo apenas nos países de menor desenvolvimento econômico e social.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – V – V – V – V.

11. As afirmações abaixo estão incluídas no campo de atuação do SUS (Sistema Único de Saúde), **EXCETO**:

- (A) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (B) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.
- (C) o controle da qualidade de insumos e medicamentos, exceto sangue e derivados.
- (D) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- (E) a vigilância nutricional e orientação alimentar.

12. Considere as afirmações abaixo no que se refere aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e assinale a afirmativa correta:

- (A) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (B) Universalidade de acessos, principalmente aos serviços de saúde hospitalar.
- (C) Direito à informação, às pessoas assistidas sobre sua saúde, exceto as menores de idade e declaradas incapazes.
- (D) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Participação da comunidade, quando em caráter deliberativo.

13. Em relação aos objetivos e atribuições do SUS (Sistema Único de Saúde), pode-se afirmar que o Programa de Saúde da Família **NÃO** preconiza:

- (A) regionalização.
- (B) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoções, proteção e recuperação da saúde.
- (C) execução de ações de vigilância sanitária.
- (D) separação, em nível executivo, de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

14. Em relação à Lei nº 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar:

- I - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- II - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- III - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo conselho.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as afirmações sobre o Manual de Sistema de Informação Básica – SIAB:

- () Os casos de diabetes gestacionais devem ser cadastrados na ficha B-DIA.
- () A ficha B-HA serve para o cadastramento e acompanhamento mensal dos hipertensos.
- () O instrumento utilizado para o acompanhamento da criança – Ficha C, é o Cartão da Criança Padronizado pelo Ministério da Saúde.
- () O trabalho de consolidação dos dados do Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área – SSA2 deve ser realizado durante reunião mensal da Equipe.
- () O Relatório de Produção e de Marcadores para avaliação – PMA2 consolida anualmente a produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadores por área.

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

16. As notificações diárias de situação, ou eventos mórbidos, devem ser realizados respectivamente:

- (1) Pneumonia em menores de 5 anos.
- (2) Fratura de colo de fêmur em maiores de 50 anos.
- (3) Óbitos.
- (4) Menores de 2 anos que tiveram diarreia.
- (5) Hospitalizações.

- () apenas pelo ACS.
- () exclusivamente por médico.
- () exclusivamente por enfermeiro.
- () por todos profissionais da equipe.
- () por qualquer profissional da equipe.

A seqüência do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- (B) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- (C) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- (D) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.
- (E) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.

17. O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre população visitada. Em relação à Ficha A, está correto afirmar que, **EXCETO**:

- (A) O cadastramento das famílias é feito na Ficha A, sendo preenchida nas primeiras visitas pelo ACS, uma ficha para cada membro da família.
- (B) Todos os dados desta Ficha devem ser atualizados sempre que houver alteração.
- (C) Toda vez que cadastrar ou desligar uma família, o agente deve levar a Ficha A para a reunião mensal, para discutir com o instrutor/supervisor.
- (D) Os campos no verso da Ficha A servem para caracterizar a situação de moradia e saneamento e outras informações acerca da família.
- (E) A Ficha A permite à equipe de saúde conhecer as condições de vida das pessoas de sua área de abrangência e melhor planejar suas intervenções.

18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada modalidade de assistência domiciliar às suas respectivas definições.

- (1) Atendimento domiciliar.
- (2) Internação domiciliar.
- (3) Acompanhamento domiciliar.
- (4) Vigilância domiciliar.

- () É o cuidado no domicílio para pessoas que necessitem contatos freqüentes e programáveis com os profissionais da Equipe, como, por exemplo, o paciente em fase terminal.
- () É o cuidado prestado no domicílio, para pessoas com problemas agudos, e que, em função disso, estejam temporariamente impossibilitadas de comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS).
- () É decorrente do comparecimento de um integrante da equipe até o domicílio para realizar ações de promoção, prevenção, educação e busca ativa da população de sua área de responsabilidade.
- () É o cuidado no domicílio, de pacientes com problemas agudos ou egressos de hospitalização, que exijam uma atenção mais intensa, mas que possam ser mantidos em casa, desde que disponham de equipamentos, medicamentos e acompanhamento diário pela equipe da UBS e a família assuma parcela dos cuidados.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo é:

- (A) 2 – 3 – 1 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

19. Segundo a Portaria nº 648 de 28 de março de 2006 – MS que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), são atribuições comuns a todos os profissionais:

- I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- II - Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis.
- III - Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social.
- IV - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

20. Sobre o processo de Educação Permanente aos profissionais das Equipes de Saúde da Família, a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, define, **EXCETO**:

- (A) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e ao Distrito Federal (DF) articular instituições, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS), para capacitação e garantia de educação permanente aos profissionais de saúde das equipes de Atenção Básica e das Equipes de Saúde da Família.
- (B) Compete às SES e ao DF promover o intercâmbio de experiências entre os diversos municípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria dos serviços da Atenção Básica.
- (C) Compete ao Ministério da Saúde (MS) estabelecer diretrizes nacionais e disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de capacitação e educação permanente dos profissionais da Atenção Básica.
- (D) Devem compor o financiamento da Educação Permanente recurso das três esferas de governo acordados na CIT (Comissão Intergestores Tripartite) e nas CIBs (Comissão Intergestores Bipartite).
- (E) Na implantação da ESF (Equipe de Saúde da Família), os profissionais de nível superior deverão receber capacitação introdutória antes dos demais profissionais, para posteriormente capacitá-los.

21. Em relação à prevenção do câncer de colo de útero, podemos afirmar que:

- I - O tabagismo, o uso prolongado de contraceptivos orais e a multiplicidade de parceiros sexuais são alguns dos fatores de risco associados ao câncer de colo de útero.
- II - Não se deve coletar o citopatológico de colo de útero em mulheres grávidas.
- III - O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 60 anos de idade, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.
- IV - A coleta de material da endocérvice deve ser feita com a espátula de Ayre, em movimento rotativo de 360° em torno de todo o orifício cervical, para que toda superfície do colo seja raspada e representada na lâmina.

Estão corretas:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

22. "Doença respiratória aguda, particularmente contagiosa, que acomete principalmente os bronquíolos, causando um processo inflamatório obstrutivo intenso com acúmulo de secreções nas vias aéreas. O vírus sincicial respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos. Manifesta-se por febre, taquipnéia, retração e chiado no peito, geralmente precedido por coriza e tosse."

O conceito acima descreve um quadro de:

- (A) Traqueobronquite.
- (B) Laringite (crupe).
- (C) Epiglotite.
- (D) Pneumonia.
- (E) Bronquiolite.

23. A depressão é um problema comum em todos os países que realizaram estudos de prevalência, constituindo-se em um importante problema de saúde pública. A prevalência anual na população em geral varia entre 3 e 11% e é de duas a três vezes maior em mulheres do que em homens. Após o diagnóstico de um episódio depressivo, algumas questões terão importância decisiva no prognóstico e na conduta a ser tomada pelo profissional de saúde. Dentre elas, podemos destacar:

- (A) doença cardíaca.
- (B) tabagismo.
- (C) risco de suicídio.
- (D) insônia.
- (E) estresse.

24. Conceitua-se anemia na gravidez quando os valores de _____ são iguais ou menores que _____ g/dl (OMS, 1974). Na ausência desta, recomenda-se manter a suplementação de 60 mg/dia de ferro elementar, a partir da _____ semana de gestação. Recomenda-se ingestão _____ refeições.

Complete as lacunas com a alternativa correta:

- (A) hematócrito – 33 – 20° – junto com as
- (B) hemoglobina – 11 – 20° – uma hora antes das
- (C) hemoglobina – 11 – 20° – após as
- (D) hematócrito – 33 – 16° – uma hora antes das
- (E) hemoglobina – 11 – 20° – junto com as

25. Durante o puerpério, algumas situações dificultam a adesão ao aleitamento materno, **EXCETO**:

- (A) ordenha manual.
- (B) pega incorreta do mamilo.
- (C) fissuras (rachaduras).
- (D) mastite.
- (E) mamas ingurgitadas.

26. Assinale **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas em relação às Urgências e Emergências maternas:

- () Considera-se crise hipertensiva quando a pressão arterial diastólica atinge 110 mmHg.
- () A infecção do trato urinário alto ou Pielonefrite aguda caracteriza-se por um quadro de taquicardia, taquipnéia e febre.
- () A conduta na trombose venosa profunda é repouso no leito e manter membro afetado elevado.
- () Pode-se desconfiar de Cetoacidose Diabética quando a glicemia é maior que 250 mg/dl e a cetonúria maior ou igual a 3 cruzeiros (+++).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – F.

27. Os anticoncepcionais orais combinados **NÃO** devem ser usados na seguinte situação:

- (A) Doença tromboembólica em atividade no momento ou no passado.
- (B) 21 dias pós-parto ou mais, sem lactação.
- (C) História familiar de câncer de mama.
- (D) Cefaléia leve.
- (E) HIV positivo ou AIDS.

28. Diante da suspeita de violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente, torna-se de extrema importância que a equipe de profissionais do PSF reúna dados e evidências observados (de acordo com suas competências) para construção de uma história precisa sobre o evento. Os profissionais de saúde devem ter um olhar atento e crítico frente aos problemas identificados.

Considerando o exposto, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A intervenção da equipe de saúde, em situações pontuais de violência, geralmente auxilia na resolução do problema.
- () Contusões, equimoses no tronco, dorso e nádegas, indicando datas diferentes da agressão; laceração do freio da língua; queimaduras no dorso ou nos genitais são manifestações clínicas de violência contra a criança e adolescentes.
- () Os profissionais de saúde devem demonstrar seus sentimentos em relação à situação – como desaprovação, raiva e indignação.
- () Alguns transtornos psicológicos como: aversão ao contato físico, isolamento, comportamento submisso, baixa auto-estima ou conduta agressiva acompanhada de irritabilidade são comuns em situações de violência contra a criança.
- () é necessário acompanhamento multidisciplinar, bem como avaliação do grau de risco e repetição de novos episódios de violência.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V – F.

29. A região das fraldas do recém-nascido, por estar freqüentemente úmida e quente, é um ambiente propício à proliferação de microorganismos.

Diante dessa situação, identifique os tipos de lesões e seus respectivos tratamentos, associando a primeira coluna com a segunda.

- (1) Ocorre em áreas de maior contato com as fraldas. As lesões surgem e desaparecem rapidamente e tendem a se agravar com o uso de talco. A mãe deve ser orientada a realizar trocas freqüentes de fraldas e suspensão do talco, quando for o caso, e usar a pasta de Lassar.
- (2) Está usualmente limitada à superfície convexa das nádegas, períneo, baixo-ventre e dobras cutâneas e o tratamento consiste em deixar a criança sem fraldas por algumas horas, inclusive à noite, lavá-las com sabão neutro, enxaguá-las em abundância, não usando amaciante.
- (3) Caracteriza-se por lesões avermelhadas gordurosas, com crostas amarelas, nas zonas intertriginosas, podendo haver infecção secundária por *Candida albicans*. O tratamento (prescrito pelo médico) deve orientar a higiene do períneo a cada troca de fraldas e uso de corticóide tópico não-fluorado, além do tratamento da candidíase, quando associada.
- (4) Produz lesão avermelhada de cor viva, com bordas bem demarcadas, confluentes e com lesões satélites adjacentes. O tratamento é feito com antifúngicos tópicos, na região afetada, por dez dias.
- (5) Localiza-se caracteristicamente nas dobras da pele, com maceração e secreção úmida. É recomendado, além de evitar roupas excessivas e calças plásticas, o uso de compressas de solução de acetato de alumínio 1:30.

- dermatite por irritação.
- intertrigo.
- dermatite por fricção
- infecção por candidíase.
- dermatite seborréica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- (B) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- (C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.

30. A avaliação do crescimento da criança através da antropometria é de extrema importância, pois permite diagnosticar um crescimento satisfatório ou não.

Relacione as colunas:

- (1) Peso/idade.
- (2) Estatura/Idade.
- (3) Peso/estatura.
- (4) Perímetro cefálico/Idade.
- (5) Perímetro/Braquial.

- Prioritariamente realizado em crianças de zero a 24 meses, apresenta pequena faixa de variação para qualquer grupo etário.
- Apesar de medir cumulativamente o crescimento, é um bom parâmetro para avaliação do crescimento, mas custa a refletir problemas agudos de saúde e nutrição da criança. Quando esta técnica é mal feita, pode mascarar problemas no crescimento.
- Não se presta para o acompanhamento do crescimento infantil, uma vez que alterações neste parâmetro são lentas. Em situações excepcionais, pode ser útil, tais como atividades de tiragem e inquéritos populacionais.
- Índice de fácil aferição pelo profissional de saúde, permite detectar com rapidez, qualquer deterioração ou melhora do estado de saúde, técnica não invasiva, fácil e precisa.
- tem aplicação na clínica pediátrica, na avaliação e segmento individual de casos de desnutrição aguda e de peso excessivo.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.
- (B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.
- (C) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
- (D) 2 – 4 – 3 – 5 – 1.
- (E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.

31. A observação do desenvolvimento da criança deve ser feita durante a consulta. O profissional deve tentar observar os marcos indicadores desde a entrada da mãe com a criança no consultório. Durante a consulta de enfermagem, além desta observação, o enfermeiro deve alertar a mãe sobre os acidentes domésticos que podem ocorrer de acordo com a faixa etária da criança.

Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:

- (1) 3 a 4 meses.
 - (2) 7 a 9 meses.
 - (3) 19 meses a dois anos.
 - (4) 3 a 4 anos.
 - (5) 4 a 6 anos.
- () Nesta idade, a criança gosta de expressar suas idéias, conta histórias, veste-se e toma banho sozinha, corre e pula alternando os pés, e gosta de imitar super-heróis.
 - () Já fica sentada sem apoio, começa a querer provar outros alimentos além do leite materno, é muito curiosa, já pode se arrastar ou engatinhar e, portanto, deve-se tirar do seu alcance: remédios, inseticidas e pequenos objetos.
 - () De bruços, levanta a cabeça e ombros, aprecia a companhia da mãe e gosta de trocar de lugar, havendo risco de queda.
 - () Já anda com segurança, brinca com vários brinquedos, tem vontade própria, sobe e mexe em tudo. Deve-se ter cuidado com fogo e cabos de panelas.
 - () Gosta de brincar com outras crianças, reconhece cores, ajuda a vestir-se, imita situações do cotidiano e os seus pais. Nesta idade, há riscos de envenenamento, queimaduras e atropelamento.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- (C) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- (D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.

32. As IRAs (Infecções Respiratórias Agudas) constituem um problema de saúde pública da maior relevância, principalmente em idosos e crianças. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmativas abaixo:

- () Os sinais semiológicos mais indicativos de pneumonia em uma criança que está tossindo são a taquipnéia e a dificuldade respiratória, mais especialmente a retração subcostal ou intercostal.
- () A disseminação das infecções respiratórias agudas entre as pessoas se dá principalmente por intermédio das mãos contaminadas por secreções oculares, nasais ou saliva.
- () Para a criança de dois meses, é considerado taquipnéia, quando a frequência respiratória é maior ou igual a 50 mpm.
- () Os fatores de risco para mortalidade por infecção respiratória aguda são: desnutrição, baixo peso ao nascer, práticas de aleitamento materno sub-ótimas, vacinação incompleta, concomitâncias de doenças como o sarampo, coqueluche e tuberculose, exposição intradomiciliar e ausência de escolaridade materna.
- () A ausculta pulmonar de uma criança com bronquiolite revela uma inspiração prolongada com sibilos inspiratórios e expiratórios.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

33. Levando em consideração o Calendário Básico de Vacinação, assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () Adolescente grávida, que esteja com a vacina dT (contra Difteria e Tétano) em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, precisa reiniciar o esquema de vacinação.
- () A vacina SR (dupla viral) e/ou SCR (tripla viral) deve ser administrada em mulheres de doze a quarenta e nove anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior, e em homens até trinta e nove anos.
- () A vacina SABIN (contra pólio) e a vacina *Salk* (contra pólio inativada) é aplicada nas crianças aos dois, quatro e seis meses de idade.
- () Conforme calendário de vacinação do adolescente, quando não há comprovação de vacinação anterior, a primeira dose da vacina Hep B (Hepatite B) deve ser realizada entre onze e dezenove anos, a segunda dose trinta dias após a primeira e a terceira dose seis meses após a primeira dose.
- () A vacina contra Influenza é aplicada durante campanha nacional de vacinação ao idoso, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – F – F – V – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – V – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – V – F – V – F.

34. Os refrigeradores são equipamentos de uso doméstico que, na rede de frio, são destinados à estocagem de imunobiológicos, devendo para isso estar regulados para funcionar adequadamente, na temperatura e manuseio ideais, garantindo a conservação adequada das vacinas e soros.

Isso posto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Após a limpeza, deve-se manter as portas do refrigerador fechadas por uma hora, verificando-se a temperatura após esse período, recolocando as vacinas, quando a mesma estiver +2 e +8° C.
- (B) Caso a energia elétrica seja interrompida sem estimativa de tempo para retornar, deve-se acondicionar adequadamente os imunobiológicos em caixas térmicas e, caso não se restabeleça a energia até o encerramento dos trabalhos na unidade de saúde, deve-se transferir as caixas com imunobiológicos para o serviço de saúde mais próximo, ou para a instância regional.
- (C) Os medicamentos que necessitam de refrigeração e que ainda não foram abertos, devem ser colocados na porta do refrigerador das vacinas, evitando-se a contaminação dos imunobiológicos.
- (D) Na primeira prateleira do refrigerador devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa.
- (E) Na terceira prateleira do refrigerador, pode-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre +2 e +8° C, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas.

35. Considere as afirmações:

- I - São fatores de risco para doença cardiovascular: sedentarismo, DM, tabagismo, estresse psico-social, gordura abdominal, hipercolesterolemia.
- II - Dos fatores potencialmente controláveis HAS e DM são críticos do ponto de vista de saúde pública.
- III- A doença cardiovascular representa atualmente, no Brasil, a maior causa de mortes.

Qual a afirmação correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

36. Existem inúmeras intervenções protetoras vasculares e renais de benefício comprovado, as chamadas intervenções preventivas. As afirmativas abaixo relacionam-se com as intervenções preventivas, **EXCETO**:

- (A) Incentivar o consumo de peixes; comer peixe pelo menos 3 vezes por semana.
- (B) A prática de atividade física regularmente promove efeito protetor para doença cardiovascular.
- (C) A farmacoterapia melhora, de maneira clinicamente importante, a cessação do hábito de fumar.
- (D) A ingestão leve a moderada de bebidas alcoólicas, equivalente a duas doses para homens, e uma dose para mulheres, pode estar associada à menor incidência de doença cardiovascular.
- (E) O tratamento da obesidade, a longo prazo, reduz os níveis de glicemia, pressão arterial e melhora o perfil lipídico.

37. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () Cerca de 80% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser atendidos predominantemente na Atenção Básica.
- () Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 110 e 125 mg/dl, por apresentarem alta probabilidade de ter diabetes, podem requerer avaliação por TTG – 75g em 24h.
- () A insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C), por até um mês.
- () A cetoacidose em evolução – com presença de sintomas de sudorese, palpitações, tremores, sensação desagradável de apreensão, confusão e fraqueza – requer tratamento imediato no local de atendimento usual ou em serviço de emergência.
- () Os ajustes das doses de insulina são baseados nas medidas de glicemias.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é:

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) V – V – V – V – F.

38. Considere o Teste Oral de Tolerância à Glicose e assinale a alternativa correta:

- (A) O paciente recebe uma carga de 75g de glicose, em jejum, e a glicemia é medida antes, e 120 minutos após a ingestão.
- (B) O paciente recebe uma carga de 100g de glicose, em jejum, e a glicemia é medida antes, e 120 minutos após a ingestão.
- (C) O paciente recebe uma carga de 100g de glicose, em jejum, e a glicemia é medida antes, 60 e 120 minutos pós prandial.
- (D) O paciente recebe uma carga de 75g de glicose pós prandial e a glicemia é medida antes, e 120 minutos após a ingestão.
- (E) O paciente recebe uma carga de 75g de glicose, em jejum, e a glicemia é medida 12 horas após a ingestão.

39. Segundo Duncan, parada cardiorrespiratória é a intervenção súbita da atividade mecânica ventricular útil e suficiente e da respiração. Considere as afirmativas:

- I - O prognóstico das vítimas de parada cardiorrespiratória depende, dentre outros fatores, da rapidez com que se dá o início às manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
- II - A abordagem inicial de uma vítima com provável parada cardiorrespiratória deve ser a detecção de inconsciência.
- III- O risco de contágio de doenças infecciosas para o socorrista – principalmente por HIV e vírus da hepatite B – pelo método boca a boca é baixo e não contra-indica seu uso.
- IV - Socorro básico é um conjunto de procedimentos de emergência que pode ser executado apenas por profissionais da área da saúde treinados.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

40. Conforme o Decreto nº 94.406, ao enfermeiro incumbe privativamente, **EXCETO**:

- (A) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (B) Consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- (D) Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
- (E) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

41. Considere as infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, e assinale a alternativa correta:

- (A) A advertência verbal consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, sem testemunhas, que será registrada no prontuário do mesmo.
- (B) São consideradas infrações graves as que provocam morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa.
- (C) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 15 vezes o valor da anuidade da categoria a qual pertence o infrator.
- (D) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de enfermagem.
- (E) A suspensão consiste na proibição do exercício da enfermagem por um período não superior a 30 dias.

42. Considere as afirmações abaixo no que se refere à Lei nº 10.741/2003 Estatuto do Idoso e Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente:

- I - Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da Assistência Social.
- II - Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, exceto os de uso controlado, especialmente os de uso continuado.
- III - O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

43. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere às atribuições da Equipe como um todo na assistência domiciliar:

- () Orientar a família sobre sinais de gravidade e condutas a serem tomadas.
- () Avaliar a condição ambiental do domicílio e construir proposta de adequação dentro da realidade familiar e do domicílio.
- () Agendar horário para esclarecimento e orientações à família, sempre que solicitado pelo usuário.
- () Evitar que familiares do acamado participem do cuidado diário, deixando esta tarefa para a equipe, pois podem piorar suas condições de saúde.
- () Solicitar avaliação da equipe de referência ou encaminhar, sempre que indicado.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V – F.

44. De acordo com DUNCAN (2006), sobre a definição e descrição do território de abrangência, podemos afirmar que, **EXCETO**:

- (A) A Equipe de Saúde da Família, em conjunto com a comunidade e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, define um território urbano, rural ou urbano e rural, com limites geográficos bem estabelecidos e população definida, pelo qual tem co-responsabilidade sanitária.
- (B) No momento do reconhecimento da futura área de atuação e identificação de situações de risco, os ACSs vão a campo, enquanto a equipe técnica organiza o trabalho interno, no posto de saúde.
- (C) É importante considerar aspectos como localidade de maior densidade populacional, existência de microárea de risco, meios de transporte e estradas que facilitem o acesso à população e presença de barreiras físicas, como rios, lagos, serras, entre outros, que possam dificultá-lo.
- (D) Para o processo de cadastramento das famílias adscritas, utiliza-se uma ficha padronizada pelo Ministério da Saúde, com dados demográficos, sociais e de utilização dos serviços de saúde.
- (E) O cálculo de indicadores de saúde, como coeficientes de natalidade, mortalidade e morbidade, também deve ser feito para avaliação da situação de saúde da comunidade.

45. As alternativas abaixo apresentam atribuições do Enfermeiro em relação às atividades de controle da tuberculose na rede básica e no Programa de Saúde da Família, **EXCETO**:

- (A) Fazer visita domiciliar para acompanhar o tratamento domiciliar e supervisionar o trabalho do ACS.
- (B) Iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo.
- (C) Solicitar baciloscopia dos sintomáticos respiratórios para diagnóstico.
- (D) Manter a ficha do SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica) B-TB atualizada.
- (E) Solicitar exame de escarro mensal para acompanhar o tratamento dos pulmonares bacilíferos.

46. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grande risco de aquisição de infecções, nas seguintes categorias: críticos, semicríticos e não-críticos. Esta classificação irá nortear a escolha do processo de desinfecção ou esterilização a ser utilizado.

Relacione os artigos abaixo, com a respectiva classificação:

- (1) Críticos.
 - (2) Semicríticos.
 - (3) Não-críticos.
-
- () Inaladores, máscaras de nebulização, ambu.
 - () Tubos de látex, acrílico.
 - () Termômetro.
 - () Espéculos vaginais e otológicos.
 - () Cubas e baldes.
 - () Vidraria e borracha para aspiração.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 3 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
- (C) 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1.

47. A Dengue constitui-se, no momento, em um grave problema de saúde pública no Brasil e na maioria dos países tropicais onde as condições ambientais favorecem a proliferação do vetor.

Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere a esta doença:

- (A) Como não se conhece nenhum reservatório animal do vírus nas Américas, o homem infectado continua sendo a única fonte de infecção para o mosquito, o qual permanece infectado o resto de sua vida que é de 4 a 6 semanas, com capacidade de transmitir a virose aos suscetíveis.
- (B) A infecção do mosquito fêmea pode ocorrer após este alimentar-se com o sangue de um indivíduo no período de viremia, que é geralmente de 6 dias.
- (C) Após um período de incubação variando, em média, de 2 a 3 dias, a dengue pode evoluir para uma de suas formas clínicas, conforme classifica a Organização Mundial de Saúde (OMS).
- (D) As medidas profiláticas e de controle baseiam-se, fundamentalmente, na vigilância epidemiológica e no combate ao vetor, já que ainda não existe vacina disponível nem quimioterapia antiviral eficaz.
- (E) É uma doença de notificação compulsória no País. Para fins de notificação durante epidemias, a suspeita clínica é suficiente, apoiada ou não em exames específicos, ao passo que, para fins de vigilância epidemiológica, deve-se sempre procurar confirmar o diagnóstico por meio de exames laboratoriais.

48. O quadro clínico da Síndrome da Febre da Dengue, na dengue Clássica, caracteriza-se por, entre outros:

- I - Petéquias, hipotensão arterial.
- II - Exantema maculopapular ou escarlatiniforme.
- III- Febre por até sete dias, cefaléia importante.
- IV- Manifestações gastrintestinais.
- V - Mialgias, artralgias, dor retroorbitária.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas II, III e V.
- (B) Apenas I, III e V.
- (C) Apenas I, III, IV e V.
- (D) Apenas I, II, III e V.
- (E) Apenas II, III, IV e V.

49. Em relação às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e AIDS, podemos afirmar que, **EXCETO**:

- (A) O exame de Papanicolau se mostra anormal em aproximadamente 25 a 40% das mulheres HIV +.
- (B) Hoje, a principal via de transmissão do vírus HIV é a heterossexual.
- (C) A transmissão sexual do vírus da Hepatite C é pouco freqüente, com risco menor que 2% para parceiros estáveis e ocorre principalmente em pessoas com múltiplos parceiros e com prática sexual de risco.
- (D) A presença de DST aumenta em até 4 vezes o risco de infecção pelo HIV, caso haja relação sexual desprotegida com uma pessoa portadora.
- (E) O tempo decorrido para que a sorologia anti-HIV torne-se positiva é de 6 a 12 semanas após a aquisição do vírus, com o período médio de aproximadamente 2 meses.

50. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere às DSTs:

- () Redução de danos no contexto do HIV e outras DSTs é o conjunto de ações que visam a diminuir os prejuízos biológicos, econômicos e sociais trazidos pelo uso e abuso de drogas, sem necessariamente implicar o abandono do consumo.
- () O preservativo masculino e feminino não devem ser utilizados ao mesmo tempo, pois isso aumenta a possibilidade de rompimento pelo atrito.
- () A candidíase não é uma DST e sim uma infecção endógena.
- () As mulheres infectadas pelo HIV podem apresentar como manifestação precoce de imunodeficiência pelo HIV, bem como nas fases mais avançadas da doença, formas extensas ou recorrentes de candidíase vulvovaginal com ou sem acometimento oral.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – V – V – V.