

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

- CARGO 04 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2007

GABARITO APÓS RECURSOS

- CARGO 04 -

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01.	B	11.	C	21.	A
02.	A	12.	E	22.	C
03.	D	13.	D	23.	D
04.	C	14.	E	24.	E
05.	D	15.	C	25.	A
06.	B	16.	ANULADA	26.	A
07.	B	17.	B	27.	C
08.	B	18.	E	28.	A
09.	B	19.	D	29.	E
10.	D	20.	E	30.	A

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VIAMÃO

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **30** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 10 questões e **Conhecimentos Específicos** – 20 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 31 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas aos conceitos básicos que norteiam o preenchimento das fichas e relatórios do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB:

_____ é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência que residem na mesma unidade domiciliar. Inclui empregado(a) doméstico(a) que reside no domicílio, pensionistas e agregados.

_____ o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS).

_____ designa o “local de moradia estruturalmente separado e independente, constituído por um ou mais cômodos”.

A alternativa que preenche a seqüência correta dos conceitos acima é:

- (A) Domicílio – Microárea – Família.
- (B) Família – Microárea – Domicílio.
- (C) Domicílio – Área – Família.
- (D) Família – Área – Domicílio.
- (E) Família – Microárea – Área.

02. O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. Com relação à Ficha A, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) é utilizada para o acompanhamento domiciliar dos grupos prioritários para monitoramento.
- (B) todos os dados desta ficha devem ser atualizados sempre que houver alteração.
- (C) o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar atento para registrar, todo mês, a ocorrência de nascimentos, mortes e mudanças de atividade profissional (ocupação) dos membros da família e as condições de moradia e saneamento.
- (D) é preenchida nas primeiras visitas que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) faz às famílias de sua comunidade. Deve ser preenchida uma ficha por família.
- (E) possui dados como data de nascimento, idade, sexo, ocupação, doença ou condição referida, entre outros.

03. Associe os instrumentos disponíveis para prevenção e controle, da primeira coluna, com as doenças relacionadas na segunda coluna.

- (1) A sigla da vacina é decorrente da expressão bacilo de Calmette-Guérin, e há contra indicação absoluta para aplicar esta vacina nos portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas. Pacientes adultos sintomáticos ou assintomáticos não deverão ser vacinados.
- (2) A realização do pré-natal é extremamente importante, onde se destaca a importância da atualização do esquema de vacina, da amamentação, do planejamento familiar e dos cuidados de higiene do recém-nascido, em especial do coto umbilical.
- (3) Suas manifestações clínicas são: febre alta, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik, e diante de uma pessoa com sinais e sintomas, deve ser realizado o bloqueio vacinal dirigido aos contatos do caso suspeito.
- (4) Após a identificação de um surto, atenção especial deve ser dada para detecção da doença em mulheres em idade fértil.
- (5) É transmitida principalmente por roedores que albergam a bactéria nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente, contaminando a água, solo e alimentos. As medidas de prevenção e/ou controle deverão ser direcionadas não somente aos reservatórios, como também à proteção dos trabalhadores expostos e ações de educação em saúde.

- () Tétano Neo-Natal
- () Sarampo
- () Tuberculose
- () Rubéola
- () Leptospirose

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.

04. Assinale a alternativa **INCORRETA**, no que diz respeito ao Tétano Acidental e Tétano Neo-Natal:

- (A) Além da vacinação de rotina, devemos garantir a vacinação para os grupos de risco (trabalhadores da construção civil e da agricultura, catadores de lixo, trabalhadores de oficinas mecânicas, etc).
- (B) Os eventos adversos da vacina são raros, mas podem apresentar-se sob a forma de dor local, hiperemia, edema e induração e febrícula com sensação de mal-estar de intensidade variável e passageira.
- (C) O baixo nível de escolaridade das mães, baixo nível socioeconômico não são fatores de risco para o Tétano Neo-Natal.
- (D) A principal forma de prevenção do Tétano Neo-Natal é a vacinação de todas as mulheres em idade fértil (entre 12 e 49 anos) com o esquema completo da vacina dupla tipo adulto (dT).
- (E) A educação em saúde é uma prática social que objetiva promover o aumento da consciência sanitária da população e dos profissionais de saúde.

05. Em relação à Dengue, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) quanto aos aspectos epidemiológicos, tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nesta estação.
- (B) é mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou resultantes da ação do ser humano, mas pode ocorrer onde exista população susceptível, presença do vetor e o vírus seja introduzido.
- (C) por ser uma doença de notificação compulsória, todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, o mais rapidamente possível.
- (D) a adoção de medidas de controle para proteção da população, deve aguardar resultados de exames laboratoriais para confirmação dos casos suspeitos.
- (E) logo que se tenha conhecimento da suspeita de casos de dengue, deve-se realizar ações de bloqueio na área provável de transmissão, visando a diminuição da população adulta de mosquitos.

06. Dentre os campos de atuação do SUS (Sistema único de Saúde) **NÃO** se inclui:

- (A) vigilância epidemiológica.
- (B) assistência terapêutica integral, exceto a farmacêutica.
- (C) execução de ações de saúde do trabalhador.
- (D) formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- (E) fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.

07. A Conferência de Saúde reunir-se-á, com a representação dos vários segmentos sociais:

- (A) anualmente.
- (B) a cada 4 anos.
- (C) a cada 2 anos.
- (D) conforme deliberação na própria Conferência.
- (E) quando o Conselho de Saúde determinar.

08. Segundo a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, são atribuições específicas do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem:

- I - participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF (Unidade de Saúde da Família) e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
- II - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
- III - avaliar as ações desenvolvidas pelos ACSs (Agentes Comunitários de Saúde).

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Segundo a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, identifique a alternativa que contém o(s) item(s) necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família.

- (A) Equipe multiprofissional responsável por, no máximo 6.000 habitantes, sendo a média recomendada de 5.000 habitantes.
- (B) Jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os integrantes da equipe.
- (C) Equipe composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, ACSs e dentista.
- (D) Número de ACSs suficiente para cobrir pelo menos 90% da população cadastrada.
- (E) Prédio com área física de, no mínimo 100 metros quadrados.

10. A Portaria nº 648 de 28, de março de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Sobre as atribuições comuns a todos os profissionais, qual afirmativa está **INCORRETA**?

- (A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- (B) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos.
- (C) Participar das atividades de educação permanente.
- (D) Levar o anticoncepcional aos domicílios quando as mulheres em idade fértil não comparecerem ao posto para buscá-lo.
- (E) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica.

11. Com relação às recomendações prévias à mulher para a realização da coleta do exame preventivo do colo do útero, assinale com **V** as afirmações verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais ou exames intravaginais, como por exemplo a ultrassonografia, durante 48 horas antes da coleta.
- () Evitar relações sexuais durante 5 dias antes da coleta.
- () Evitar anticoncepcionais locais, espermicidas, nas 48 horas anteriores ao exame.
- () O exame pode ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue não prejudica o diagnóstico citológico.

A seqüência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – F – F.

12. Toda gestante deve ser orientada a evitar o uso de produtos de origem animal crus ou malcozidos (caprinos e bovinos), incinerar as fezes de gatos, lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada e evitar contato com gatos. Estas recomendações irão protegê-la de doença que, ocorrendo durante a gravidez, pode causar no feto problemas como: prematuridade, retardo mental, surdez, alterações oculares ou outros.

A que doença o texto se refere?

- (A) Hepatite B.
- (B) Tétano.
- (C) Sarampo.
- (D) Sífilis.
- (E) Toxoplasmose.

13. São recomendações para prevenção de hemorróidas durante a gestação, **EXCETO**:

- (A) Alimentação rica em fibras, a fim de evitar a constipação intestinal.
- (B) Não usar papel higiênico colorido ou áspero (molhá-lo) e fazer higiene perianal com água e sabão neutro, após evacuação.
- (C) Fazer banhos de vapor, ou compressas mornas.
- (D) Não fazer atividade física neste período.
- (E) Agendar consulta médica, caso haja dor ou sangramento anal persistente.

14. As recomendações de reduzir a exposição domiciliar aos ácaros como: usar capas no colchão, não ter animais domésticos com pêlos, usar travesseiros com capa para proteger do pó e a ausência de tabagismo no domicílio referem-se à prevenção de:

- (A) Tuberculose.
- (B) Faringite.
- (C) Bronquite.
- (D) Gripe.
- (E) Asma.

15. Qual dos métodos anticoncepcionais abaixo previne tanto a gravidez indesejada, quanto a ocorrência de DST e infecção pelo HIV?

- (A) DIU.
- (B) Tabela.
- (C) Métodos de barreira.
- (D) Métodos definitivos.
- (E) Métodos hormonais.

16. De acordo com a Lei nº 1.0741/03 e Portaria 597/GM, de 08 de abril de 2004, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A prevenção e a saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população geriátrica, e gerontológico em ambulatórios, atendimento domiciliar, reabilitação para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde, entre outros.
- (B) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, ou em caso dele não estar em condições de proceder à opção, a equipe de saúde do PSF poderá fazê-lo.
- (C) A garantia de prioridade ao atendimento é traduzida em atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população.
- (D) Os casos de suspeita, ou confirmação, de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso.
- (E) A vacina contra Influenza é aplicada durante campanha nacional de vacinação ao idoso, nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.

17. Levando em consideração o Calendário Básico de Vacinação, pode-se afirmar que:

- I - O segundo reforço da vacina DPT (tríplice bacteriana) deve ser aplicado dos quatro aos seis anos.
- II - As vacinas que devem ser aplicadas aos dois, quatro e seis meses (primeira, segunda e terceira dose respectivamente) são: tetravalente e VOP (vacina oral contra pólio).
- III - A vacina contra Hepatite B é aplicada nas primeiras doze horas de vida do recém-nascido, sendo a segunda e terceira doses aplicadas aos dois e seis meses após a primeira dose.
- IV - O intervalo de temperatura do refrigerador, para conservação de imunobiológicos é de +2 a +8 graus centígrados.

Marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

18. Nas situações de violência contra a criança e adolescente, assinale qual deve ser a postura dos profissionais da equipe do PSF:

- (A) Perguntar diretamente se um dos pais foi responsável pelo ocorrido.
- (B) Insistir em confrontar dados contraditórios, ou aferir registros.
- (C) Confrontar os pais com descrições trazidas pela criança ou adolescente, especialmente nos casos de abuso.
- (D) Assumir postura investigatória como a de policial ou detetive.
- (E) Formular perguntas de forma aberta e imparcial.

19. Quanto à temperatura e verificação deste sinal vital na criança, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) O termômetro clínico deve ser lavado com água e sabão ou desinfetado com uma solução anti-séptica, entre uma verificação e outra.
- (B) Após colocar o termômetro na criança, deve-se aguardar entre 5 a 7 minutos para realizar a leitura do mesmo.
- (C) Considera-se febre a temperatura axilar acima de 37,2° C.
- (D) Considera-se febre alta a temperatura axilar de 37,5° C.
- (E) As causas mais comuns de febre são as infecções, por excesso de calor ambiental ou por interferência na função do centro termo regulador.

20. Conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), é correto afirmar que:

- I - É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- II - O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
- III - Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
- IV - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

21. Quanto à IRA (Infecção Respiratória Aguda), assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Os sinais gerais de má ventilação, ou seja, batimento de asas de nariz, cianose, agitação e gemido expiratório apontam para a gravidade de um quadro respiratório.
- () Considera-se taquipnéia quando a frequência respiratória é maior ou igual a 60 mpm, em uma criança de 2 meses.
- () A desnutrição, vacinações incompletas, baixo peso ao nascer e ausência de escolaridade materna, são alguns dos fatores de risco para mortalidade por infecção respiratória aguda.
- () A disseminação das infecções respiratórias agudas se dá principalmente por intermédio das mãos, secreções oculares, nasais ou salivas.
- () A febre é um bom sinal preditivo de pneumonia.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) V – V – V – V – V.
- (E) V – V – V – F – V.

22. Associe os marcos de desenvolvimento da criança, com a idade correspondente:

- (1) 1 a 2 meses.
 - (2) 3 a 4 meses.
 - (3) 5 a 6 meses.
 - (4) 7 a 9 meses.
 - (5) 10 a 12 meses.
- () já fica sentado sem apoio.
 - () engatinha ou anda com apoio.
 - () vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro.
 - () responde ao sorriso.
 - () de bruços, levanta a cabeça e ombros.

O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- (B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (C) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale a **INCORRETA**.

- (A) A doença cardiovascular representa hoje no Brasil a maior causa de mortes.
- (B) Um dos pilares da prevenção cardiovascular são hábitos de vida saudáveis.
- (C) A orientação para ingestão de álcool é: não mais que 2 doses por dia para os homens, e não mais que 1 dose por dia para mulheres.
- (D) A dieta ideal para paciente com hipertensão deve ser pobre em sódio e potássio.
- (E) Existe uma clara associação entre peso e risco cardiovascular.

24. **NÃO** se inclui nos sintomas clássicos de diabetes, ditos "quatro P's":

- (A) poliúria.
- (B) polifagia.
- (C) perda involuntária de peso.
- (D) polidipsia.
- (E) proteinúria.

25. A equipe de saúde deve atuar de forma integrada na abordagem da avaliação de risco cardiovascular, medidas preventivas primárias e atendimento à hipertensão arterial e diabetes melito. É atribuição do Técnico de Enfermagem, **EXCETO**:

- (A) Capacitar os agentes comunitários em atividades educativas, ou em grupo, com pacientes hipertensos ou diabéticos e supervisionar suas atividades.
- (B) Agendar consultas e reconsultas médicas e de enfermagem para os casos indicados.
- (C) Encaminhar as solicitações de exames complementares para serviços de referência.
- (D) Verificar os níveis de pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
- (E) Registrar as anotações devidas em ficha clínica.

26. Considere as afirmações referentes aos tipos de diabetes:

- I - O tipo de diabetes mais freqüente é o diabetes tipo 1.
- II - A expressão "tipo 2" é usada para designar uma deficiência relativa de insulina.
- III - Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, permanecendo geralmente no pós-parto em grande parte dos casos.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

27. Em relação às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) podemos afirmar que, **EXCETO**:

- (A) A relação sexual durante a menstruação aumenta o risco de transmissão do HIV numa relação heterossexual.
- (B) Os estudos demonstram que o uso do preservativo masculino pode reduzir o risco de transmissão do HIV e de outras DSTs em até 95%.
- (C) Embora o HIV tenha sido isolado de vários fluidos corporais que contenham células inflamatórias, somente o contato com o sangue, sêmen, secreções vaginais, saliva e leite materno contaminados têm sido implicados como fontes de infecção desse vírus.
- (D) A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via parenteral e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível.
- (E) Os tipos de Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico, quando associados a outros cofatores, têm relação com o desenvolvimento das neoplasias intra-epiteliais e do câncer invasor do colo do útero, da vulva, da vagina e da região anal.

28. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeira) e **F** (falsa) no que se refere à Biossegurança:

- () O álcool etílico (70%) tem baixa toxicidade, é indicado para desinfecção de nível intermediário ou médio e deve ser utilizado por fricção, em três aplicações com secagem espontânea e tempo total de exposição de 10 minutos.
- () O Hipoclorito de Sódio deve ser utilizado para desinfecção de superfícies, artigos de inaloterapia e oxigenoterapia não-metálicos, entre outros.
- () Anti-séptico é um germicida para uso em pele, evitando-se as mucosas.
- () Os testes biológicos são os indicadores utilizados para o controle da esterilização. A frequência destes testes deve ser mensal.
- () Os métodos de esterilização poderão ser físicos, químicos ou físico-químicos.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – V – F.

29. Considere as afirmativas abaixo quanto às atribuições do Técnico de Enfermagem em relação às atividades de controle da Tuberculose da Rede Básica e na Estratégia de Saúde da Família:

O Técnico de Enfermagem:

- I - convoca os comunicantes para a consulta médica.
- II - realiza ações educativas junto à comunidade.
- III- participa da programação e avaliação das ações.
- IV - identifica os sintomáticos respiratórios em visita domiciliar na comunidade e na Unidade Básica de Saúde.

Qual é a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

30. A Dengue constitui-se, no momento, em um grave problema de saúde pública no Brasil e na maioria dos países tropicais, onde as condições ambientais favorecem a proliferação do vetor.

Qual das afirmativas abaixo está correta?

- (A) Após um período de incubação variando, em média, de 5 a 8 dias, a Dengue pode evoluir para uma de suas formas clínicas.
- (B) A Dengue ainda não é uma doença de notificação compulsória no Brasil.
- (C) A anamnese no caso da Dengue não constitui fator importante na consulta e sim o exame físico geral do paciente.
- (D) Orientar o paciente a não ingerir líquidos, para evitar que se engasgue.
- (E) É importante orientar a comunidade sobre o controle dos vetores, mesmo sabendo que só 10% dos focos do mosquito estão situados dentro das habitações, ou no peridomicílio.