

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 01/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 13 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (Internação Pediátrica)

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2012 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 13

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Pediátrica)

01.	C	11.	A	21.	D	31.	B
02.	E	12.	E	22.	D	32.	C
03.	D	13.	D	23.	C	33.	A
04.	D	14.	B	24.	B	34.	D
05.	A	15.	D	25.	C	35.	E
06.	A	16.	A	26.	D	36.	B
07.	A	17.	E	27.	B	37.	C
08.	C	18.	C	28.	C	38.	E
09.	E	19.	D	29.	E	39.	B
10.	B	20.	E	30.	C	40.	A



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar banheiros nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.7 do Edital de Abertura).
- 11 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Sinais Vitais são aqueles sinais que evidenciam as alterações da função corporal e, geralmente, manifestam-se

- (A) na temperatura corporal, no nível respiratório, na pressão arterial média e na dor.
- (B) na temperatura corporal, na frequência respiratória, na pressão sanguínea e na oximetria.
- (C) na temperatura corporal, no pulso, no nível respiratório e na pressão sanguínea.
- (D) no pulso, no nível respiratório, na dor e na oximetria.
- (E) na oximetria, na temperatura corporal, no pulso e na pressão sanguínea.

02. A apresentação do frasco ampola de Cefuroxima é de 750mg. Prescreve-se 600mg endovenoso dessa substância de 8/8 horas. O pó deve ser reconstituído em 10ml de água destilada. A dose prescrita deve ser rediluída em bureta, num volume de 20ml de soro glicosado 5% e infundida em 30 minutos. O volume da dose a ser administrada e o gotejo da diluição para infusão devem ser respectivamente

- (A) 4,5 ml e 56 mgts/min.
- (B) 6,0 ml e 28 mgts/min.
- (C) 6,0 ml e 56 mgts/min.
- (D) 8,0 ml e 28 mgts/min.
- (E) 8,0 ml e 56 mgts/min.

03. Uma solução parenteral composta por soro glicosado 5% 500ml, NaCl 20% 4,5ml e KCl 10% 2,5ml deverá ser administrada em bomba de infusão contínua, durante 24 horas. O gotejo a ser infundido em mgts/min é

- (A) 19.
- (B) 20.
- (C) 20,8.
- (D) 21,1.
- (E) 22.

04. Considere as afirmações abaixo sobre higiene corporal.

- I - O momento do banho serve como estimulação sensorial e afetiva para a criança, podendo também, nesse momento, se observar lesões ou anormalidades na pele.
- II - A higiene da criança hospitalizada é um cuidado básico de enfermagem, que objetiva prevenir doenças, recuperar a saúde e propiciar conforto e bem-estar à mesma.
- III- O sabonete ou degermante utilizado no banho pode desencadear a diminuição no pH da pele, interferindo na proteção fisiológica, alterando a composição da flora bacteriana.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

05. No que diz respeito à dermatite amoniacal, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A troca de fraldas poderá ser feita até 1 vez/turno, desde que o períneo seja higienizado com clorexidina degermante.
- () A região perineal deve ser mantida seca.
- () A troca de fraldas deve ser feita após cada micção ou evacuação.
- () É definida como uma afecção cutânea na região coberta pelas fraldas.
- () No tratamento deverá ser utilizado antibiótico tópico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) V – F – V – V – F.

06. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), legalizado em 1990, pela Lei Federal nº 8069, estabelecendo direitos com relação à saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As instituições hospitalares estão desobrigadas do fornecimento de declaração de nascimento.
- (B) Os casos de maus-tratos ou de suspeita de maus-tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.
- (C) Os registros hospitalares das crianças e dos adolescentes deverão ser mantidos pelo prazo de dezoito anos.
- (D) A vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- (E) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável.

07. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, relacionadas ao aleitamento materno.

- () É completo, do ponto de vista nutricional, e adequado às necessidades da criança nos 6 primeiros meses de vida.
- () Propicia momentos de intimidade e de plena afetividade entre mãe e bebê.
- () Proporciona contração uterina mais lenta, pelo aumento da ação hormonal da ocitocina.
- () A digestão do leite materno dá-se de forma mais lenta e complexa em relação ao leite de vaca.
- () A alternância dos seios em cada mamada não é necessária, pois não há diferença na composição do leite.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – F – V – V – F.

08. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a cuidados de enfermagem na administração da dieta por sonda em crianças.

- (A) Pode ser administrada em bomba de infusão para que se faça um controle rigoroso do volume, promovendo assim uma redução da distensão abdominal.
- (B) Deve-se conferir composição, volume e temperatura antes de administrá-la.
- (C) Deve-se observar cianose, náuseas, febre, distensão abdominal, vômito e sudorese.
- (D) Deve-se lavar a sonda após a administração da dieta.
- (E) Deve-se manter a criança em decúbito semi-fowler ou Fowler.

09. Considere as afirmações abaixo sobre a técnica de preparo do corpo após a morte.

- I - Deve-se colocar o corpo na forma anatômica, protegê-lo com biombo, tamponar orifícios e higienizá-lo.
- II - Deve-se identificar o paciente e realizar as anotações pertinentes no prontuário e no relatório de enfermagem.
- III - Deve-se elevar a cabeça com travesseiro, objetivando a prevenção de alterações na coloração da pele.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. A parada cardiorrespiratória pode ser definida como ausência de esforço respiratório, pulso palpável e resposta negativa a estímulos. Como sinais precoces de sofrimento cardiorrespiratório em pediatria tem-se bradi ou taquicardia, _____, ritmo cardíaco irregular, _____, estridor, _____, palidez e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) hipertermia – moteamento – *gasping* – agitação
- (B) hipotermia – cianose – *gasping* – diminuição do nível de consciência
- (C) hipotermia – rubor – taquipneia – agitação
- (D) hipertermia – cianose – bradipneia – diminuição do nível de consciência
- (E) hipotermia – rubor – taquipneia – letargia

11. Considerando algumas patologias neurológicas que ocorrem com relativa frequência na pediatria, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Hidrocefalia
 - (2) Meningomielocele
 - (3) Encefalite
 - (4) Meningite
 - (5) Distúrbios Convulsivos
- () Distúrbio convulsivo e disfunção do sistema elétrico-encefálico.
- () Processo inflamatório do SNC que produz alteração da função de várias partes do encéfalo.
- () Situação em que as meninges e a medula são projetadas para fora do canal vertebral.
- () Processo inflamatório que afeta as meninges, podendo ser causado por diversos agentes.
- () Desequilíbrio na produção e absorção de liquor.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
- (B) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- (C) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

12. As alternativas abaixo correspondem aos sinais e sintomas de hidrocefalia na criança, **EXCETO**:

- (A) Cefaleia.
- (B) Letargia.
- (C) Alterações de pupila.
- (D) Vômitos.
- (E) Mioclonia.

13. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a Regulamentação do exercício da Enfermagem. As afirmativas abaixo referem-se a essa lei, **EXCETO**:

- (A) A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa da mesma.
- (B) O exercício da atividade de Enfermagem, respeitados os graus de habilitação, só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da região em que atua.
- (C) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio-técnico, assistindo o Enfermeiro nas atividades de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
- (D) Ao Técnico de Enfermagem cabe executar ações como consultoria, auditoria e emissão de pareceres sobre matérias de Enfermagem.
- (E) O exercício da Enfermagem é livre em todo o território nacional, desde que respeitadas as disposições legais, sendo exercidas privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira.

14. No cuidado de enfermagem ao _____ hospitalizado, como medidas de prevenção de acidentes, podemos citar o uso de _____ no leito e o transporte _____ do paciente da cama para a maca ou cadeira de rodas, e vice-versa.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) recém-nascido – protetor de berço – rápido
- (B) paciente – grades – seguro
- (C) paciente – travesseiro – seguro
- (D) lactente – protetor de berço – confortável
- (E) lactente – grades – rápido

15. Com relação à coleta de material para exames, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A coleta de material para coprocultura deve ser realizada com material estéril.
- (B) Quando a coleta de líquor, por punção lombar, é realizada com o paciente em decúbito lateral, a cabeça deve estar fletida sobre o tórax, e os membros inferiores fletidos sobre o abdome.
- (C) Após a punção lombar para coleta de amostra de líquor, é indicado manter o paciente em decúbito horizontal por algumas horas, prevenindo cefaleia, tontura e vômitos.
- (D) Considera-se o horário de início da coleta de urina de 24h o momento em que é armazenada a primeira micção.
- (E) A coleta de urocultura por saco coletor deve ser precedida de higiene perineal. Caso não se obtenha diurese em 30 minutos, deve ser realizada nova higiene e colocado um novo saco coletor.

16. Um importante cuidado de enfermagem relacionado à coleta de amostras é

- (A) após a punção lombar, avaliar as reações da criança, comunicando e registrando qualquer alteração.
- (B) posicionar a criança em decúbito lateral para a realização da punção suprapúbica.
- (C) após a coleta de sangue arterial, pressionar firmemente o local por, no mínimo, 20 minutos.
- (D) realizar higiene rigorosa do períneo antes da coleta de amostra de urina para Exame Qualitativo de Urina (EQU).
- (E) realizar coletas de urocultura com saco coletor, mesmo em crianças com controle esfíncteriano.

17. Considere as afirmações abaixo sobre sono e repouso.

- I - O sono é o momento de reorganização funcional do sistema nervoso e garante o equilíbrio físico e mental da criança.
- II - A privação de sono gera na criança comportamento irritadiço, tenso e redução da concentração.
- III- O sono pode ser estimulado com jogos brandos, leitura em voz alta ou com uma canção suave.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Quanto aos cuidados na obtenção de acesso venoso periférico, é correto afirmar que

- (A) a mãe deve ser convidada a retirar-se da sala de procedimentos no momento da venopunção.
- (B) se deve lavar as mãos antes do procedimento e usar luvas estéreis.
- (C) se deve fazer a antisepsia do local de punção seguindo a direção da corrente sanguínea.
- (D) se deve evitar a realização de garroteamento do membro a ser puncionado através de compressão manual da área acima do local de punção.
- (E) a utilização de talas na imobilização de extremidades está contraindicada pelo risco de prejudicar a perfusão periférica.

19. Quanto aos cuidados de enfermagem na manutenção do Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC), é correto afirmar que

- (A) se deve manter o cateter sempre com soroterapia a pelo menos 10ml/h, em bomba de infusão.
- (B) podemos utilizar seringas de 1 até 10ml para infundir medicamentos no cateter.
- (C) é indicada a infusão de hemoderivados em cateteres de 2 French.
- (D) não devem ser feitas novas punções no membro que está com o cateter.
- (E) o cateter, em caso de obstrução, deve ser retirado, e o enfermeiro presente deve ser informado.

20. Considere as afirmações abaixo relacionadas a pacientes portadores de problemas respiratórios do trato superior.

- I - Tanto na prevenção quanto no tratamento da otite média, é importante oferecer a alimentação à criança em decúbito elevado.
- II - É importante que se adotem medidas para evitar a disseminação dos problemas respiratórios, que ocorrem por meio das secreções.
- III- O resfriado comum pode evoluir para uma pneumonia viral grave.
- Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

21. Sobre as ações de enfermagem no cuidado a pacientes portadores de problemas respiratórios do trato inferior, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a verificação dos sinais vitais deve ser frequente.
 (B) a criança deve ser mantida em decúbito elevado.
 (C) as secreções devem ser aspiradas para se garantir a permeabilidade das vias aéreas.
 (D) se deve oferecer alimento por via oral com mais cuidado durante episódios de taquipneia.
 (E) se deve observar atentamente possíveis sinais de insuficiência respiratória.

22. No que se refere às ações que podem contribuir para o processo de humanização hospitalar do cuidado em pediatria, considere os itens abaixo.

- I - Possibilitar que a criança traga consigo seu brinquedo preferido ou objeto que lembre um ambiente familiar.
- II - Incentivar o envolvimento da família no cuidado durante a hospitalização, possibilitando o processo de desresponsabilização da equipe em relação aos cuidados à criança.
- III- Fornecer espaço para recreação e profissional habilitado para desenvolver atividades recreativas, assim como material didático-pedagógico para o desenvolvimento de atividades lúdicas e escolares.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

23. A sequência ideal para verificação dos sinais vitais nas crianças pequenas é

- (A) pressão arterial, temperatura, respiração e batimentos cardíacos.
 (B) pressão arterial, respiração, temperatura e batimentos cardíacos.
 (C) respiração, batimentos cardíacos, temperatura e pressão arterial.
 (D) respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial e temperatura.
 (E) batimentos cardíacos, respiração, temperatura e pressão arterial.

24. Considere a verificação da pressão arterial em pediatria. Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) A pressão arterial é composta de pressão arterial sistólica, que indica o grau de resistência dos vasos sanguíneos, e pressão arterial diastólica, a qual demonstra o estado do coração, das artérias e das arteríolas.
 (B) Não é usual a verificação rotineira em crianças, uma vez que a pressão arterial varia muito na infância.
 (C) O tamanho do manguito não influencia os valores obtidos.
 (D) O método da palpação é o mais utilizado em pediatria.
 (E) Não é necessário, ao repetir a mensuração, desinsuflar totalmente o manguito para aliviar a pressão.

25. No que se refere aos cuidados de enfermagem para a criança em drenagem de tórax, considere os procedimentos abaixo.

- I - Trocar o curativo da inserção do dreno a cada 48 horas, com soro fisiológico (SF) 0,9% e gaze estéril.
- II - Realizar a desinfecção da extensão do dreno de tórax com álcool 70%, duas vezes ao dia.
- III- Efetuar a massagem do dreno (tipo ordenha, no sentido do dreno para o frasco) no mínimo a cada 6 horas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

26. Dentre os cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia infantil, destacamos a observação das características do curativo, como sujidade e presença de _____. Caso não haja secreções e drenos, o curativo deverá ser trocado somente após _____ horas ou conforme a rotina da instituição. Na troca, deve-se observar as características da incisão, como cor, temperatura, cicatrização, presença de _____ e edema no local.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) flebite – 48 horas – secreção
- (B) secreção – 24 horas – dor
- (C) secreção – 12 horas – dor
- (D) sangramento – 48 horas – secreção
- (E) sangramento – 24 horas – calor

27. No que se refere à aspiração das vias aéreas superiores em pediatria, assinale os itens abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Consiste na remoção do excesso de secreção existente na cavidade oral, nasal, nasofaringe e traqueia.
- () Calcula-se a extensão do cateter medindo-se duas vezes a distância entre a ponta do nariz e o trágus da criança.
- () A criança lactente é posicionada em decúbito semi-elevado, num ângulo de 30°, e as crianças pré-escolar e escolar ficam semi-sentadas.
- () O aspirador é ligado e o látex é pinçado com os dedos até que se faça a introdução do cateter.
- () Cada aspiração não deve ultrapassar 20 segundos, sendo necessário um intervalo de cinco minutos entre uma aspiração e outra.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – F – V – F – F.
- (E) V – F – F – V – V.

28. O tempo de aspiração das vias aéreas superiores não deve ultrapassar _____ segundos, e o intervalo entre uma e outra aspiração deve ser de _____ a _____ minutos.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 03 – 05 – 15
- (B) 05 – 05 – 15
- (C) 10 – 01 – 03
- (D) 10 – 01 – 05
- (E) 10 – 03 – 05

29. No que se refere às anotações de enfermagem, considere as afirmações abaixo.

- I - Quanto ao aspecto biológico, devem conter informações sobre alimentação, sono e repouso, eliminações, sinais e sintomas.
- II - Sobre o aspecto psicológico, deve-se incluir as alterações do estado de humor, disposição, irritabilidade, apatia e agressividade.
- III- Em relação ao aspecto social, registra-se o relacionamento com os outros pacientes, com a equipe de saúde, a participação em atividades recreativas e atitudes em relação à visita de familiares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

30. Assinale **V** (verdadeiro), ou **F** (falso), em relação aos dados biométricos da criança.

- () Sua verificação é um procedimento de rotina, mas de importância para avaliar o crescimento da criança.
- () O peso é a medida do desenvolvimento muscular e esquelético, devendo ser avaliado a partir do primeiro ano de vida.
- () Os perímetros abdominal, cefálico e torácico são medidas que permitem identificar possíveis alterações no crescimento da criança.
- () A estatura é uma medida importante para a avaliação do desenvolvimento da criança e de seu estado nutricional.
- () Para medir o perímetro cefálico, a fita métrica deve ser colocada na protuberância occipital e acima da linha das sobrancelhas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) F – V – V – V – F.

31. Considere o quadro abaixo, relacionado a controle hídrico.

Nome da paciente: Maria Idade: 3 anos – Turno da Tarde						
Hora	Líquidos Administrados			Líquidos Eliminados		
	Via Oral	Soroterapia	Outros	Diurese	Vômito	Outros
13	-	20	-	200 ml	-	-
14	120ml	20	-	-	-	-
15	-	20	-	-	85 ml	-
16	-	20	Sangue 80 ml	-	-	-
17	-	20	-	-	-	Coleta de sangue 2,5 ml
18	200ml	20	-	-	-	-
Total						

É correto afirmar que o balanço hídrico parcial é

- (A) -232,5ml.
- (B) +232,5ml.
- (C) -287,5ml.
- (D) +520ml.
- (E) +807,5ml.

32. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda, relacionando os instrumentos com seus respectivos objetos de mensuração.

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (1) Balança | () Estatura |
| (2) Antropômetro | () Pressão arterial |
| (3) Esfigmomanômetro | () Temperatura |
| (4) Termômetro | () Peso (a massa corporal) |
| (5) Oxímetro | () Saturação de oxigênio |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (D) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
- (E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.

33. Com relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Oferta-se oxigênio ao paciente quando a oxigenação do sangue é insuficiente.
- (B) Efetua-se administração de vapor, a fim de liquefazer as secreções espessas, para melhorar a sua expectoração.
- (C) Há transformação de um medicamento em pequenas partículas que formam névoa.
- (D) Mede-se saturação de oxigênio nos tecidos através da coleta de sangue arterial.
- (E) É feita remoção do excesso de secreções das vias aéreas superiores através de um cateter nasal.

34. Considere as afirmações abaixo sobre diarreia em crianças.

- I - A diarreia é um sinal que pode resultar de distúrbios que comprometem a digestão, a absorção e a secreção, ocorrendo alterações no transporte de água e eletrólitos do trato digestivo.
- II - O único fator que predispõe uma criança à diarreia é a falta de água potável.
- III- A administração das soluções de reidratação oral (SRO) pode ser via gastrostomia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



35. Com relação à diarreia na infância, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) se deve incentivar, caso a criança esteja sendo amamentada, a manutenção do aleitamento materno.
- (B) o controle hídrico deve ser rigoroso, com realização do balanço da ingesta e da excreta.
- (C) se deve evitar o uso de lenços umedecidos com álcool sobre a pele escoriada pelas fezes diarreicas.
- (D) os sinais de desidratação que podem ser encontrados são débito urinário diminuído, pele fria e fontanela deprimida.
- (E) a pesagem diferencial de fraldas não entra no balanço hídrico.

36. A pediculose tem como manifestação clínica

- (A) vesículas tensas com líquido transparente.
- (B) prurido intenso e reação inflamatória local, com risco de infecção secundária.
- (C) placas brancas não removíveis, semelhantes a coágulo de leite nas mucosas.
- (D) vermelhidão da mucosa (cor de amora), com presença de placas esbranquiçadas.
- (E) manchas espessas aderidas, amareladas, descamativas e oleosas.

37. Quais dos fatores abaixo contribuem para precipitar a violência de pais contra os filhos?

- (A) Desemprego, problemas psicológicos e falta de maturidade emocional.
- (B) Sexo da criança, uso de drogas e estado civil dos pais.
- (C) Alcoolismo, desemprego e baixa autoestima.
- (D) Estado civil dos pais, problemas psiquiátricos e obesidade.
- (E) Obesidade, tabagismo e etilismo.

38. Em relação às finalidades do curativo, considere os itens abaixo.

- I - Evitar contaminação das feridas limpas.
- II - Facilitar a cicatrização e circulação local.
- III- Absorver secreções e facilitar drenagens.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III.

39. Com relação a curativos e feridas, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro), ou **F** (falso).

- () Ferida asséptica é aquela não contaminada, por exemplo, a ferida operatória.
- () Os fatores que afetam a cicatrização normal são idade, sexo, nutrição, condições de vascularização, edema e inflamação do local.
- () A cicatrização pode acontecer por aproximação de superfícies, não necessitando de grande quantidade de tecido de granulação para fechar o ferimento.
- () Antissépticos são substâncias químicas capazes de inibir o crescimento e a proliferação dos germes.
- () O curativo fechado é indicado nas incisões limpas e secas, deixando-se a ferida exposta.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – V – V.

40. Sobre a retirada de pontos, é correto afirmar que

- (A) eles são retirados do 7º ao 10º dia de pós-operatório, somente com prescrição médica.
- (B) o paciente pode ser orientado a retirar os pontos após o 5º dia de pós-operatório, no seu domicílio.
- (C) eles são retirados após 30 dias de pós-operatório, não sendo necessária prescrição médica.
- (D) eles são retirados após o 12º dia, somente com prescrição da enfermeira.
- (E) são retirados após o 20º dia, não sendo necessária prescrição médica.