



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 03/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 15 – ENFERMEIRO (Internação Clínica-Adulto)

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.



FAURGS

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 15

ENFERMEIRO (Internação Clínica - Adulto)

01.	E	11.	A	21.	A
02.	B	12.	B	22.	E
03.	C	13.	B	23.	C
04.	C	14.	ANULADA	24.	C
05.	E	15.	D	25.	B
06.	D	16.	C		
07.	D	17.	A		
08.	A	18.	D		
09.	ANULADA	19.	C		
10.	C	20.	B		

INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA contém **25** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Sabendo-se que as úlceras de pressão (UP) surgem quando a pressão aplicada à pele, em um determinado período de tempo, é maior do que a pressão de fechamento capilar normal, considere os fatores abaixo.

- I - perfusão tissular diminuída
- II - estado nutricional diminuído
- III- idade avançada

Quais constituem fatores de risco para o desenvolvimento de UP?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

02. A hipervolemia é uma condição secundária a um aumento no conteúdo corporal total de sódio, o que, por sua vez, leva a um aumento na água corporal total. Uma de suas causas pode estar relacionada à diminuição dos mecanismos homeostáticos responsáveis pela regulação do equilíbrio hídrico, presente em patologias como a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal e a cirrose hepática. As manifestações clínicas citadas abaixo constituem características da hipervolemia, **EXCETO**

- (A) distensão das veias do pescoço.
- (B) bradicardia.
- (C) aumento da pressão arterial.
- (D) aumento da pressão venosa central.
- (E) estertores pulmonares.

03. A hipoglicemia é uma das complicações agudas do diabetes, sendo uma situação de urgência comum entre pacientes internados e em uso de insulina. A identificação precoce de suas manifestações clínicas, pelo enfermeiro, é determinante no sucesso de seu tratamento. Na hipoglicemia branda, à medida que o nível sanguíneo de glicose diminui, o sistema nervoso simpático é estimulado, resultando em uma elevação da adrenalina. No que se refere a esse quadro, considere os sinais abaixo.

- I - sudorese
- II - taquicardia
- III- convulsão

Quais podem ser apontados como característicos da hipoglicemia branda?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

04. De acordo com a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), "[...] humanizar é ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais". No que se refere à Política Nacional de Humanização (PNH), considere os itens abaixo.

I - Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.

II - Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

III- Estímulo ao trabalho em equipes profissionais, fortalecendo sua autonomia como grupo.

Quais estão de acordo com os princípios norteadores da PNH?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

05. Considere as afirmações abaixo no que se refere a Diagnósticos de Enfermagem.

I - O diagnóstico de enfermagem é baseado em uma classificação diagnóstica da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA) e foi implantado no Brasil na década de 90.

II - O diagnóstico de enfermagem pode cooperar positivamente para o aumento da autonomia dos enfermeiros, promovendo o foco na ciência clínica.

III- O diagnóstico de enfermagem aparece em três contextos: como processo de raciocínio diagnóstico, como sistemas de classificação e como uma das etapas do processo de enfermagem.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

06. As abordagens clássicas que enfocam o comportamento classificam a liderança em estilos. Assinale a alternativa que apresenta os três estilos dessas abordagens sobre liderança.

- (A) centralizador – democrático – indiferente
- (B) centralizador – incentivador – facilitador
- (C) autocrático – incentivador – *laissez-faire*
- (D) autocrático – democrático – *laissez-faire*
- (E) dinâmico – empreendedor – inovador

07. O processo de avaliação de desempenho profissional pressupõe um sistema formal, provido de objetivos bem definidos e de adoção de método coerente com a política e a filosofia institucional.

Considere as afirmações abaixo no que se refere à avaliação de desempenho.

I - O conhecimento do potencial humano e a obtenção de subsídios para o desenvolvimento desse potencial podem ser adquiridos através da avaliação de desempenho.

II - A avaliação de desempenho compreende a análise de aspectos atitudinais e técnicos, como o comportamento no trabalho, o conhecimento, as competências, as habilidades, a produtividade, a eficiência e a eficácia do avaliado.

III- Através da avaliação de desempenho, podemos identificar possíveis dissonâncias ou carências de treinamento, tendo como finalidade promover o crescimento do profissional avaliado e não o do avaliador.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

08. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

I - É um direito do profissional de enfermagem participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e de remuneração.

II - É um dever do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, sem exceção.

III- É um dever do profissional de enfermagem proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de enfermagem.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

09. O diagnóstico de enfermagem mais adequado a um paciente que é internado apresentando neutropenia febril pós-quimioterapia é

- (A) proteção ineficaz.
- (B) termo-regulação ineficaz.
- (C) controle ineficaz do regime terapêutico.
- (D) risco para disfunção neurovascular periférica.
- (E) risco para infecção.

10. No que se refere a paciente com trombose venosa profunda em membro inferior, recém-diagnosticada, considere as recomendações abaixo.

- I - Manter repouso com membros inferiores elevados.
- II - Estimular a mobilização do membro afetado.
- III- Vigiando alterações do padrão respiratório.
- IV - Manter o membro afetado pendente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

11. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o diagnóstico de enfermagem à respectiva necessidade humana básica afetada.

- 1 - segurança física/meio ambiente
- 2 - auto-estima
- 3 - percepção dos órgãos do sentido
- 4 - regulação vascular
- 5 - alimentação
- 6 - regulação neurológica

- () proteção alterada
- () deglutição prejudicada
- () débito cardíaco diminuído
- () dor crônica
- () negligência unilateral
- () distúrbio da imagem corporal

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 5 - 4 - 3 - 6 - 2.
- (B) 1 - 6 - 4 - 5 - 2 - 3.
- (C) 2 - 4 - 1 - 3 - 6 - 5.
- (D) 2 - 6 - 1 - 3 - 4 - 5.
- (E) 5 - 6 - 4 - 1 - 3 - 2.

12. Assinale a alternativa correspondente a um cuidado **INADEQUADO** para com um paciente hipertenso, cardiopata, com queixas de dispnéia e apresentando edema importante em membros inferiores.

- (A) Vigiar padrão respiratório.
- (B) Manter repouso no leito, com membros inferiores elevados.
- (C) Posicionar o paciente ereto, com membros inferiores pendentes.
- (D) Realizar ausculta pulmonar, investigando estertores.
- (E) Observar se há presença de tosse com expectoração hemática.

13. Com relação à necessidade humana básica de oxigenação, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Padrão respiratório ineficaz é quando a inspiração e/ou expiração não proporcionam ventilação adequada.
- (B) Confusão, sonolência e gases sangüíneos arteriais anormais são características definidoras do diagnóstico de enfermagem para padrão respiratório ineficaz.
- (C) A alteração da membrana alvéolo-capilar é fator relacionado ao diagnóstico de enfermagem para troca de gases prejudicada.
- (D) Uma disfunção neuromuscular pode ser fator relacionado ao diagnóstico de enfermagem para padrão respiratório ineficaz.
- (E) Dispnéia é uma característica definidora do diagnóstico de enfermagem para padrão respiratório ineficaz e troca de gases prejudicada.

14. Assinale a afirmação correta no que se refere à Esclerose Múltipla.

- (A) É uma doença degenerativa aguda do sistema nervoso central, caracterizada pela ocorrência de pequenas placas de mielinização cerebral e medular.
- (B) A maioria dos pacientes estão na quinta década de vida quando do início dos sintomas.
- (C) A hiper-reflexia (incapacidade de acumular urina) e a hiporreflexia (incapacidade de esvaziamento da bexiga) são problemas urinários pouco frequentes em portadores dessa doença.
- (D) Espasticidade muscular e disfunção sexual são problemas raros em pacientes portadores dessa doença.
- (E) Alguns achados clínicos dessa doença são fadiga, debilidade, torpor, dificuldade de coordenação e perda de equilíbrio.

15. Sabendo-se que a Síndrome Nefrótica resulta de um grupo de doenças glomerulares associadas ao aumento da permeabilidade do glomérulo renal às proteínas, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A perda de proteínas plasmáticas na urina constitui a manifestação primária da doença.
- () A Síndrome Nefrótica causa hiperalbuminemia e, conseqüentemente, redução da pressão osmótica, que leva ao edema generalizado.
- () Entre as causas pós-renais que podem desencadear a Síndrome Nefrótica estão a hipovolemia, a isquemia e a septicemia.
- () A verificação diária do peso e o balanço hídrico não são considerados cuidados de enfermagem importantes para os pacientes com distúrbios renais.
- () A restrição de líquidos e alimentos constitui um importante cuidado de enfermagem para com estes pacientes, sendo necessário explicar a eles e aos seus familiares o motivo de tais restrições, a fim de que se obtenha a adesão ao tratamento.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V – V.
- (C) F – F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – V – F.

16. Sabendo-se que as mãos são as principais vias de transmissão de infecção hospitalar e que sua adequada lavagem é fundamental para a prevenção desse quadro, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Em unidades de alto risco há a necessidade de se remover a flora residente e transitória das mãos; por isso, há necessidade de uso de anti-sépticos. Nas demais unidades basta o uso de água e sabão.
- (B) Microrganismos da flora transitória podem ser facilmente removidos com água e sabão.
- (C) Flora residente compreende microrganismos adquiridos por contato direto com o meio ambiente, os quais contaminam a pele temporariamente e não são considerados colonizantes.
- (D) Na lavagem simples das mãos, o sabão degermante tem ação de destruição ou inibição da reprodução de microrganismos.
- (E) O tempo recomendado para ensaboar e friccionar as mãos durante a lavagem é de, aproximadamente, trinta segundos.

17. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) quanto a recomendações para prevenir as infecções de cateteres centrais.

- () Em caso de suspeita de infecção, limpar o sítio de inserção do cateter com álcool, deixar secar e só então removê-lo.
- () Trocar o cateter central a cada sete dias.
- () Desinfetar as vias de acesso antes da administração de medicamentos e manter o sistema fechado durante a infusão.
- () Lavar as mãos com sabão degermante antes de inserir o cateter central.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – V – F.

18. Considere as afirmações abaixo no que se refere a drenos torácicos.

- I - Os drenos torácicos são inseridos com o objetivo de remover o ar e os líquidos do espaço pleural em situação de pneumotórax, hemotórax e trauma de tórax.
- II - As manifestações clínicas que devem ser observadas, quando da instalação de dreno, são maior angústia respiratória, dor torácica, cianose acentuada, movimentos torácicos assimétricos e presença de enfisema subcutâneo.
- III- O paciente deverá permanecer em decúbito semi-*fowler* para drenar o líquido e, em situação de transporte, o dreno deverá ser pinçado para evitar pneumotórax hipertensivo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as patologias às suas respectivas características.

- 1 - anemia da doença renal
- 2 - anemia aplástica
- 3 - anemia megaloblástica
- 4 - leucemia mielóide
- 5 - leucemia mielocística

- () As células mielóides normais continuam a ser produzidas, mas existe uma preferência por formas imaturas (bastão).
- () Ocorre devido a um discreto encurtamento da sobrevivência da hemácia e à deficiência de eritropoietina.
- () É uma doença causada por deficiência de vitamina B12 e/ou ácido fólico.
- () É uma doença causada pela diminuição das células-tronco da medula óssea.
- () Resulta de um defeito na célula matriz hematopoiética que se diferencia em células mielóides.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (B) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.
- (C) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.

20. Em relação à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O HIV-1 (vírus da imunodeficiência adquirida) é transmitido por meio de líquidos corporais que contêm HIV-1 ou linfócitos T CD4 positivo. Esses líquidos incluem soro, líquido seminal, secreção vaginal, líquido amniótico e leite materno.
- (B) Estima-se que a incidência de HIV positivo em profissionais da saúde que estão expostos a lesão por punção com agulhas seja de 0,3%, sendo que a profilaxia precisa começar após 72 horas de exposição.
- (C) A PCP (Pneumonia por *Pneumocystis carinii*) é a manifestação inicial da SIDA em 60% dos pacientes e apresenta manifestações clínicas como febre, calafrios, falta de ar, tosse, dispnéia e dor torácica.
- (D) O paciente com SIDA apresenta manifestações gastrointestinais como candidíase oral e esofágica e, geralmente, um metabolismo protéico aumentado em relação ao metabolismo lipídico.
- (E) A administração de antiespasmódicos, anticolinérgicos e opióides diminui os espasmos e a motilidade intestinais, nos casos de diarreia, em pacientes com SIDA.

21. Assinale a afirmação correta no que se refere ao uso de medicamentos para tratamento de pacientes com distúrbios vasculares coronarianos.

- (A) Nitratos permanecem como sustentáculo para o tratamento da angina de peito. A nitroglicerina é volátil e inativada pelo calor, pela umidade, pelo ar, pela luz e pelo tempo. O paciente, quando do uso desses medicamentos, pode apresentar efeitos adversos, como rubor, cefaléia, hipotensão e taquicardia.
- (B) Agentes bloqueadores betaadrenérgicos apresentam efeitos que diminuem a carga de trabalho do coração. Os efeitos colaterais que podem advir da administração desses medicamentos incluem bradicardia, constipação e bloqueios atrioventriculares.
- (C) Medicamentos antiplaquetários são administrados para evitar sangramento, o qual compromete o fluxo sanguíneo. Podem ocorrer efeitos colaterais, quando do uso desses medicamentos, tais como agravamento da hiperlipidemia, depressão e fadiga.
- (D) A heparina previne a formação de novos coágulos sanguíneos. O paciente pode apresentar efeitos adversos, quando do uso desse medicamento, tais como vômitos e diminuição do nível de neutrófilos.
- (E) Trombolíticos têm a finalidade de dissolver somente o trombo da artéria coronária e podem provocar efeitos adversos no paciente, tais como hipotensão descontrolada e aumento dos valores de hematócrito.

22. A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve permear as ações de saúde

- (A) na rede hospitalar.
- (B) na rede de atenção básica.
- (C) nos centros de saúde coletiva.
- (D) na rede de atenção básica e nos centros de saúde coletiva.
- (E) em todos os serviços de saúde.

23. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao processo de trabalho em saúde e enfermagem, assinalando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O trabalho em saúde, no qual a enfermagem também se inclui, caracteriza-se como prestação de serviço, fazendo parte do setor terciário da economia.
- () Como a atividade de enfermagem hospitalar organiza-se em equipes, está isenta da divisão social e técnica do trabalho.
- () A divisão social e técnica do trabalho configura relações de desigualdade entre os trabalhadores, nas quais alguns são "superiores" e outros, "inferiores".
- () O processo de trabalho em enfermagem particula- riza-se em subprocessos: cuidar ou assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar, ensinar.
- () Métodos, materiais e equipamentos constituem instrumentos de trabalho do enfermeiro, exceto o saber técnico, por ser intangível.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) F – V – V – V – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) F – F – F – V – V.

24. Considere as afirmações abaixo no que se refere à auditoria em saúde e enfermagem.

- I - Atualmente a auditoria em enfermagem consolida-se tanto no setor público quanto no setor privado.
- II - A atividade de auditoria em enfermagem pode envolver instituições hospitalares, centros de saúde e operadoras de planos de saúde.
- III- Na auditoria em saúde, são aferidos aspectos financeiros, patrimoniais e estruturais, excluindo os aspectos técnicos porque estes são privativos dos profissionais liberais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o tipo de auditoria em enfermagem à sua respectiva característica.

- 1 - Auditoria retrospectiva
- 2 - Auditoria operacional ou recorrente
- 3 - Auditoria parcial
- 4 - Auditoria interna
- 5 - Auditoria contínua

- () Realizada enquanto o paciente está hospitalizado ou em atendimento hospitalar.
- () Limita-se a alguns serviços da instituição.
- () É realizada em períodos determinados, sem sofrer interrupções, iniciando-se cada revisão a partir da anterior.
- () Os dados obtidos não se revertem em benefício direto ao paciente, já que a fonte de consulta é o prontuário no pós-alta hospitalar.
- () Tem como vantagem a maior profundidade dos trabalhos realizados, concorrendo para que haja sugestões ou soluções mais apropriadas.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
- (C) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- (D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.