

EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 19 – ENFERMEIRO (Internação Cirúrgica - Adulto)

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 19

ENFERMEIRO (Internação Cirúrgica-Adulto)

01.	E	11.	C	21.	D
02.	D	12.	D	22.	D
03.	E	13.	B	23.	B
04.	C	14.	A	24.	A
05.	E	15.	C	25.	C
06.	E	16.	E		
07.	B	17.	A		
08.	E	18.	E		
09.	A	19.	C		
10.	A	20.	B		

INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA contém **25** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Após procedimento cirúrgico intratorácico, é necessário um sistema de drenagem intrapleural. O sistema consiste em um ou mais cateteres torácicos (dreno de tórax) mantidos no espaço pleural. O objetivo é retirar líquidos ou gases provenientes do espaço pleural, do espaço mediastinal ou da cavidade do tórax e facilitar a reexpansão do pulmão. Para o adequado funcionamento do sistema de drenagem de tórax, são necessários alguns cuidados de enfermagem. Quanto ao sistema de drenagem de tórax, é correto afirmar que

- (A) o uso de analgésicos opióides não é recomendado para os pacientes com dreno de tórax, devido ao risco de depressão respiratória.
- (B) mudanças de posição do paciente dificultam a drenagem e devem ser evitadas.
- (C) borbulhamento no frasco de selo d'água (coletor) indica o correto funcionamento do sistema de drenagem.
- (D) o principal objetivo dos drenos de tórax é retirar secreção e ar do espaço pleural e, por consequência, manter pressão positiva no interior da pleura para a reexpansão do pulmão.
- (E) a ocorrência de flutuação (onda) no nível líquido do frasco de selo d'água indica permeabilidade do sistema de drenagem.

02. A tireoidectomia total pode ser efetuada como tratamento principal do carcinoma tireóideo, hipertireoidismo ou hiperparatireoidismo. São complicações potenciais desse procedimento

- (A) hipercalcemia e consequente contratura muscular.
- (B) sinal de Trousseau positivo após estímulo (percussão) sobre o nervo facial.
- (C) hiperglicemia e hiperparatireoidismo.
- (D) lesão do nervo laríngeo e edema de glote.
- (E) hipercalcemia sugerida por sinal de Chvostek positivo.

03. Indique a alternativa que **NÃO** apresenta fator de risco para infecção de ferida operatória.

- (A) corpo estranho e tecido desvitalizado
- (B) fatores relacionados com o paciente, como idade, condição nutricional e tabagismo
- (C) fatores relacionados com o procedimento cirúrgico, como duração da cirurgia
- (D) presença de drenos
- (E) técnica anestésica do procedimento cirúrgico

04. Quanto à TVP (trombose venosa profunda), é correto afirmar que

- (A) pacientes submetidos a cirurgias de prótese de quadril têm risco menor de desenvolver TVP, pois a área operada não é próxima à panturrilha.
- (B) pacientes com seqüela de AVC (acidente vascular cerebral) apresentam risco diminuído de TVP no membro afetado pelo transtorno neurológico.
- (C) a mais grave consequência da TVP é a embolia pulmonar.
- (D) a TVP é mais comum no pós-operatório devido à resposta ao estresse cirúrgico e consequente ativação do sistema fibrinolítico, resultando no aumento da coagulação sanguínea.
- (E) a dor na panturrilha suscitada pela dorsiflexão do tornozelo (sinal de Babinski) sugere TVP em pacientes no pós-operatório.

05. A ferida cirúrgica rompe a integridade da pele e sua função protetora. A exposição dos tecidos corporais profundos a patógenos do ambiente coloca o paciente em risco de infecção na ferida operatória. Quanto à cicatrização das feridas cirúrgicas, é correto afirmar que

- (A) a cicatrização é um processo complexo, sendo a fase inflamatória, ou exsudativa, a segunda fase desse processo.
- (B) a terceira fase da cicatrização é a fase de maturação, sendo esta uma fase de curta duração, em que as fibras de colágenos se reorganizam.
- (C) a fase proliferativa ou fibroblástica dura de 24 a 48 horas. Nessa fase, o colágeno é produzido e forma-se o tecido de granulação.
- (D) a cicatrização por segunda intenção (granulação) acontece nas feridas limpas com bordos aproximados.
- (E) feridas limpas cicatrizam com pouca reação tissular.

06. Pessoas que não conseguem se movimentar e ficam sentadas ou acamadas por um longo período, na mesma posição, apresentam feridas denominadas Úlcera de Pressão (UP). Quanto aos cuidados para a prevenção da UP, é correto afirmar que

- (A) a elevação da cabeceira em até 20 graus não aumenta o risco de aparecimento de UP e deve ser recomendada para pacientes com seqüelas neurológicas.
- (B) pacientes paraplégicos devem permanecer o maior tempo possível na cadeira de rodas, utilizando almofadas circulares.
- (C) pacientes obesos têm menor risco para o aparecimento de UP, pois o tecido adiposo maior diminui a pressão do leito sobre as proeminências ósseas.
- (D) massagem com cremes nas proeminências ósseas hiperemiadas diminui a incidência de UP.
- (E) posicionar o paciente em decúbito lateral a 30 graus evita a pressão sobre o trocanter.

07. Quanto às características da úlcera de pressão grau II, é correto afirmar que é

- (A) uma lesão extensa, que envolve o tecido subcutâneo.
- (B) uma lesão que compromete a derme e a epiderme.
- (C) uma lesão caracterizada por um eritema que não esmaece.
- (D) uma lesão com drenagem de secreção purulenta.
- (E) uma lesão que compromete a fáscia muscular.

08. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à encefalopatia hepática.

- () A encefalopatia hepática está relacionada ao acúmulo de amônia e outros metabólitos tóxicos na corrente sanguínea.
- () Dietas ricas em proteínas diminuem o risco de encefalopatia hepática.
- () Os sintomas iniciais da encefalopatia hepática incluem distúrbios motores e alterações mentais leves.
- () A hiperalbuminemia é comum nos pacientes com encefalopatia hepática, sendo o edema seu principal achado.
- () A presença de equimose e epistaxe tem incidência aumentada nos pacientes com encefalopatia hepática devido à deficiência na absorção da vitamina B e das vitaminas hidrossolúveis (A e D).


A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – F – V.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) V – F – F – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

09. Assinale a alternativa que apresenta as complicações mais comuns decorrentes da Nutrição Parenteral Total (NPT).

- (A) pneumotórax – septicemia – hiperglicemia – sobrecarga hídrica
- (B) hemotórax – lesão de pele – hipercolesterolemia – hemorragia
- (C) pneumotórax – infecção cutânea – anorexia – hemorragia
- (D) hemotórax – embolia pulmonar – diminuição de peso – desidratação
- (E) pneumotórax – anorexia – hiperglicemia de rebote – hipercolesterolemia

10. Em relação aos desenhos abaixo, é correto afirmar que



- (A) A representa uma vesicostomia e B representa uma nefrostomia.
- (B) A representa uma cistectomia e B representa uma nefrostomia.
- (C) A representa uma vesicostomia e B representa uma nefrolitotomia.
- (D) A representa uma cistostomia e B representa uma nefrectomia.
- (E) A representa uma cistectomia e B representa uma nefrectomia.

11. Em relação à necessidade de higienização das mãos como forma de prevenir infecções, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a flora cutânea normal consiste em estafilococos coagulase-negativos ou difteróides.
- (B) no ambiente hospitalar, é comum a equipe de saúde portar temporariamente bactérias, como *Staphylococcus Aureos*, *Pseudomonas Aeruginosa* e outros com forte potencial patogênico.
- (C) a lavagem efetiva das mãos exige 10 segundos de escovação, não importando a intensidade da fricção.
- (D) os leitos ungueais e a região entre os dedos são os locais da mão onde existe uma elevada carga bacteriana.
- (E) o uso de agentes antimicrobianos para lavagem de mãos é recomendado quando o paciente está na unidade de terapia intensiva ou quando o paciente está colonizado por bactérias multirresistentes.

12. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao pensamento crítico e ao Processo de Enfermagem.

- () O pensamento crítico estimula a tomada de decisão clínica, ajudando a identificar as necessidades do paciente e a determinar as melhores ações de enfermagem, para solucionar ou minimizar problemas.
- () O pensamento crítico é reflexivo, envolvendo metacognição, avaliação ativa e refinamento do processo de pensamento.
- () Na primeira etapa do processo de enfermagem, o propósito da avaliação de saúde consiste em identificar aspectos do estado físico, psicológico e emocional do paciente que indicam necessidade de cuidado de enfermagem.
- () Na etapa de implementação, são designadas as prioridades para os diagnósticos de enfermagem e especificados os resultados esperados e as prescrições de enfermagem adequadas para atingir os resultados.
- () A evolução do paciente permite ao enfermeiro verificar a sua resposta às prescrições de enfermagem e avaliar em que medida os objetivos foram alcançados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

13. Maria, 55 anos, casada, católica, mãe de dois filhos, procedente de Esteio, interna-se acompanhada pelo esposo para tratamento cirúrgico (osteossíntese) em pseudo-artrose de fêmur esquerdo infectado. A paciente apresenta IMC= 33,2, é lúcida, orientada e comunicativa. Ingere alimentação hipercalórica; utiliza paracetamol 500 mg quatro vezes ao dia. Deambula com auxílio de andador e necessita de auxílio para a realização da higiene corporal. Não realiza atividades físicas. Observa-se a presença de fístula na sua coxa esquerda.

Considerando os dados descritos acima, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) os diagnósticos de enfermagem apresentados a seguir, acerca da paciente Maria.

- () Constipação relacionada à mobilidade diminuída
- () Ansiedade relacionada a crises situacionais
- () Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais relacionada à ingestão excessiva de alimentos
- () Risco de quedas relacionado à deambulação prejudicada
- () *Deficit* no autocuidado: banho/higiene relacionado a presença de fístula

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – V – F – F – V.

14. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à liderança no trabalho.

- () A abordagem contingencial sugere não haver um estilo ideal de liderança para cada situação.
- () O estilo democrático de liderança, em que a crítica é bem-vinda, dá ênfase à coparticipação de todos, possibilitando alternância de comando nas deliberações.
- () O estilo autocrático de liderança, em que a crítica inexistente, caracteriza-se por pouca ou nenhuma coordenação, sendo especialmente adequado quando se buscam soluções alternativas ou criativas.
- () As teorias situacionais e contingenciais focalizam necessidades contextuais, postulando que o tipo de liderança mais eficaz é aquele que se adapta ao momento e às circunstâncias.
- () As teorias contemporâneas, interacionais e transformacionais, retomam a idéia de liderança como um dom inato e contestam veementemente a idéia de que os líderes sejam agentes de mudança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – F – F – F – V.

15. Em relação ao processo de trabalho da enfermagem em âmbito hospitalar, considere as seguintes afirmações.

- I - A gerência de enfermagem atua na intermediação entre a política de saúde produzida pela instituição e a ação em saúde praticada pelos trabalhadores de enfermagem, caracterizando-se como uma posição estratégica.
- II - O processo gerencial da enfermagem, como meio para efetivar a assistência/cuidado, é privativo do administrador do hospital, de forma a reproduzir uma política centrada na produtividade, conforme idealmente é preconizado.
- III - O trabalho gerencial da enfermeira, em uma unidade de internação, consiste na organização do cuidado e da força de trabalho da enfermagem, com foco no paciente internado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Historicamente, a atividade de auditoria data da Antigüidade e foi introduzida pelos administradores de indústrias na área contábil. Posteriormente, a área da saúde introduziu essa prática, com as devidas apropriações. Considere as etapas das ações de saúde a seguir.

- I - planejamento
- II - execução
- III- gerenciamento e avaliação qualitativa dos resultados

Quais dessas etapas a auditoria visa subsidiar?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à Política de Humanização.

- () Proporciona a reunião de usuários e profissionais para resolver problemas eventuais.
- () Constitui uma estratégia de interferência no processo de produção da saúde.
- () Corresponde a um conjunto de estratégias que qualificam a atenção e a gestão em saúde no SUS.
- () Deve ser organizada de forma a ser implementada paralelamente ao SUS, já que é uma política transversal a esse sistema.
- () Implica mudança na cultura de atenção aos usuários e de gestão dos processos de trabalho.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) F – F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – F – F – F – V.

18. Os sentidos da Integralidade **NÃO** são relacionados

- (A) ao ideal de uma sociedade mais justa.
- (B) a um modo de organizar os serviços e as práticas de saúde.
- (C) a atributos das respostas governamentais às necessidades de grupos específicos.
- (D) ao movimento da medicina integral.
- (E) a uma diretriz do SUS, ao lado da universalidade e da centralização das políticas públicas.

19. Marque a alternativa em que é apresentado um objetivo dos cuidados paliativos.

- (A) Estimular a hospitalização para aumentar o conforto de um maior número de pacientes terminais, tratando a dor e outros sofrimentos.
- (B) Envolver a comunidade no cuidado de pacientes terminais.
- (C) Melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida.
- (D) Abreviar o período de sofrimento de pacientes que têm doenças que ameaçam a vida.
- (E) Prolongar, com qualidade, a vida de pacientes, através da prevenção e alívio do sofrimento.

20. Com relação a dor, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) dor é aquilo que a pessoa diz que é, ocorrendo sempre que a pessoa afirmar experimentá-la.
- (B) a experiência sensorial da dor independe da interação entre o sistema nervoso e o ambiente.
- (C) a dor inadequadamente tratada apresenta efeitos lesivos, além do sofrimento que causa.
- (D) o paciente com dor intensa e estresse associado pode ser incapaz de fazer uma respiração profunda e, assim, pode experimentar fadiga aumentada e mobilidade diminuída.
- (E) placebos não devem ser usados para avaliar ou controlar a dor em qualquer paciente, a despeito da idade ou do diagnóstico.

21. Marque a afirmação correta sobre a colecistectomia videolaparoscópica.

- (A) É realizada com uma incisão abdominal.
- (B) É utilizada com sucesso no diagnóstico da colecistite aguda.
- (C) Um dreno de Kehr é exteriorizado na pele para drenagem de líquido serossanguinolento.
- (D) A cavidade abdominal é insuflada com dióxido de carbono, produzindo pneumoperitônio.
- (E) Tem como desvantagem a possibilidade de o paciente apresentar íleo paralítico.

22. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere a cuidados paliativos.

- () Embora a morte, o luto e o pesar sejam universalmente aceitos, os valores, as expectativas e as práticas durante doença grave são construídos histórica e culturalmente.
- () Cuidados paliativos são cuidados necessários no final da vida e têm como objetivo prolongar a vida com alívio dos sintomas.
- () A espiritualidade contém aspectos de religiosidade, mas os dois conceitos não são intercambiáveis.
- () São sinais de iminência de morte: respiração regular com períodos de apnéia, confusão mental e débito urinário diminuído.
- () A esperança persiste durante todos os estágios da doença terminal, mesmo naqueles pacientes com maior aceitação da morte.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) F – F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

23. Marque a alternativa que indica corretamente os estágios do morrer, conforme Kübler-Ross.

- (A) negação – barganha – angústia – pesar – luto
- (B) negação – raiva – barganha – depressão – aceitação
- (C) negação – raiva – barganha – luto – aceitação
- (D) negação – depressão – luto – aceitação
- (E) negação – barganha – aceitação – depressão – angústia

24. Considere as afirmações abaixo sobre distúrbios músculo-esqueléticos.

- I - Uma das indicações da tração cutânea é alinhar e imobilizar fraturas, devendo ser eliminado qualquer fator que venha a reduzir a tração efetiva.
- II - A avaliação do estado neurovascular é essencial para detecção precoce de síndrome compartimental, que ocorre quando existe pressão tecidual aumentada dentro de um compartimento muscular, podendo levar à anóxia e necrose do nervo e do músculo após 2 horas de compressão contínua.
- III- O processo de consolidação óssea de uma fratura segue diferentes estágios. No estágio de calcificação da cartilagem, os minerais são depositados até que o osso esteja firmemente unido.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Considere as afirmações abaixo sobre o paciente que se submete a cirurgia ortopédica.

- I - A atelectasia e a pneumonia são complicações pulmonares comuns e podem estar associadas a uma atividade diminuída ou a um distúrbio musculoesquelético subjacente.
- II - Na artroplastia total de joelho, é importante encorajar a flexão ativa do pé, a cada hora, durante a vigília.
- III- Entre os cuidados pós-operatórios imediatos, visando à prevenção da luxação da prótese de quadril, estão evitar a flexão do quadril em menos de 90°, não elevar a cabeceira do leito em mais de 60° e posicionar a perna operada em abdução.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.