

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 30

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

01.	D	11.	D	21.	D	31.	C
02.	B	12.	B	22.	A	32.	E
03.	E	13.	E	23.	E	33.	D
04.	A	14.	B	24.	B	34.	E
05.	C	15.	C	25.	B	35.	E
06.	B	16.	B	26.	D	36.	C
07.	C	17.	D	27.	A	37.	C
08.	D	18.	E	28.	C	38.	A
09.	A	19.	E	29.	E	39.	E
10.	D	20.	C	30.	D	40.	C



EDITAL Nº 01/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 30 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. A antropometria, que é a realização de exame físico simplificado, é um dos primeiros cuidados com o recém-nascido. Estão incluídos nesse exame:

- (A) peso, comprimento, temperatura, perímetro cefálico e abdominal.
- (B) comprimento, perímetro torácico e cefálico, peso e idade gestacional.
- (C) idade gestacional, peso, comprimento, perímetro abdominal e torácico.
- (D) peso, comprimento, perímetro cefálico, abdominal e torácico.
- (E) peso, comprimento, saturação, perímetro cefálico e torácico.

02. Quais são os dois sinais que, após o nascimento, determinam a necessidade de reanimação e de avaliação de sua eficácia?

- (A) Saturação e frequência cardíaca.
- (B) Respiração e frequência cardíaca.
- (C) Frequência respiratória e saturação.
- (D) Respiração e temperatura.
- (E) Frequência cardíaca e temperatura.

03. Assinale a alternativa que apresenta algumas das manifestações clínicas da hipotermia.

- (A) Hipotonia, taquipneia e sudorese.
- (B) Vasoconstrição, letargia e alcalose.
- (C) Sucção débil, sudorese e apneia.
- (D) Hipertonia, tremores e taquicardia.
- (E) Apneia, queda de saturação de O₂ e hipotonia.

04. Quais são os mecanismos de perda de calor no período neonatal?

- (A) Evaporação, radiação, convecção e condução.
- (B) Evaporação, oxidação, convecção e condução.
- (C) Radiação, condução, convecção e aquecimento.
- (D) Aquecimento, evaporação, convecção e condução.
- (E) Evaporação, radiação, convecção e aquecimento.

05. Nos recém-nascidos, o balanço hídrico deve ser rigoroso, registrando-se perdas, como diurese, sonda gástrica, drenos, e aportes, como medicações, soro, sangue, etc. Nos recém-nascidos mais instáveis, com intervalo de quantas horas esse balanço hídrico deve ser calculado?

- (A) 3 horas.
- (B) 4 horas.
- (C) 6 horas.
- (D) 8 horas.
- (E) 12 horas.

06. A punção venosa deve ser realizada de preferência por dois profissionais. As principais complicações da punção venosa são:

- (A) tromboflebite, sangramento e infiltração.
- (B) infiltração, extravasamento e flebite.
- (C) infecção, sepse e obstrução.
- (D) formação de hematomas, sangramento e flebite.
- (E) edema, prurido e hiperemia.

07. O pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural com o colapso parcial ou total do pulmão afetado. O pneumotórax pode ser classificado em:

- (A) assintomático, sintomático e pleural.
- (B) sintomático, hipertensivo e intercostal.
- (C) assintomático, sintomático e hipertensivo.
- (D) sintomático, pleural e intercostal.
- (E) assintomático, sintomático e intercostal.

08. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao choque hipovolêmico.

- (A) Na desidratação grave por diarreia, vômitos e hemorragia, há queda crítica do débito cardíaco por perda de volume sanguíneo circulante (geralmente maior que 15% da volemia).
- (B) Os resultados do tratamento do choque são melhores quando se utilizam protocolos de tratamento com metas preestabelecidas, sobretudo de restauração ou manutenção de pressão arterial média, débito urinário e saturação venosa central de oxigênio adequada.
- (C) O choque hipovolêmico está entre os 90% dos casos de choque que ocorrem em pediatria, juntamente com aqueles causados por sepse, trauma ou falência cardíaca muito grave.
- (D) No choque hipovolêmico, ocorre redução crítica do retorno venoso ao coração (pré-carga baixa); se a redução ultrapassar a capacidade de compensação por vasodilatação e contração de veias por efeito adrenérgico, o coração para de ejetar.
- (E) Os sinais mais importantes do choque são a taquicardia com os pulsos finos ou de difícil palpação, a perfusão periférica lenta, extremidades frias, alterações do sensorio e oligúria.

09. Em relação à bronquiolite em crianças, é correto afirmar que

- (A) cerca de 60% dos casos são causados pelo vírus sincicial respiratório e, geralmente, os surtos comunitários são mais frequentes no inverno e na primavera.
- (B) é uma infecção virótica autolimitada, mas potencialmente grave, com inflamação e obstrução predominante em vias aéreas superiores de lactentes pequenos, podendo ocorrer até dois anos de idade.
- (C) os fatores de risco estão associados a crianças com idade entre dois e seis anos que não receberam leite materno, imunodeficientes, prematuras extremas e com mãe fumante.
- (D) cerca de 10% dos casos exigem internação hospitalar e, desses, cerca de 30% necessitam internação em terapia intensiva.
- (E) a mortalidade é em torno de 5%, e cerca da metade dos pacientes que tiveram bronquiolite grave apresentarão episódios de broncoespasmo nos anos seguintes.

10. Considere as afirmações abaixo quanto à insuficiência renal aguda em crianças.

- I - Essa síndrome ocorre quando a função renal deteriora-se rapidamente até o nível que impede a homeostase normal.
- II - Causa diversas complicações, como crises hipertensivas, congestão grave, edema pulmonar, acidose e hipocalcemia.
- III- O quadro tende a se normalizar com retorno progressivo da função renal, geralmente com poliúria, em um período de 3 a 10 dias, podendo demorar até quatro semanas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

11. Considere as afirmações abaixo em relação à parada cardiorrespiratória em crianças.

- I - Os principais fatores de risco ou indicativos de risco de parada cardíaca são esforço respiratório grave, cianose ou saturação >90%, alta resposta à dor, pulsos finos e perfusão lenta, trauma grave e oligúria.
- II - A maioria dos casos de parada cardiorrespiratória em crianças é causada por insuficiência respiratória ou choque.
- III- A situação é caracterizada por inconsciência, com ausência de resposta a estímulos, apneia e ausência de pulsos palpáveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Quanto à anafilaxia e reações alérgicas graves, considere as afirmações abaixo.

- I - Urticária ou edema angioneurótico associados são indicadores de quadro clínico de origem alérgica.
- II - Casos graves e não tratados tendem a evoluir para bradicardia, arritmias, edema pulmonar não cardiogênico, convulsões, hipoxemia, acidose grave e parada cardíaca.
- III- Ocorre aparecimento lento e progressivo de quadro de colapso vascular, obstrução respiratória alta ou broncoespasmo, horas depois do contato com agente causal, podendo ser fatal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Com relação a crianças que passam por procedimentos cirúrgicos que exigem preparo psicológico e físico no pré-operatório, observe as afirmações abaixo.

- I - A brincadeira é estratégia eficaz para preparar as crianças, aumentando sua familiaridade com os procedimentos médicos, bem como diminuindo a ansiedade.
- II - A presença dos pais durante a indução da anestesia é permitida em algumas instituições hospitalares. Os benefícios proporcionados por essa técnica podem minimizar a necessidade da pré-medicação e reduzir o conflito que geralmente ocorre com a separação.
- III- A restrição de líquidos e alimentos antes da cirurgia evita a broncoaspiração durante a anestesia; lactentes não devem permanecer sem líquidos, por via oral, por um período prolongado no pré-operatório, para evitar a depletação do glicogênio e a desidratação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

14. Considere as afirmações abaixo quanto aos cuidados pós-operatórios.

- I - A incidência de complicações pós-operatórias graves em crianças saudáveis e submetidas à cirurgia é inferior a 1%; mas, no período de pós-operatório imediato, é essencial a monitoração contínua das condições cardiopulmonares.
- II - A monitorização da saturação do oxigênio, o fornecimento de oxigênio suplementar, a manutenção da temperatura corporal e a promoção do equilíbrio hidroeletrólítico são aspectos importantes do tratamento pós-operatório imediato.
- III- Os sinais vitais são monitorados esporadicamente, e cada sinal é avaliado em termos dos efeitos colaterais da anestesia, choque ou comprometimento da respiração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

15. Assinale a alternativa correta em relação à Ética e à Bioética.

- (A) As informações contidas no prontuário do paciente são de propriedade do paciente e de todos profissionais que prestarem cuidados a ele.
- (B) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, assim como uma postura de pró-atividade são características que estão longe de serem pensadas na ética profissional.
- (C) As informações que os pacientes fornecem, quando de seu atendimento em um hospital, posto de saúde ou consultório privado, assim como os resultados de exames e procedimentos realizados com finalidade diagnóstica ou terapêutica, são de propriedade do próprio paciente.
- (D) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.
- (E) A Bioética aborda problemas de forma original, individual, contemporânea, global e sistemática.

16. No que se refere à assistência ao paciente, assinale a alternativa correta em relação ao exercício profissional de enfermagem.

- (A) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição em qualquer área independentemente de onde ocorra o seu exercício.
- (B) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, realizando orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participando no planejamento da assistência de enfermagem.
- (C) O técnico de enfermagem deve participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau avançado, devendo evitar sua participação na programação da assistência de enfermagem.
- (D) O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento.
- (E) As atividades do técnico de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, podem ser desempenhadas sem a orientação e supervisão do enfermeiro.

17. Em relação aos direitos de crianças e de adolescentes hospitalizados, é correto afirmar que

- (A) a Resolução 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, estabelece que toda criança e adolescente hospitalizados devem, obrigatoriamente, ser acompanhados por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização.
- (B) o Estatuto da criança e do adolescente em seu Art. 7º estabelece que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam exclusivamente um nascimento sadio e harmonioso.
- (C) os hospitais devem identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital do pai, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- (D) as crianças e os adolescentes hospitalizados têm o direito de serem informados sobre sua enfermidade, prognósticos, cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico, quando se fizer necessário.
- (E) os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão obrigatoriamente, em todos os níveis de atendimento, proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou de adolescente.

18. O uso seguro, eficaz e ético de medicamentos exige conhecimento, habilidades e julgamento dos profissionais da saúde, bem como estruturas e sistemas adequados dos ambientes de cuidado. Em relação aos cuidados na administração de medicamentos, é correto afirmar que

- (A) os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos devem ser classificados exclusivamente como erros de prescrição.
- (B) a medida de maior segurança, dentre os fatores potenciais de risco de ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos, é atentar para nomes de medicamentos com sons ou grafia semelhantes aos de outras drogas.
- (C) medicamentos potencialmente perigosos, de alta vigilância, tais como antieméticos e antibióticos, devem ser utilizados de forma criteriosa.
- (D) medicamentos com nomes e embalagens parecidos são uma preocupação em todo ambiente hospitalar. O problema exige atenção e ações corretivas exclusivamente por parte do setor farmacêutico que administra o medicamento ao paciente.
- (E) a manipulação de medicamentos deve ser precedida de higiene correta das mãos e de técnicas assépticas para a respectiva administração. Cada vez que um medicamento for administrado, é necessário ler atentamente o rótulo.

19. Assinale a alternativa que apresenta sinal indicativo de técnica adequada de amamentação.

- (A) Ruídos da língua do bebê.
- (B) Dor na amamentação.
- (C) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- (D) Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
- (E) Boca do bebê bem aberta e o queixo tocando a mama.

20. Quanto à hidratação do recém-nascido (RN), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As perdas hídricas ocorrem basicamente por meio de fezes, da respiração e da pele.
- (B) As perdas hídricas pela pele são as mais importantes no RN pré-termo.
- (C) Para os recém-nascidos prematuros, perda de peso igual ou superior a 20% na primeira semana de vida indica que não houve excesso de perda hídrica.
- (D) Calor radiante, fototerapia e ambiente com baixa umidificação são fatores que aumentam as perdas insensíveis.
- (E) Fontanela deprimida, saliva espessa, perfusão periférica inadequada e frequência cardíaca maior que 160 bpm podem ser indicativos de desidratação.

21. Pelo custo relativamente baixo, o emprego da Ventilação não invasiva (CPAP) tem sido muito estimulado para manejo do RN com insuficiência respiratória. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos cuidados de enfermagem que devem ser colocados em prática quando esse tipo de ventilação é utilizada.

- (A) Deve-se escolher o tamanho adequado da pronga, de tal forma que não haja deslocamentos, pois esses podem ocasionar perda de pressão, escape de gases pelas narinas e de ar pela boca.
- (B) Deve-se verificar periodicamente a adaptação da pronga às narinas, a permeabilidade das vias aéreas superiores, a posição do pescoço e o aspecto das asas e do septo quanto à presença de isquemia e necrose.
- (C) Deve-se molhar a pronga nasal com água ou solução salina e colocar a pronga com a curvatura para baixo e para dentro da cavidade nasal.
- (D) Deve-se aspirar previamente a oro e nasofaringe e manter sonda gástrica nº 8 fechada para auxiliar na descompressão do estômago.
- (E) É necessário certificar-se de que a umidificação e o aquecimento dos gases estejam adequados (36°C).

22. Nutrir adequadamente, com o objetivo de proporcionar ao recém-nascido prematuro crescimento semelhante ao crescimento fetal, é um dos grandes desafios da neonatologia.

Sobre esse tema, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Quando o RN prematuro não for capaz de sugar, ele não deve receber alimentação por sonda.
- () A administração da dieta pode ser feita por gavagem ou por infusão contínua.
- () A infusão contínua da dieta não é indicada para os bebês com tempo de esvaziamento gástrico prolongado.
- () As bombas de seringa são indicadas para administração de dieta contínua, devendo ser mantidas na posição horizontal para evitar perdas de gordura.
- () O uso do copinho pode ser liberado quando o bebê for capaz de fazer a protrusão da língua para ingerir o leite.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – F.

23. A pele dos recém-nascidos pré-termo é imatura, se comparada à dos nascidos a termo. Sobre os cuidados necessários com a pele dos recém-nascidos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A permeabilidade aumentada da pele facilita a absorção dos ingredientes.
- (B) Após o uso de antissépticos, a pele deve ser limpa com água, pelo risco de irritação grave e queimaduras químicas.
- (C) É indicada a aplicação de adesivos transparentes para proteção dos braços, cotovelos e joelhos de lesões por fricção.
- (D) Deve-se utilizar produtos de higiene com pH neutro e com o mínimo de corantes e perfumes.
- (E) Deve-se usar incubadora umidificada de 70% a 90% nos primeiros sete dias de vida, 50% até os 28 dias de vida; o uso desse equipamento não é indicado para reduzir a perda de água transepidermica e calor.

24. A manutenção de uma via aérea permeável ainda é uma meta prioritária na Unidade Neonatal.

Em relação ao posicionamento adequado do recém-nascido para facilitar a drenagem das secreções, especialmente após a amamentação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se usar o cateter de tamanho adequado e empregar técnica de sucção correta, para evitar lesão da mucosa e edema.
- (B) Deve-se posicionar os neonatos saudáveis em decúbito ventral durante o sono.
- (C) Deve-se fazer sucção suave para evitar bradicardia reflexa, laringoespasma e arritmias cardíacas por estimulação vagal.
- (D) Deve-se realizar a sucção orofaríngea por cinco segundos, com tempo suficiente entre as sucções, para permitir que o recém-nascido se recupere e se reoxigene.
- (E) Deve-se identificar os sinais de angústia respiratória no recém-nascido, que incluem taquipneia, dilatação nasal, ronco, retrações intercostais e cianose.

25. As intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas para o alívio e o manejo da dor em recém-nascidos, tendo eficácia comprovada e apresentando baixo risco para os bebês. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um desses procedimentos.

- (A) Sucção não nutritiva.
- (B) Aumento da estimulação tátil.
- (C) Contato pele a pele.
- (D) Administração via oral de substâncias adocicadas.
- (E) Amamentação.

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as afecções hematológicas às respectivas características ou definições.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Anemia (2) Aplasia de Medula (3) Leucemia (4) Neutropenia (5) Hemofilia | <ul style="list-style-type: none"> () Grupo de doenças malignas da medula óssea e do sistema linfático. () O grupo de células sanguíneas de defesa está abaixo do valor normal. () O número de glóbulos vermelhos está abaixo dos valores normais. () Grupo de doenças de sangramento caracterizadas pela deficiência de fator de coagulação. () Falência da medula óssea com depressão dos elementos sanguíneos. |
|---|---|

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- (B) 4 – 3 – 2 – 1 – 5.
- (C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
- (E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

27. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), em relação à terapêutica hemato-oncológica.

- () Antes da administração de um quimioterápico, devemos usar antieméticos para evitar as náuseas e os vômitos provocados por aquela medicação.
- () Algumas quimioterapias, como o metotrexate, exigem hiperidratação antes da sua administração, para evitar maiores danos ao paciente.
- () Alopécia é um efeito colateral comum de vários quimioterápicos.
- () O transplante de medula óssea alogênico usa a medula óssea da própria criança, coletada de tecido livre da doença.
- () A observação da hematúria (verificada com fita teste) é um cuidado de enfermagem para pacientes em uso de alguns quimioterápicos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – V.

28. Considere as afirmações abaixo em relação ao processo de enfermagem.

- I - O histórico de enfermagem deve incluir as informações a respeito das origens biofísicas, psicológicas, socioculturais e espirituais do paciente.
- II - O diagnóstico de enfermagem se refere ao julgamento clínico a respeito das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde do momento ou em potencial e dos processos da vida.
- III- O planejamento é a etapa do processo de enfermagem que desenvolve e aplica estratégias de intervenção de enfermagem.
- IV - A evolução é a etapa do processo de enfermagem que desenvolve um plano de cuidados, iniciando as intervenções que foram identificadas naquele momento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas III e IV.

29. O luto é o processo de experimentar reações fisiológicas, comportamentais, sociais e espirituais à perda de uma pessoa.

Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - O luto é um processo altamente individualizado.
- II - O luto é uma reação natural e esperada à perda.
- III- O luto antecipado pode ser manifestado por negação, raiva, depressão e outros sintomas psicológicos e físicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Assinale a alternativa correta em relação às doenças das vias aéreas.

- (A) Asma é uma doença infecciosa provocada pelo rinovírus e pelo vírus sincicial respiratório.
- (B) Bronquiolite é a doença infecciosa mais comum da traqueia.
- (C) Pneumonia é uma inflamação do parênquima traqueal.
- (D) Tosse com sibilância é uma característica comum da bronquiolite.
- (E) Bronquite é a inflamação das vias aéreas de menor calibre.

31. Chamamos de _____ a eliminação de fezes escuras, resultantes de sangue desnaturado.

_____ é a coloração amarelada da pele e escleróticas.

_____ é a transferência passiva de conteúdo gástrico para o esôfago e boca.

_____ é a dificuldade para deglutir.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos parágrafos acima.

- (A) Melena – Refluxo – Icterícia – Hematêmese
- (B) Hematêmese – Refluxo – Icterícia – Melena
- (C) Melena – Icterícia – Refluxo – Disfagia
- (D) Refluxo – Icterícia – Melena – Hematêmese
- (E) Disfagia – Icterícia – Refluxo – Melena

32. Durante o século XX, um dos maiores avanços da pediatria foi a diminuição das doenças infectocontagiosas, devido ao amplo uso de imunizações para preveni-las. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina Hib é aplicada no recém-nascido antes da alta hospitalar.
- (B) MMR é a vacina contra a coqueluxe, rotavírus e influenza.
- (C) DTaP protege a criança contra tuberculose, tétano e hepatite B.
- (D) Crianças que são imunizadas na idade recomendada e que não receberam todas as doses, devem reiniciar o calendário de vacinação.
- (E) A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é a MMR.

33. A suspeita ou a confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou maus tratos contra criança ou adolescente, devem ser obrigatoriamente comunicadas

- (A) à Vara da Infância e da Juventude.
- (B) à delegacia mais próxima.
- (C) à administração do estabelecimento de saúde.
- (D) ao Conselho Tutelar.
- (E) à Delegacia Especializada na Criança e Adolescente (DECA).

34. O médico ou enfermeiro que deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de _____ contra criança ou adolescente poderá sofrer pena de _____. Por deixar de _____ o neonato e parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de realizar os exames de que trata esta Lei no art. 10, poderá o profissional médico ou enfermeiro sofrer pena de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima, no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

- (A) discriminação – multa de 6 a 40 salários de referência – receber corretamente – detenção de dois a oito anos
- (B) negligência – detenção de dois a oito anos – identificar corretamente – multa de 6 a 40 salários de referência
- (C) maus tratos – detenção de seis meses a dois anos – medicar corretamente – multa de 3 a 20 salários de referência
- (D) discriminação – detenção de seis meses a dois anos – medicar corretamente – multa de 3 a 20 salários de referência
- (E) maus tratos – multa de 3 a 20 salários de referência – identificar corretamente – detenção de seis meses a dois anos

35. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as doenças hepáticas e gastrointestinais às suas respectivas definições ou causas.

- (1) Insuficiência hepática
 - (2) Hepatite viral
 - (3) Colestase neonatal
 - (4) Ascite
 - (5) Encefalopatia hepática
- () Doença necroinflamatória do fígado.
 - () Disfunção hepática que pode ser aguda ou crônica, podendo evoluir para necessidade de transplante hepático.
 - () Pode ser causada por obstrução biliar, atresia das vias biliares, hepatite ou cisto de colédoco.
 - () Quadro caracterizado por agressividade, irritabilidade, hipoatividade, confusão mental, alterações motoras.
 - () Aumento do volume abdominal, às vezes, com necessidade de paracentese de alívio ou diagnóstica.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima pra baixo, é

- (A) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
- (B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
- (E) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.

36. A diarreia caracteriza-se pelo aparecimento agudo de fezes líquidas ou amolecidas com frequência e volume aumentados. Sobre este agravo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Podem ser causas de diarreia: fatores emocionais, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, Síndrome de Munchausen, uso de medicamentos, jejum prolongado.
- (B) A diarreia é considerada aguda se tiver duração de até 14 dias; metade das mortes por diarreia são causadas pela desidratação.
- (C) A diarreia é uma doença que acomete crianças de qualquer classe social. As consequências independem da situação socioeconômica e nutricional do paciente.
- (D) O profissional de enfermagem deve atentar aos sinais que indicam desidratação, diminuição da quantidade de saliva, diminuição do sensório, extremidades frias, pulsos finos, fontanela deprimida.
- (E) A diminuição da morbimortalidade no Brasil por diarreia se deve, entre outros fatores, à valorização do aleitamento materno e à maior cobertura vacinal alcançada nas últimas décadas.

37. A alteração paroxística de atividade motora autolimitada, com ou sem alteração da consciência ou comportamento, provocada por uma atividade elétrica anormal, caracteriza

- (A) convulsão febril.
- (B) epilepsia.
- (C) convulsão.
- (D) choque.
- (E) crise conversiva.

38. Coma é a impossibilidade de acordar o paciente mesmo com estímulos intensos. Com relação aos procedimentos frente a este tipo de situação, a prioridade é

- (A) estabilizar via aérea.
- (B) imobilizar a coluna cervical.
- (C) oferecer oxigênio.
- (D) administrar glicose EV.
- (E) realizar exames.

39. Para tratamento de infecção, paciente faz uso de Pen G Cristalina, 125.000U, de 6/6h, frasco ampola de 5.000.000U. Dilui-se a ampola em 3,2mL de AD, que resultam em 5mL de solução. Quanto deve ser aspirado da diluição e qual volume diário deve ser administrado?

- (A) 0,5mL e 1mL.
- (B) 0,75mL e 1,25mL.
- (C) 0,8mL e 1,4mL.
- (D) 0,15mL e 0,75mL.
- (E) 0,125mL e 0,5mL.

40. Paciente internado faz uso de dipirona-EV 125mg, de 6/6h; a ampola de 2mL contém 500mg/mL. Quantos miligramas o paciente receberá em 24 horas?

- (A) 125.
- (B) 250.
- (C) 500.
- (D) 750.
- (E) 1000.