

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 11- ENFERMEIRO I (Atenção Primária à Saúde)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n.º: \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 11

##### ENFERMEIRO I (Atenção Primária à Saúde)

01.	E	11.	E	21.	E
02.	B	12.	A	22.	C
03.	A	13.	C	23.	B
04.	A	14.	C	24.	C
05.	D	15.	D	25.	B
06.	C	16.	ANULADA		
07.	A	17.	C		
08.	D	18.	E		
09.	B	19.	D		
10.	ANULADA	20.	D		

# INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 5.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da prova. (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **26**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **duas horas e meia (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa prova!**

**01.** Assinale as alternativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):

- ( ) A hierarquização assegura prioridade aos grupos com mais necessidades, identifica e considera a pluralidade e a diversidade da condição humana em suas potencialidades e demandas como um referencial para a alocação de recursos.
- ( ) A descentralização prevê a distribuição de responsabilidades entre as três esferas de governo, de modo que cada uma delas, em especial os municípios, tenha autonomia para decidir, implantar e desenvolver ações e serviços de saúde.
- ( ) A integralidade envolve a unicidade do atendimento, historicamente cindido em ações preventivas e curativas, e prevê a articulação do setor da saúde com outros setores que tenham repercussão na qualidade de vida das pessoas e dos grupos sociais.
- ( ) A universalidade decorre do artigo 196 da Constituição Federal, que afirma a saúde como direito fundamental de todo o ser humano, cabendo ao Estado o dever de prover o acesso aos serviços de saúde a todo cidadão.
- ( ) A regionalização diz respeito à organização dos serviços de saúde em rede à luz da noção de território, que encerra indicadores epidemiológicos e sociais que condicionam e determinam distintos perfis populacionais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) F – V – V – V – V.

**02.** No planejamento das ações de saúde pelo enfermeiro, em um serviço de atenção primária, quais das seguintes ações fazem parte da análise situacional?

- (A) Diagnóstico epidemiológico, diagnóstico de enfermagem, conhecimento do território e das demandas dos usuários.
- (B) Diagnóstico epidemiológico, levantamento dos recursos da comunidade, conhecimento do território e das demandas dos usuários.
- (C) Conhecimento do território, ecomapa, conhecimento das demandas dos usuários e das ações programáticas municipais.
- (D) Conhecimento das demandas do gestor municipal e dos usuários, diagnóstico de enfermagem, levantamento dos recursos da comunidade.
- (E) Conhecimento das demandas do gestor municipal e dos usuários, ecomapa, diagnóstico epidemiológico.

**03.** Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as atribuições definidas pela Política Nacional de Atenção Básica aos respectivos profissionais.

- (1) Atribuições comuns a todos os profissionais
  - (2) Atribuições dos agentes comunitários de saúde
  - (3) Atribuições específicas do enfermeiro
  - (4) Atribuições específicas do enfermeiro ou do técnico/auxiliar de enfermagem ou do médico
- ( ) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS).
  - ( ) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita.
  - ( ) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
  - ( ) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde.
  - ( ) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2 – 1 – 4.
- (C) 4 – 2 – 3 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2 – 4 – 1.
- (E) 1 – 2 – 4 – 1 – 3.

**04.** Segundo o Caderno de Atenção Básica: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde (2006), a avaliação global da pessoa idosa na atenção básica envolve os itens abaixo, **EXCETO**

- (A) risco de internação hospitalar.
- (B) cognição.
- (C) mobilidade.
- (D) funcionalidade familiar.
- (E) atividades de vida diária.

**05.** De acordo com o protocolo de enfermagem do Ministério da Saúde, no que se refere ao tratamento da tuberculose na atenção básica, considere as afirmativas abaixo.

- I - Orientar quanto à coleta de escarro.
- II - Dar alta aos pacientes conforme protocolo.
- III- Prescrever medicações do esquema básico de tuberculose, conforme disposições legais e protocolos.

Quais são atribuições do enfermeiro?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



**06.** Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro realiza ações educativas ao paciente diabético, usuário de insulina. Com relação ao uso dessa medicação, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve haver rodízio no local de aplicação da insulina para evitar infecção.
- II - A insulina deve ser conservada na geladeira, próxima ao congelador.
- III- Antes de ser utilizada, a insulina deve ser homogeneizada de forma lenta e contínua.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**07.** Durante uma consulta de enfermagem realizada a um paciente de 42 anos, com diagnóstico de diabetes melito, o enfermeiro verificou a pressão arterial, constatando um valor de PA = 142/96mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta para o valor de PA desse paciente, de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010).

- (A) Hipertensão estágio I.
- (B) Hipertensão estágio II.
- (C) Hipertensão estágio III.
- (D) Limítrofe.
- (E) Normal.

**08.** Com relação à Estratégia de Saúde da Família (ESF), segundo a Política Nacional de Atenção Básica, considere as afirmações abaixo.

- I - Uma das funções do enfermeiro é planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em conjunto com outros membros da equipe.
- II - Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- III- O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 70% da população cadastrada, com no máximo 750 pessoas por agente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**09.** No que se refere ao acompanhamento da saúde da criança, o Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas, no mínimo, sete consultas de rotina no primeiro ano de vida. Assinale a alternativa correta em relação à distribuição dessas consultas.

- (A) Na primeira semana, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês e 12º mês.
- (B) Na primeira semana, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês.
- (C) Nos primeiros 15 dias, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês.
- (D) Nos primeiros 15 dias, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês.
- (E) No 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês.

**10.** Considere as afirmações abaixo no que se refere à participação social do SUS, contemplada na Constituição Brasileira de 1988.

- I - A Lei n.º 8.142/90 e a Emenda Constitucional n.º 29 de 13/09/2000 instituem e estruturam os Conselhos de Saúde nos estados e municípios.
- II - Os Conselhos de Saúde atuam como órgãos consultivos, tanto no que diz respeito ao planejamento quanto na execução das ações do SUS.
- III- Os Conselhos de Saúde têm como atribuições: atuar na formulação de estratégias da política de saúde e atuar no controle social da execução das políticas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

**11.** A Atenção Primária à Saúde possibilita ao cidadão o acesso a serviços de saúde de qualidade, e com as vantagens de um menor custo social, econômico e sanitário (MAIA, RODRIGUES, MAIA. IN: SOUZA e HORTA, 2012). Sendo assim, considere as afirmações abaixo.

- I - A Portaria 2.488/GM/MS de outubro de 2011 considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde como equivalentes.
- II - A Atenção Primária à Saúde é defendida por vários autores como sendo o centro coordenador de uma rede de serviços.
- III- A Atenção Primária à Saúde conforma-se como a única entrada na rede de serviços para as demandas e necessidades apresentadas pela população.
- IV- São três as funções fundamentais da Atenção Primária à Saúde na organização das redes de atenção à saúde: resolução, coordenação e responsabilidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, II e IV.

**12.** As diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) são materializadas em ações e podem ser agrupadas em três eixos. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Estratégias de qualificação da gestão e de valorização do trabalhador
  - (2) Estratégia de qualificação da atenção
  - (3) Estratégia de valorização do SUS
- 
- ( ) Constituição do Grupo de Trabalho de Humanização; projetos cogерidos de ambiência.
  - ( ) Projeto Memória do "SUS que dá certo".
  - ( ) Equipe transdisciplinar de referência e apoio matricial.
  - ( ) Sistema de escuta qualificada (ouvidoria, pesquisa de satisfação).
  - ( ) Acolhimento com classificação de risco; projeto terapêutico singular.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 3 – 2 – 1 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2 – 2 – 1.
- (E) 3 – 1 – 1 – 2 – 2.

**13.** A Atenção Domiciliar (AD) na Atenção Básica se constitui como recorte da Atenção Domiciliar, que ocorre no âmbito da Atenção Básica, inserindo-se no processo de trabalho das equipes de saúde. Qual dos critérios abaixo **NÃO** se constitui em critério de inclusão na AD, conforme o Ministério da Saúde?

- (A) Ter consentimento informado por parte do usuário (se consciente) e/ou do seu representante legal.
- (B) Estar impossibilitado de se deslocar até o serviço.
- (C) Necessitar de cuidados numa frequência de pelo menos uma visita semanal.
- (D) Apresentar problemas de saúde controlados/compensados.
- (E) Dispor, no domicílio, de infraestrutura compatível com a realização da AD.

**14.** Considere as afirmações abaixo, em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE).

- I - fortalece o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.
- II - promove a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes.
- III- para um melhor resultado, deve ter ações restritas aos estudantes, não envolvendo famílias ou corpo de professores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**15.** Considerando-se as questões técnicas, éticas e legais no âmbito das ações de Atenção Primária à Saúde de Adolescentes, entende-se que certos direitos lhes são garantidos. No que se refere a esses direitos do adolescente, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Privacidade no momento da consulta.
- (B) Garantia de confidencialidade e sigilo.
- (C) Consentimento ou recusa ao atendimento.
- (D) Atendimento à saúde com autorização ou acompanhamento dos pais.
- (E) Informação sobre seu estado de saúde.

**16.** Um lactente de 5 meses completos chega ao Serviço de Saúde acompanhado de seus pais e com a carteira de vacinação. Quais vacinas devem ter sido aplicadas, segundo o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde, para que o lactente esteja em dia com as vacinas?

- (A) 1ª dose hepatite B, 1 dose BCG, 1 dose penta, 2 doses do VOP, 1 dose meningocónciugada, 1 dose pneumo 10.
- (B) 1ª dose hepatite B, 1 dose de BCG, 2 doses de penta, 2 doses VIP, 1 dose meningocónciugada, 2 doses de pneumo 10.
- (C) 1ª dose de hepatite B, 2 doses de BCG, 2 doses de penta, 2 doses VIP, 2 doses de meningocónciugada, 2 doses de pneumo 10.
- (D) 1ª dose hepatite B, 1 dose de BCG, 1 dose de penta, 1 dose de meningocónciugada, 1 dose de DTP.
- (E) 1ª dose de hepatite B, 1 dose de BCG, 1 dose de Hib, 2 doses de penta, 2 doses de pneumo 10.

**17.** Em relação às imunizações, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve-se evitar a administração simultânea de vacinas para não aumentar a incidência de efeitos adversos.
- II - A região glútea é o local de escolha para aplicação de vacinas intramusculares em crianças abaixo de dois anos que não deambulam.
- III- As vacinas de vírus vivo atenuado devem ser aplicadas no mesmo dia ou com intervalo de quatro semanas entre elas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**18.** O acompanhamento do desenvolvimento da criança na Atenção Básica objetiva a promoção de sua saúde, sua proteção e a detecção precoce de alterações. Considere as informações abaixo sobre o desenvolvimento da criança.

- I - A criança deve atravessar cada estágio segundo uma sequência regular. Se não for estimulada ou motivada no devido momento, ela não conseguirá superar o atraso em seu desenvolvimento.
- II - Os fatores de risco para problemas de desenvolvimento podem ser classificados em genéticos, biológicos e/ou ambientais.
- III- A manifestação de dificuldades no desenvolvimento varia, podendo ser de ordem mental, física, auditiva, visual ou relacional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**19.** A abordagem da criança pela equipe de saúde deve destacar a importância dos hábitos alimentares na promoção de sua saúde. Considere as afirmações abaixo sobre uma alimentação infantil saudável.

- I - Inicia-se com o aleitamento materno exclusivo, até os seis meses de vida, e complementado até os dois anos ou mais.
- II - Inicia-se a alimentação complementar com o oferecimento de alimentos liquidificados e/ou triturados para melhor digestão e aceitação da criança.
- III- Quando houver repetidas recusas da criança com relação à ingestão de determinado alimento, deve-se mudar a sua forma de preparo ou fazer um intervalo para uma nova tentativa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**20.** De acordo com o Código de Ética, são responsabilidades, direitos ou deveres dos profissionais de enfermagem:

- I - participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- II - aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- III- assinar as ações de enfermagem executadas por outros colegas em situações especiais, como licença e férias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

**21.** O objetivo do acompanhamento pré-natal é, além de assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, também abordar aspectos psicossociais e atividades educativas preventivas. Considere as afirmações abaixo sobre o acompanhamento pré-natal.

- I - O Ministério da Saúde preconiza que toda gestante deve realizar, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo que até a 28ª semana a consulta deve ser mensal, entre a 28ª e a 36ª semana deve ser quinzenal e, após, deve ser semanal, até o nascimento do bebê.
- II - Na avaliação dos exames laboratoriais, ao constatar-se uma primeira glicemia de jejum num valor entre 85 e 119 mg/dL, recomenda-se realizar o teste de tolerância à glicose (TTG) entre a 24ª e a 28ª semana de gestação.
- III- Com relação ao controle da pressão arterial em gestantes, estabelece-se como parâmetro para anormalidade a observação de níveis tensionais absolutos iguais ou maiores do que 140 mmHg de pressão arterial sistólica e iguais ou maiores do que 90 mmHg de pressão arterial diastólica, mantidos em medidas repetidas, em condições ideais, em pelo menos três ocasiões.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**22.** Com relação aos exames complementares que devem ser solicitados no acompanhamento pré-natal, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando o trimestre gestacional com o exame que deverá ser solicitado.

- (1) 1º trimestre
- (2) 2º trimestre
- (3) 3º trimestre
- (4) 1º e 3º trimestres

- ( ) Teste de tolerância para glicose (TTG) com 75g
- ( ) Anti-HIV
- ( ) Bacterioscopia de secreção vaginal
- ( ) Hemograma
- ( ) Tipagem sanguínea e fator Rh
- ( ) Glicemia de jejum

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3.
- (C) 2 – 4 – 3 – 4 – 1 – 4.
- (D) 1 – 1 – 2 – 1 – 4 – 2.
- (E) 2 – 1 – 3 – 1 – 1 – 4.

**23.** O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente na população feminina brasileira (BRASIL, 2012), portanto recomenda-se fortemente seu rastreamento em mulheres sexualmente ativas. O principal método e o mais amplamente utilizado para esse rastreamento é o teste de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero) para detecção das lesões precursoras. Considere as afirmações abaixo sobre o exame de Papanicolau.

- I - Segundo as diretrizes brasileiras, o exame deve ser disponibilizado às mulheres, prioritariamente, na faixa etária de 25 até 64 anos, com ou sem vida sexual ativa.
- II - A rotina preconizada no rastreamento brasileiro é que o intervalo entre os exames passe a ser de três anos, após dois resultados negativos por dois anos seguidos.
- III- Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, devem-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres devem realizar o exame a cada três anos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



**24.** De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 32 do Ministério do Trabalho, que trata sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, todos os trabalhadores da saúde, em seus postos de trabalho, devem adotar como medida de proteção

- (A) a não utilização de adornos, tais como anéis, pulseiras, relógios ou colares, à exceção do uso de aliança de casamento.
- (B) o uso de vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, sendo permitido o uso de calçados abertos em dias quentes.
- (C) a saída do local de trabalho sem os equipamentos de proteção individual e sem as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- (D) a higienização das vestimentas utilizadas nos postos de trabalho, sendo essa medida de responsabilidade do empregador.
- (E) o uso de luvas nas situações de exposição a agentes biológicos, substituindo o processo de lavagem das mãos.

**25.** Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando o tipo de cobertura para tratamento de feridas com a devida indicação.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) Hidrocoloide          | ( ) Feridas exsudativas, com ou sem sangramento, cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção. |
| (2) AGE                   | ( ) Queimaduras e lesões infectadas ou com tecido necrótico.                                   |
| (3) Sulfadiazina de prata | ( ) Prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas.                                  |
| (4) Alginato de cálcio    | ( ) Prevenção de úlceras de pressão e tratamento de feridas abertas.                           |

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 4 – 3 – 1 – 2.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 1 – 4 – 2 – 3.