

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 30 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 30

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

01.	C	11.	A	21.	D	31.	C
02.	B	12.	C	22.	C	32.	A
03.	E	13.	B	23.	A	33.	E
04.	D	14.	D	24.	A	34.	C
05.	D	15.	E	25.	B	35.	B
06.	E	16.	D	26.	C	36.	ANULADA
07.	D	17.	E	27.	D	37.	D
08.	ANULADA	18.	A	28.	ANULADA	38.	B
09.	A	19.	A	29.	E	39.	E
10.	B	20.	B	30.	B	40.	B

INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 5.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da prova. (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **41**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

01. A necessidade de reanimação do recém-nascido (RN) em sala de parto depende da avaliação simultânea de dois sinais:

- (A) temperatura e respiração.
- (B) temperatura e frequência cardíaca.
- (C) respiração e frequência cardíaca.
- (D) frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
- (E) temperatura e saturação de oxigênio.

02. Em relação ao nascimento, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O preparo para atender o RN na sala de parto inclui a realização de anamnese materna.
- () O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, não reduz o risco de hipotermia no RN a termo.
- () Para a recepção do RN, não é necessário o uso de medidas de precaução padrão.
- () A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida, pois está associado com menor mortalidade neonatal.
- () Recomenda-se envolver o RN em saco plástico transparente quando a idade gestacional for inferior a 29 semanas ou o peso for inferior a 1.500 g.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – F – F – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) F – F – V – V – F.

03. No que diz respeito ao leite materno (LM) e amamentação, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Nos primeiros dias, o LM é chamado de colostro e contém menos proteínas e mais gordura que o leite maduro.
- () O leite humano possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções.
- () Quando a mãe faz uso esporádico de drogas de abuso, não é recomendada a interrupção temporária do aleitamento materno.
- () A ordenha da mama é útil para aliviar o desconforto provocado por uma mama cheia, mas não é necessário orientar a mulher que amamenta quanto à técnica de ordenha.
- () Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – F – V – F – F.
- (E) F – V – F – F – V.

04. Considere as afirmações abaixo sobre dificuldade respiratória no RN:

- I - o gemido expiratório não é um sinal comum nessa situação.
- II - considera-se taquipneia quando a frequência respiratória mantém-se persistentemente acima de 60 mrpm, em repouso ou no sono.
- III- a apneia é caracterizada por pausa respiratória entre 10 e 15 segundos, se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Uma solução parenteral, composta por SG 5% - 100 ml + NaCl 20% - 0,6 ml + KCl 10% - 0,5 ml + GluCa 10% - 0,3 ml, deverá ser administrada em bomba de infusão contínua durante 12 horas. O gotejo a ser infundido em mgts/min é de

- (A) 8,01.
- (B) 8,12.
- (C) 8,35.
- (D) 8,45.
- (E) 8,68.

06. A apresentação da ampicilina IV é de 1.000 mg. O pó é reconstituído em 10 ml de água destilada (AD). Foi prescrito 110 mg de 8/8 horas. A dose prescrita deverá ser diluída em 4 ml de SG 5% e administrada em 30 minutos em bomba de infusão. Qual o volume da dose a administrar e o gotejo da diluição respectivamente?

- (A) 1 ml e 5 mgts/min.
- (B) 1 ml e 10,2 mgts/min.
- (C) 1,1 ml e 10 mgts/min.
- (D) 1,1 ml e 10,1 mgts/min.
- (E) 1,1 ml e 10,2 mgts/min.

07. Considere as ações abaixo em relação aos cuidados de enfermagem na fototerapia:

- I - proteger os olhos do RN com uma cobertura radiopaca.
- II - verificar a irradiância de cada aparelho de fototerapia em uso.
- III- desligar o aparelho e retirar a proteção ocular durante a amamentação, independente dos níveis de bilirrubina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

08. A hipoglicemia em RN pode ser definida com níveis de glicose do sangue total abaixo de

- (A) 30 mg/dl.
- (B) 35 mg/dl.
- (C) 40 mg/dl.
- (D) 45 mg/dl.
- (E) 50 mg/dl.

09. As medidas antropométricas são dados que objetivam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e sempre devem ser realizadas na admissão da criança no hospital. Sobre a técnica de pesagem, é correto afirmar que

- (A) para pesagem do lactente são utilizados balança do tipo pesa-bebê, toalhas descartáveis e álcool a 70%.
- (B) na aferição do peso da criança, o uso de roupas não interfere no valor final.
- (C) a balança não necessita ser limpa entre um bebê e outro.
- (D) o uso de brinquedo terapêutico é contraindicado na realização do procedimento.
- (E) a rotina de tarar a balança deve ser realizada 1x/turno.

10. Para medir a estatura da criança até 2 anos de idade, utiliza-se

- (A) antropômetro de balança.
- (B) régua antropométrica.
- (C) trena.
- (D) fita métrica.
- (E) cordão.

11. As infecções respiratórias são as causas mais comuns de doenças na infância, acometendo crianças de todos os níveis sociais.

Em relação a essas infecções, é correto afirmar que

- (A) a avaliação da frequência respiratória, o tipo de respiração e a presença de ruído respiratório são indicativos de distúrbios respiratórios.
- (B) as informações sobre o comportamento da criança são secundárias na avaliação da criança com sintomas de infecções respiratórias.
- (C) fatores ambientais (mudança de temperatura) e orgânicos (baixa imunidade) não interferem na ocorrência dos distúrbios respiratórios.
- (D) os anticorpos maternos pouco protegem os recém-nascidos das doenças respiratórias.
- (E) em caso de bronquiolite, um dos cuidados primordiais é evitar a aspiração das vias aéreas superiores.

12. Sobre a desidratação na criança, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () As crianças são mais vulneráveis aos distúrbios hidroeletrólíticos do que os adultos.
- () A reposição oral é indicada, independente do grau de desidratação.
- () Em crianças hospitalizadas, é necessária a realização do balanço hídrico rigoroso.
- () A pesagem de fraldas não deve ser rotina em crianças com desidratação.
- () As eliminações devem ser bem descritas nos registros de enfermagem do paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – V.

13. Uma criança necessita receber uma solução intravenosa (IV) constituída de 79 ml de SG 5% + 3,5 ml de NaCl 20% + 1,5 ml de KCL 10%. O gotejo da infusão deverá ser de 12 mgts/min.

Qual o tempo total de infusão dessa solução?

- (A) 6 horas.
- (B) 7 horas.
- (C) 10 horas.
- (D) 12 horas.
- (E) 15 horas.

14. Sobre o uso de nutrição parenteral total (NPT) no paciente pediátrico, considere as afirmações abaixo.

- I - A terapia com NPT envolve a infusão venosa de soluções de baixa concentração de carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas, minerais, água e outros ativos em um único recipiente.
- II - Na maioria dos casos, a natureza altamente irritante da glicose concentrada contraindica a infusão em pequenas veias periféricas.
- III- Entre as principais responsabilidades da enfermagem no uso da NPT, estão o cuidado com o monitoramento da velocidade da infusão e a avaliação da tolerância do paciente à solução.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Com frequência, pacientes pediátricos são hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva com Síndrome da Angústia Respiratória (SARA). Em relação a essa síndrome, considere as afirmações abaixo.

- I - Por se tratar de uma inflamação pulmonar aguda grave, a criança necessita de ventilação mecânica invasiva e, em alguns casos mais graves, ventilação de alta frequência.
- II - A colocação do paciente em posição prona (decúbito ventral) pode auxiliar a melhora da oxigenação.
- III- Entre os cuidados de enfermagem, estão o monitoramento rigoroso da oximetria e dos padrões hemodinâmicos, como pressão arterial, avaliação da dor e desconforto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Considere as afirmações abaixo sobre terapias dialíticas no paciente pediátrico.

- I - A hemodiálise alcança a correção rápida das anormalidades hidroeletrólíticas, porém pode causar hipotensão na criança, que é uma alteração importante.
- II - O único método utilizado para o tratamento da insuficiência renal é a diálise peritoneal.
- III- Entre os cuidados de enfermagem em diálise peritoneal, está o controle rígido do balanço hídrico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

17. Em muitos casos de crianças enfermas, a equipe de enfermagem se depara com a morte dos pacientes. Sobre os cuidados de enfermagem pós-morte, considere as afirmações abaixo.

- I - Depois da morte da criança, a família deve ter tempo para ficar com o corpo, segurar a criança no colo se desejar, fazendo assim sua primeira despedida.
- II - A assistência de enfermagem pós-morte também consiste em conversar com a família, promover um ambiente tranquilo em volta da criança, oferecendo privacidade, com redução de luzes e alarmes dos monitores.
- III - Consideram-se cuidados da enfermagem: remover tubos e equipamentos, dar banho e vestir o corpo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

18. Em relação à parada cardiorrespiratória (PCR), em pediatria, é correto afirmar que

- (A) a compressão torácica consiste em compressões seriadas e rítmicas do tórax para manter a circulação dos órgãos vitais até que a criança apresente sinais vitais espontâneos ou possa ser realizado o suporte avançado de vida.
- (B) é dispensável o uso de superfície firme e rígida durante as compressões torácicas.
- (C) os medicamentos só devem ser utilizados como coadjuvantes no atendimento a PCR, portanto são utilizados apenas após a ressuscitação cardiorrespiratória.
- (D) a PCR é consequência principalmente de distúrbios cardíacos.
- (E) no atendimento da PCR em pacientes traqueostomizados, é necessário ventilar com a máscara – bolsa-válvula, não esquecendo de cobrir boca e narinas.

19. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em relação ao neonato, à criança e ao adolescente hospitalizados, hospitais e estabelecimentos de saúde devem responsabilizar-se por importantes ações. No que diz respeito a essas ações, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Manter registro das atividades desenvolvidas, em prontuário próprio, pelo prazo de 25 anos.
- () Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar ou digital.
- () Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
- () Avaliar a possibilidade de permitir a permanência em tempo integral de um responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
- () Velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
 (B) F – V – F – F – V.
 (C) F – V – F – V – F.
 (D) V – F – V – V – F.
 (E) V – F – V – F – V.

20. Em 1995, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre os direitos da criança e do adolescente hospitalizados.

Em relação a esses direitos, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso).

- () Não sentir dor, quando existam meios para evitá-la.
- () Receber aleitamento materno.
- () Receber apoio espiritual e religioso conforme prática de sua família.
- () Preservação de sua imagem, identidade, autonomia de valores, dos espaços e objetos pessoais, exceto nos casos de interesse acadêmico.
- () Não ser utilizado pelos meios de comunicação sem a expressa vontade de seus pais ou responsáveis ou a sua própria vontade, resguardando-se a ética.
- () Ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico, respeitando sua fase cognitiva, desde que seus pais concordem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – V – V.
 (B) V – V – V – F – V – F.
 (C) V – V – F – V – V – V.
 (D) V – F – F – F – F – V.
 (E) F – V – V – V – F – F.

21. De acordo com a Lei n.º 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, é correto afirmar que

- (A) integram o Sistema Único de Saúde (SUS) apenas os serviços públicos de saúde.
- (B) a centralização político-administrativa é um dos princípios do SUS.
- (C) têm preferência no atendimento as pessoas que não têm convênio de saúde privado.
- (D) a participação da comunidade é um dos princípios do SUS.
- (E) é desnecessária a hierarquização da rede de serviços de saúde.

22. De acordo com a Lei n.º 7.498, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) cabe ao técnico de enfermagem participar da programação da assistência de enfermagem.
- (B) a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) na ausência do enfermeiro, o técnico de enfermagem pode prescrever a assistência de enfermagem.
- (D) o técnico de enfermagem participa no planejamento da assistência de enfermagem.
- (E) o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem.

23. Em relação à Ética e à Bioética, é correto afirmar que

- (A) a Bioética é considerada a Ética Aplicada às questões da saúde e da pesquisa em seres humanos.
- (B) a Ética estabelece as leis para as ações desenvolvidas pelos seres humanos.
- (C) a Ética prioriza a perspectiva religiosa na tomada de decisões.
- (D) a Bioética considera apenas a relação médico-paciente.
- (E) o Código de Nuremberg estabelece os princípios legais da Ética.

24. Sobre o cateter central de inserção periférica (PICC), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A decisão de inserir o PICC deverá ser tomada após várias tentativas de inserção intravenosa, pois se trata de um cateter caro para as instituições hospitalares.
- (B) Esse cateter é constituído de polímero ou silicone e pode ser inserido por enfermeiros, médicos ou radiologistas de intervenção especialmente treinados.
- (C) O PICC tem menor chance de complicações se comparado a outros dispositivos de acesso venoso central e é uma excelente escolha para pacientes pediátricos.
- (D) Esse cateter não é fixado por sutura, sendo necessário, portanto, muito cuidado na manipulação do curativo.
- (E) A nutrição parenteral total (NPT) pode ser infundida pelo PICC.

25. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) em relação a pacientes portadores de fibrose cística.

- () Para pacientes hospitalizados, deve-se implementar a precaução padrão.
- () Para aqueles pacientes com insuficiência pancreática, a reposição de enzimas deve ser administrada a cada refeição e lanche.
- () A precaução de contato pode ser necessária para infecções específicas.
- () A amamentação deverá ser interrompida precocemente e substituída por fórmula com alto valor calórico.
- () Qualquer exercício aeróbico que seja prazeroso à criança deve ser encorajado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) F – F – F – F – F.
- (E) V – V – V – V – V.

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os cuidados necessários aos períodos pré e pós-operatório da criança hospitalizada.

- (1) Cuidado pré-operatório para evitar a broncoaspiração.
 (2) Cuidado pós-operatório diante de complicações em potencial como as infecções respiratórias.
 (3) Aspectos importantes do pós-operatório imediato.
 (4) Cuidado pré-operatório para evitar depletação de glicogênio e desidratação.
 (5) Período de recuperação do procedimento cirúrgico.
- () Monitorização da saturação de oxigênio e fornecimento de oxigênio suplementar, manutenção da temperatura corporal e promoção do equilíbrio hidroeletrólítico.
 () Passar um tempo com a criança para avaliar a percepção da cirurgia.
 () Restrição dos alimentos e líquidos.
 () Manter a ventilação pulmonar e remover secreções.
 () Assegurar que lactentes não permaneçam sem líquidos por via oral por tempo prolongado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
 (B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
 (C) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
 (D) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.
 (E) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.

27. Considere as afirmações abaixo sobre coleta de materiais para exames.

- I - O esfregaço nasofaríngeo é um método de coleta de secreção nasal e culturas da garganta. Após obter a amostra, a haste com secreção é inserida no tubo de cultura.
 II - Na coleta de urina 24h, o período de coleta sempre começa e termina com a bexiga vazia. No momento em que a coleta se inicia, a criança é orientada a urinar e a primeira amostra é descartada.
 III- Na coleta de amostra da urina por jato médio, limpa-se o meato uretral e os primeiros mililitros de urina são coletados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

28. Em relação aos sinais vitais, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) para verificar a temperatura axilar, deve-se colocar a ponta do termômetro sob o braço, no centro da axila e manter o termômetro perto da pele e longe da roupa.
 (B) a frequência respiratória em crianças deverá ser contada em 15 segundos e multiplicada por 4.
 (C) um pulso satisfatório pode ser obtido na veia radial em crianças com mais de 2 anos.
 (D) a sequência indicada para verificar os sinais vitais em lactentes é respiração, pulsação cardíaca e temperatura axilar.
 (E) a pressão arterial deve ser medida com a fossa cubital ao nível do coração, com o braço apoiado.

29. Considere as afirmações abaixo sobre cuidado infantil.

- I - A negligência infantil é geralmente constatada quando há falha de um dos pais ou de outra pessoa legalmente responsável pelo bem-estar da criança em prover suas necessidades básicas e manter cuidados adequados.
 II - O abuso emocional se refere à tentativa deliberada de destruir ou prejudicar significativamente a autoestima ou a competência da criança.
 III- Na Síndrome de Munchausen por Procuração (SMPP), cuidadores deliberadamente exageram/inventam histórias e sintomas ou induzem sintomas na criança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

30. Com relação à NR-32 (Norma Regulamentadora), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
- (B) o empregador deve informar, em um prazo de três dias, aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças.
- (C) todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
- (D) cabe ao empregador capacitar os trabalhadores para a necessidade de segregação, acondicionamento, transporte, definições, classificação e potencial de risco dos resíduos.
- (E) o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois de seu uso.

31. Os estímulos dolorosos no recém-nascido se manifestam em múltiplos órgãos e sistemas. Em relação à afirmação acima, assinale a alteração que **NÃO** é esperada.

- (A) Aumento da pressão arterial.
- (B) Aumento da frequência cardíaca.
- (C) Diminuição da frequência cardíaca.
- (D) Diminuição da saturação de oxigênio.
- (E) Diminuição da motilidade gástrica.

32. Sobre a técnica de avaliação da glicemia capilar no recém-nascido, é correto afirmar que

- (A) a punção deve ser feita na face lateral ou medial do calcanhar.
- (B) a punção deve ser feita no centro do calcanhar.
- (C) o pé deve ser resfriado antes da punção para aumentar a vascularização.
- (D) intervenções não farmacológicas para alívio da dor não precisam ser adotadas.
- (E) é desnecessário o uso de luvas.

33. Com relação ao atendimento dos recém-nascidos (RN) de mães HIV soropositivas, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) os profissionais devem adotar precauções básicas e universais para evitar a sua própria contaminação.
- (B) a aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve ser evitada.
- (C) o RN deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que esteja estável.
- (D) somente após a remoção de secreções maternas pode-se administrar medicações injetáveis.
- (E) a administração de zidovudina (AZT), nas primeiras 12 horas de vida, é contraindicada.

34. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de cateteres aos seus respectivos usos nos recém-nascidos.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) cateter intravenoso periférico (2) cateter central de inserção periférica (PICC) (3) cateter umbilical venoso (4) cateter umbilical arterial | <ul style="list-style-type: none"> () É inserido através de punção venosa para administrar fluidos e medicamento. () É utilizado para coletas de sangue frequentes e para monitorização dos gases sanguíneos. () É particularmente útil em RN prematuros extremos em uso de hidratação venosa e nutrição parenteral e com manuseio restrito. () É utilizado para realizar a exsanguinotransfusão. |
|---|---|

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 1 – 2 – 4 – 3.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

35. Considere as afirmações abaixo sobre nutrição no recém-nascido pré-termo.

- I - O melhor leite a ser oferecido é o leite da própria mãe.
- II - Manter a produção de leite das mães é um desafio a ser enfrentado pela equipe de saúde.
- III- Quando o RN não for capaz de sugar, ele deve receber alimentação por sonda.
- IV - A administração da dieta deve ser feita por infusão contínua.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.



36. Qual o local correto de administração de injeções intramusculares no recém-nascido?

- (A) Região do deltoide.
- (B) Região dorsoglútea.
- (C) Região ventroglútea.
- (D) Inserção inferior do deltoide.
- (E) Porção anterolateral da coxa.

37. Quais sinais e sintomas indicam reações adversas da quimioterapia sobre a mucosa oral?

- (A) Febre, calafrios, sensibilidade diminuída aos alimentos ácidos e queda de cabelos.
- (B) Diarreia, cólicas, dor abdominal intensa e vômitos.
- (C) Equimoses, petéquias, epistaxe e ulceração.
- (D) Sialorreia, dor na cavidade oral, queimação e sensibilidade maior aos alimentos ácidos.
- (E) Convulsões, parestesias, sialorreia e diminuição de força em membros superiores.

38. Após a quimioterapia, é comum a imunossupressão. Nesses casos, é cuidado de enfermagem:

- (A) oferecer alimentos hortifrutigranjeiros crus.
- (B) proibir a visita de indivíduos portadores ou recentemente curados de doenças infectocontagiosas.
- (C) evitar o banho diário no paciente.
- (D) restringir o sono durante o dia.
- (E) evitar a troca de equipos, cânulas e perfusores para não aumentar o risco de infecção.

39. A administração de drogas quimioterápicas requer alguns cuidados de enfermagem. Em relação a esses cuidados, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Administrar as medicações antieméticas antes e depois da quimioterapia não reduz os efeitos eméticos das drogas.
- () Deve-se desconsiderar a eliminação urinária devido à hiperidratação pré e pós-quimioterapia.
- () É preciso estimular a higiene oral, pois essa diminui o risco de mucosite.
- () É necessário observar o pH urinário sempre que for administrado metotrexato.
- () Deve-se verificar presença de hematúria sempre que for administrada ifosfamida e/ou ciclofosfamida em alta dosagem.

- (A) V – F – V – V – V.
- (B) F – V – V – V – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – F – V – V – V.

40. A quimioterapia pode ocasionar efeitos tóxicos sobre órgãos e sistemas.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os efeitos tóxicos aos respectivos sistemas.

- (1) diarreia, cólica, vômitos
- (2) equimoses, petéquias, epistaxe
- (3) convulsões, parestesias, mialgias
- (4) cianose, tosse não produtiva, taquicardia
- (5) disúria, hematúria, dor lombar

- () cardiológico
- () renal
- () gastrintestinal
- () hematológico
- () neurológico

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- (B) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- (D) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.