



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 03/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 36 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM III

Terapia Intensiva Pediátrica, Oncologia Pediátrica e Neonatologia

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 36

TÉCNICO DE ENFERMAGEM III

Terapia Intensiva Pediátrica, Oncologia Pediátrica e Neonatologia

01.	B	11.	A	21.	D	31.	A
02.	C	12.	A	22.	B	32.	D
03.	C	13.	E	23.	C	33.	C
04.	A	14.	E	24.	B	34.	C
05.	B	15.	A	25.	D	35.	E
06.	C	16.	D	26.	C		
07.	D	17.	A	27.	D		
08.	A	18.	E	28.	B		
09.	D	19.	A	29.	A		
10.	E	20.	D	30.	D		

INSTRUÇÕES

- ❶ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❷ Esta PROVA consta de 35 (trinta e cinco) questões objetivas, assim distribuídas: questões **01 a 10**, valendo 0,25 ponto cada, e questões **11 a 35**, valendo 0,30 ponto cada.
- ❸ Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❹ Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- ❺ Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 36, serão desconsideradas.
- ❻ Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- ❼ Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- ❽ A duração da prova é de **três (3) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- ❾ O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- ❿ A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato

Boa Prova!



01. Na admissão do recém-nascido na UTI, alguns cuidados são fundamentais para que sua vida não seja colocada em risco.

Qual das intervenções abaixo deve ser realizada tão logo o bebê chegue à UTI?

- (A) Instalação de monitor cardíaco para verificar se a frequência cardíaca é compatível com a ausculta.
- (B) Colocação do paciente em berço de calor irradiante ou incubadora para manter o ambiente térmico estável.
- (C) Avaliação do padrão respiratório para verificar a necessidade de administração de oxigênio.
- (D) Medição dos perímetros cefálico e braquial para avaliar a idade gestacional.
- (E) Avaliação da dor para verificar se alterações fisiológicas decorrem desse sinal.

02. Ambiente termoneutro é aquele que fornece as condições térmicas necessárias para assegurar o menor consumo de energia do recém-nascido, utilizando o mínimo de calor e oxigênio.

Considere as condutas abaixo.

- I - Propiciar aquecimento adicional, com cobertas e lâmpadas aquecidas.
- II - Ajustar temperatura da incubadora 1º C a 1,5º C acima da temperatura do recém-nascido, nas primeiras horas de aquecimento.
- III- Oferecer dieta logo que possível para evitar hipoglicemia.

Indique a alternativa que apresenta a(s) conduta(s) necessária(s) para manter o recém-nascido em um ambiente termoneutro.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. A utilização do oxímetro de pulso constitui-se em um método não invasivo que avalia a oxigenação dos tecidos através da espectrometria infravermelha; reflete a saturação de oxigênio da hemoglobina. Em recém-nascidos, os eletrodos devem ser colocados

- (A) no lóbulo da orelha.
- (B) no dedo polegar do membro superior direito.
- (C) nas extremidades ou dígitos.
- (D) nos membros inferiores.
- (E) no pulso direito.

04. O leite materno é o melhor alimento para todo o recém-nascido, devido ao seu valor nutricional e imunológico. Além destes benefícios, há também os efeitos psicológicos para o binômio mãe e filho, que contribuem gradativamente para o desenvolvimento do elo afetivo. As mães de neonatos prematuros são privadas desta etapa do desenvolvimento de sua relação com o bebê, pois não é possível amamentá-lo. Porém, algumas atitudes de toda a equipe de saúde devem contribuir para que estas mães realizem ordenha de seu leite para ser oferecido ao recém-nascido, tão logo isso seja considerado adequado pela equipe médica.

Assinale a alternativa abaixo que corresponde a procedimentos que a equipe de enfermagem deve indicar às mães para incentivá-las a esgotarem suas mamas e manterem a lactação pelo tempo de internação do neonato prematuro.

- (A) Estimular a mãe a esgotar as mamas no banco de leite ou em casa, em períodos curtos, como se o seu bebê estivesse sendo amamentado.
- (B) Estimular a mãe a esgotar as mamas somente no banco de leite para evitar contaminação.
- (C) Estimular a mãe a esgotar as mamas com esgotadeira elétrica, porque é mais fácil.
- (D) Estimular a mãe a só esgotar as mamas em casa, pois na UTI Neonatal ela deve permanecer todo o tempo com seu bebê.
- (E) Estimular a mãe a esgotar as mamas após sua alta hospitalar, pois nos primeiros dias após o nascimento ainda não há produção de leite materno.

05. Considera-se hipoglicemia quando os níveis de glicose na punção capilar estão abaixo de 40mg/dl. Assinale a alternativa correta no que se refere a esse quadro clínico em recém-nascidos a termo.

- (A) Tremores, sudorese e taquicardia.
- (B) Tremores, hipotermia e taquipneia.
- (C) Hipotermia, irritabilidade e hiponatremia.
- (D) Irritabilidade, choro estridente e hipocalcemia.
- (E) Tremores, cianose e hiperglicemia.

06. A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Canguru) é uma norma do Ministério da Saúde aplicada nas Unidades Médico Assistenciais Integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Método Canguru é o tipo de assistência neonatal que implica o contato pele a pele entre a mãe e o bebê de baixo peso, permitindo maior participação dos pais no cuidado com o recém-nascido. Considerando-se o acima exposto, assinale a afirmação correta.

- (A) O Método Canguru se restringe ao contato pele a pele da mãe com o recém-nascido.
- (B) O Método Canguru tem por objetivo único economizar recursos humanos e recursos técnicos.
- (C) O Método Canguru depende da segurança dos pais e da estabilidade do recém-nascido.
- (D) O Método Canguru só pode ser aplicado a partir da 4ª semana após o nascimento do bebê.
- (E) O Método Canguru é substitutivo das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e das Incubadoras.

07. A coloração da pele amarelada, chamada de icterícia, pode ser fisiológica, geralmente sem comprometimento do estado geral do recém-nascido, ou patológica. O tratamento para os casos de icterícia é feito através de fototerapia, porém alguns efeitos colaterais podem ocorrer a partir dessa terapia. Assinale a alternativa correta no que se refere a efeitos reativos à fototerapia.

- (A) Hiperglicemia, diarreia e kernicterus.
- (B) Hipotermia, irritação da pele e hipotireoidismo.
- (C) Hipopituitarismo, irritação da pele, diarreia e dificuldade de sucção.
- (D) Irritação da pele, aumento das perdas insensíveis de água, diarreia e hipertermia.
- (E) Aumento das perdas insensíveis de água, irritabilidade, hidropsia e anemia.

08. A Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN), também conhecida como Síndrome do "Pulmão Úmido", ocorre devido à retenção do fluido pulmonar fetal geralmente em pacientes a termo ou próximo do termo. Assinale a alternativa correta no que se refere aos sinais apresentados por paciente que chega à UTI Neonatal com TTRN.

- (A) Gemidos expiratórios, cianose e taquipneia.
- (B) Respiração gemente, hipoglicemia e taquicardia.
- (C) Retração intercostal, taquipneia e hiponatremia.
- (D) Gemidos expiratórios, hipoglicemia e taquicardia.
- (E) Retração intercostal, cianose e hipoglicemia.

09. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem que devem ser tomados com paciente que apresenta TTRN na chegada à UTI Neonatal.

- (A) Verificar sinais vitais, dar banho e administrar vitamina K.
- (B) Verificar sinais vitais, instalar oxímetro de pulso e administrar vacina da Hepatite B.
- (C) Instalar oxímetro de pulso e administrar dieta para evitar hipoglicemia.
- (D) Administrar oxigênio, se necessário, verificar frequência respiratória e manter normotermia.
- (E) Administrar oxigênio, se necessário, realizar hemoglicoteste e oferecer dieta.

10. Considere as afirmações abaixo no que se refere à Humanização, vista não como programa, mas como política pública que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS.

- I - Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.
- II - Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um sentido positivo de humanização.
- III- Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. Considere as alternativas abaixo no que se refere aos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH).

- I - Transversalidade, indissociabilidade entre gestão e atenção, protagonismo dos sujeitos e coletivos.
- II - Transversalidade, gestão sindical, protagonismo dos sujeitos e coletivos.
- III- Transversalidade, gestão de financiamento, protagonismo dos sujeitos e coletivos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

12. O Sistema Único de Saúde (SUS), que é vigente em todo o território nacional, é constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde sob gestão pública, organizados em redes regionalizadas e hierarquizadas. Considere as alternativas abaixo no que se refere aos princípios norteadores do SUS.

- I - Universalidade, integralidade, equidade, participação social e descentralização.
- II - Universalidade, integralidade, iniquidade, participação social e descentralização.
- III- Universalidade, interdisciplinaridade, participação social e descentralização.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

13. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS).

- I - A Lei 8.080, de 19 de Setembro de 1990, instituiu o SUS e estabeleceu as diretrizes para o seu gerenciamento e descentralização.
- II - O setor privado participa do SUS em caráter complementar.
- III- O SUS conta com as seguintes instâncias colegiadas, em cada esfera de governo: conferência de saúde e conselho de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

14. Os registros de enfermagem são informações sobre todas as intercorrências e todos os cuidados prestados pelo técnico de enfermagem durante o processo de cuidado. Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere aos registros de enfermagem.

- (A) Fornecem dados para pesquisas na área da saúde.
- (B) Revelam como o paciente está evoluindo em seu tratamento.
- (C) Constituem um modo de comunicação eficiente entre os membros da equipe de saúde que cuidam do paciente.
- (D) Oferecem subsídios para a avaliação da qualidade da assistência prestada.
- (E) São dispensáveis em algumas situações de cuidado ao paciente.

15. O técnico de enfermagem é o profissional que possui diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no Conselho Regional de Enfermagem (COREn) de sua região. Compete ao técnico de enfermagem:

- (A) Prestar assistência de enfermagem a pacientes graves sob a supervisão do enfermeiro.
- (B) Elaborar a prescrição de enfermagem.
- (C) Assumir atividades assistenciais privativas do enfermeiro na ausência desse profissional.
- (D) Supervisionar a assistência de enfermagem prestada pela equipe de enfermagem.
- (E) Realizar histórico de enfermagem na admissão do paciente em unidade hospitalar.

16. De acordo com o estudo "Perfil de ações do Técnico de Enfermagem no Brasil", ABEn, Brasília, 2002, são ações realizadas pelo técnico de enfermagem:

- I - Preparar, instalar e controlar venóclise.
- II - Realizar cuidados com pacientes em ventilação mecânica.
- III- Preparar Nutrição Parenteral Total (NPT).

Quais alternativas estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

17. Em um serviço de saúde, para que aconteça a transmissão de um patógeno que resulte em colonização ou infecção, estão implicados três elementos. Entre eles está(ão)

- (A) um hospedeiro suscetível.
- (B) as medidas de precaução.
- (C) a limpeza.
- (D) a desinfecção.
- (E) os cuidados ambientais.

18. Considere as afirmações abaixo quanto às finalidades do uso de luvas pelo profissional de enfermagem.

- I - A luva forma uma barreira e previne a contaminação das mãos no contato com sangue e fluidos corporais.
- II - A luva reduz a possibilidade de transmitir os microorganismos das mãos do profissional para o paciente durante um procedimento.
- III- A luva reduz o risco de transmitir os microorganismos adquiridos pelo contato com um paciente ou objeto para outro paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. O artigo 82 do Código de Ética da Enfermagem Brasileira refere que é responsabilidade e dever do profissional manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.

Considere as afirmações abaixo no que se refere às responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem.

- I - O profissional poderá revelar o fato sigiloso quando for necessário à prestação de assistência em atividade multiprofissional.
- II - O profissional fica liberado de manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento, quando o fato é de conhecimento público.
- III- O profissional, quando intimado como testemunha, deverá comparecer perante autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar informações confidenciais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II.
- (E) I, II e III.

20. A quimioterapia consiste na utilização de substâncias químicas com o objetivo de tratar neoplasias. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Antes da administração dos quimioterápicos, devemos verificar o estado físico, cognitivo e emocional do paciente e dos familiares.
- (B) A equipe de enfermagem deve pesquisar reações alérgicas.
- (C) O técnico de enfermagem deve conferir, juntamente com o enfermeiro, o nome das drogas, a dosagem, via de administração, velocidade e sequência de infusão, data do início do tratamento, drogas e soros pré-quimioterapia.
- (D) Devemos seguir a prescrição médica dos quimioterápicos mesmo que algum item pareça diferente do usual, pois cada paciente utiliza um protocolo de tratamento.
- (E) A terapêutica antiemética deve iniciar na manhã do dia da aplicação da quimioterapia ou até mesmo no dia anterior.

21. Considere as seguintes afirmações sobre a administração de quimioterápicos via intramuscular (IM) e subcutânea (SC):

- I - A toxicidade dermatológica local impede a aplicação intramuscular e subcutânea de grande parte dos quimioterápicos, além disso, essas vias promovem uma absorção mais lenta e menos precisa.
- II - São exemplos de quimioterápicos que somente podem ser aplicados via IM: asparaginase, ciclofosfamida, citarabina e metotrexato.
- III- A filgrastima, droga mieloestimulante, pode ser utilizada via SC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.



22. Considerando que a via endovenosa é a via mais comum de administração da terapêutica oncológica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Devemos evitar a aplicação simultânea de mais de um quimioterápico devido ao risco de reações de incompatibilidade.
- (B) O ideal é que a veia periférica recém-puncionada receba o soro com quimioterápico.
- (C) Os quimioterápicos sob infusão contínua devem estar diluídos em soro (glicosado 5%, fisiológico 0,9%, água destilada com eletrólitos ou manitol).
- (D) Podemos infundir exclusivamente o soro contendo quimioterápico, ou paralelamente a outro soro de hidratação com o auxílio de um equipo conector em Y.
- (E) Quimioterápicos vesicantes não devem ser administrados sob infusão contínua através da rede venosa periférica sem o recurso de um cateter central.

23. Considere as seguintes afirmações sobre cateteres venosos:

- I - Na escolha do melhor cateter, um dos fatores mais importantes a ser considerado é o tipo de tratamento.
- II - O cateter mais recomendado é aquele que apresenta o menor risco de complicações e o menor custo, sendo o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) uma alternativa para cateter de longa permanência.
- III- É recomendável a implantação de cateter de dois lúmens, pois o mesmo proporciona mais opções de vias venosas para o manejo do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

24. Considere as afirmações a respeito dos quimioterápicos, assinando **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução 257/2001, determina ao enfermeiro a administração de drogas quimioterápicas, podendo esse repassar o procedimento aos técnicos de enfermagem sob sua supervisão.
- () O controle da infusão pode ser assumido pelo profissional técnico de enfermagem em apoio operacional ao enfermeiro quando o mesmo estiver ausente no setor, durante o tempo de infusão.
- () As drogas antineoplásicas podem ser administradas pelas seguintes vias: oral, intramuscular, subcutânea, endovenosa, intra-arterial, intratecal, intrapleural, intraperitoneal, intravesical, intracavitária e tópica.
- () A via oral, frequentemente menos tóxica, pode ser utilizada em pacientes cujo trato gastrointestinal apresenta anormalidades.
- () O manuseio dos quimioterápicos orais dispensa o uso de luvas, pois, sendo esses menos tóxicos, exigem apenas a lavagem de mãos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – F – F.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) V – F – V – V – V.

25. No que se refere à quimioterapia, considere as afirmações abaixo.

- I - Imunodepressão, leucopenia, trombocitopenia e fragilidades cutânea e vascular, decorrentes da própria doença e do tratamento quimioterápico, exigem cuidados especiais e rigores absolutos de assepsia.
- II - A aplicação de fricção excessiva e calor no local puncionado proporcionam uma maior e melhor absorção da droga.
- III- Em relação às vias oral, intramuscular e subcutânea, a aplicação endovenosa é mais segura no que se refere ao nível sérico da droga e sua absorção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

26. No que se refere a complicações na administração de quimioterápicos, considere as afirmações abaixo.

- I - Quimioterápicos irritantes provocam lesões severas com formação de vesículas e destruição tecidual quando extravasados, ou seja, infiltrados fora do vaso sanguíneo.
- II - Quimioterápicos vesicantes causam reações cutâneas menos intensas quando extravasados, ou seja, infiltrados fora do vaso sanguíneo.
- III- Dor, flebite, vasoespasmos e hiperpigmentação são complicações locais da administração de quimioterápicos através da rede venosa periférica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

27. Considere as seguintes afirmações quanto a manuseio, curativos e desinfecção dos cateteres e de suas conexões.

- I - Recomenda-se o uso profilático rotineiro de antimicrobianos antes da inserção de cateteres ou durante o uso dos mesmos, quer sob forma de pomada, para aplicação no sítio de saída, ou em solução no interior do lúmen.
- II - O curativo deve ser trocado sempre que estiver sujo, úmido, descolando ou quando for necessário para visualização do sítio de inserção.
- III- A área de inserção do cateter deve ser protegida por um curativo com gaze seca estéril ou película transparente, materiais que demonstram igual eficácia em proteção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

28. As alternativas abaixo correspondem a complicações que podem ocorrer em uma criança, no pós-operatório de traqueostomia. Assinale a alternativa correta para o pós-operatório imediato:

- (A) Inapetência.
- (B) Hemorragia.
- (C) Hipotireoidismo.
- (D) Desidratação.
- (E) Alteração do sensório.

29. No que se refere aos cateteres venosos centrais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A oclusão é uma das complicações menos frequentes do cateter venoso central.
- (B) A infecção é uma das complicações mais comuns dos cateteres venosos centrais.
- (C) Se um cateter venoso central for removido acidentalmente, deve-se aplicar pressão no ponto de inserção.
- (D) A maioria dos cateteres venosos centrais de inserção periférica (PICC) não é suturada no local de inserção.
- (E) Os cateteres totalmente implantados são heparinizados mensalmente e depois de cada terapia para manter sua permeabilidade.

30. No que se refere ao controle da dor, considere as afirmações abaixo.

- I - O alívio da dor é uma necessidade básica.
- II - Quando o alívio da dor ocorrer via peridural, a respiração tem pouca importância na monitorização dos sinais vitais.
- III- A constipação é um efeito colateral comum e por vezes sério de opioides como morfina e fentanil.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

31. Assinale a alternativa abaixo que descreve dois sinais de infecção de lesão cutânea.

- (A) Eritema intenso e exudato purulento.
- (B) Dor e diarreia.
- (C) Temperatura elevada e inapetência.
- (D) Edema e prurido.
- (E) Exudato purulento e diarreia.

32. Considere as afirmações abaixo no que se refere a pacientes diabéticos.

- I - Os episódios de hipoglicemia ocorrem com mais frequência antes das refeições.
- II - A respiração rápida e profunda é uma das manifestações da hiperglicemia.
- III- A cetoacidose diabética é uma manifestação que pode ser tratada em nível ambulatorial.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

33. Quanto aos cuidados com pacientes com dreno de tórax, assinale a alternativa correta.

- (A) Estimular deambulação.
- (B) Anotar o volume de drenagem é irrelevante para o balanço hídrico.
- (C) Ordenhar o extensor de hora em hora quando se operar drenagem de coágulos.
- (D) O frasco coletor pode ser elevado acima do leito, sem necessidade de pinçamento do extensor.
- (E) Manter o leito em Trendelenburg.

34. Com relação aos cuidados na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração de medicamentos por via oral pode ser feita ainda que o paciente esteja inconsciente e com dificuldade de deglutição.
- (B) A administração tópica é a aplicação direta dos medicamentos na pele ou nas mucosas ocular, nasal, intramuscular e retal.
- (C) Após a via endovenosa, a via retal é a que apresenta maior absorção.
- (D) Quando há necessidade de aplicação frequente de injeções subcutâneas, é recomendado que as mesmas sejam aplicadas sempre no mesmo local, o que permite melhor absorção.
- (E) A via intramuscular é muito utilizada, por não estar sujeita a complicações como abscessos, necrose, lesão de nervos e lesão de vasos sanguíneos.

35. Considere as afirmações abaixo sobre cuidado de enfermagem na hospitalização da criança e do adolescente.

- I - Buscar compreender as diferentes reações da criança, do adolescente e da família frente à doença e à hospitalização (medo, depressão, hostilidade) é uma atitude adequada.
- II - Atender a criança e o adolescente, respeitando sua maneira de ser e suas diferenças, é prestar assistência individualizada.
- III- Oportunizar o brincar, permitir que a criança traga um brinquedo ou objeto de casa, faz parte do cuidado de enfermagem.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.