MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

**PS 11 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
(Biologia Molecular)**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

Planejamento e Execução:

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 11

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO (Biologia Molecular)

1.	B	11.	ANULADA	21.	E
2.	A	12.	A	22.	B
3.	C	13.	D	23.	B
4.	C	14.	D	24.	A
5.	C	15.	E	25.	D
6.	E	16.	A		
7.	E	17.	ANULADA		
8.	C	18.	D		
9.	B	19.	C		
10.	D	20.	A		

EDITAL Nº 02/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 11 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO (Biologia Molecular)

INSTRUÇÕES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
2. Esta PROVA consta de 25 questões objetivas.
3. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
4. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
5. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
6. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
7. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
8. A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
9. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Métodos de coleta, transporte, processamento e armazenamento adequados das amostras clínicas são essenciais para garantir resultados confiáveis nos testes laboratoriais de Biologia Molecular. A integridade dos ácidos nucleicos deve ser mantida por meio desses processos, pois resultados confiáveis só são possíveis quando espécimes adequados são obtidos.

Considerando as informações citadas, assinale a afirmativa correta.

- (A) Para conservar adequadamente as amostras, acrescenta-se uma quantidade entre 5 – 20 U/mL das enzimas RNase ou DNase, as quais agem preservando a integridade do ácido nucleico.
- (B) Amostras contendo patógenos de genoma RNA podem ser estocadas por longos períodos, desde que mantidas à temperatura de -70 °C.
- (C) O transporte das amostras deve ser realizado em meio de transporte bacteriológico para manter a viabilidade dos patógenos.
- (D) O tempo entre a coleta e o armazenamento da amostra não tem interferência sobre a integridade dos ácidos nucleicos.
- (E) O anticoagulante de escolha para coleta de amostra de plasma a ser utilizado na rotina do Laboratório de Biologia Molecular é a heparina sódica.

02. Considerando os conceitos de Biologia Molecular, relacione as colunas.

- (1) Enzima de restrição
 - (2) Nucleosídeo
 - (3) DNA complementar (cDNA)
 - (4) Nucleotídeo
 - (5) Sonda genética
 - (6) Desnaturação do DNA
-
- () Seqüência de nucleotídeos em fita simples, total ou parcialmente complementar a um ácido nucleico-alvo (que se deseje marcar ou identificar), utilizado em técnicas de hibridização.
 - () Composto contendo um açúcar, uma base nitrogenada e de um até três grupos fosfatos, ligados ao carbono 5' da pentose.
 - () Processo que ocorre quando as pontes de hidrogênio entre as cadeias complementares do DNA são rompidas e as fitas se separam.
 - () Endonuclease capaz de reconhecer uma seqüência de bases específica na dupla-hélice de DNA, cortando ambas as fitas da hélice em lugares determinados.
 - () Seqüência de desoxirribonucleotídeos sintetizada a partir de uma molécula de RNA em uma reação catalisada pela enzima transcriptase reversa.
 - () Molécula composta por um açúcar (desoxirribose ou ribose) e uma base nitrogenada.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta dos números na coluna inferior, de cima para baixo.

- (A) 5 – 4 – 6 – 1 – 3 – 2.
- (B) 5 – 2 – 6 – 1 – 3 – 4.
- (C) 4 – 5 – 6 – 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 4 – 5 – 6 – 1 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

03. A Reação em Cadeia da Polimerase (*Polymerase Chain Reaction* – PCR) tornou-se uma metodologia essencial em muitos laboratórios de pesquisa e de rotina clínica. Por meio do uso da PCR, uma grande variedade de doenças infecciosas, doenças crônicas e doenças genéticas podem ser diagnosticadas, tendo sido desenvolvidas diversas variações na técnica de PCR para melhorar a *performance* do método.

Em relação aos diferentes tipos de PCR, pode-se afirmar que

- I - *Multiplex*-PCR utiliza, na mesma reação, dois ou mais conjuntos de *primers* desenhados para amplificação de diferentes alvos que amplifiquem fragmentos com diferentes tamanhos.
- II - *Nested*-PCR é a técnica na qual se faz a adição da enzima DNA-polimerase, quando a mistura já atingiu certa temperatura.
- III - RT-PCR (*Reverse Transcriptase* – PCR) é a técnica em que, além da DNA-polimerase, é usada a enzima transcriptase reversa, sendo esse método utilizado para amplificar alvos cujo genoma é o RNA.

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Em relação às condições para a amplificação de DNA na reação de PCR, pode-se afirmar que

- I - a concentração final de $MgCl_2$ pode variar de 0,5 – 5 mM. Os íons Mg^{2+} formam um complexo solúvel com os dNTPs (desoxirribonucleotídeos trifosfatos) que são essenciais para a incorporação destes nucleotídeos à fita de DNA.
- II - excesso de Mg^{2+} pode resultar em uma reação com acúmulo de produtos inespecíficos.
- III - a temperatura de anelamento do *primer* é específica e deve ser calculada por meio de fórmulas matemáticas; no entanto, este cálculo fornece apenas uma temperatura aproximada a qual deve ser testada empiricamente. Quando se utilizam altas temperaturas de anelamento, a reação pode ter baixa especificidade e sensibilidade.
- IV - o desenho do *primer* é essencial para a otimização da PCR, devendo-se, para tanto, observar algumas características, como o conteúdo total de resíduos C e G (citosina e guanina). Também devem-se evitar *primers* complementares entre si e com a terminação 3' rica em resíduos repetidos de C e G.

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

05. As técnicas moleculares consistem, em geral, de três passos principais: processamento da amostra (isolamento, purificação), amplificação do ácido nucléico e detecção do produto amplificado.

Considere as seguintes técnicas para detecção do produto amplificado.

- I - Os produtos amplificados podem ser migrados em gel de agarose, transferidos para uma membrana de nitrocelulose e hibridizados com sonda específica, o que aumenta a sensibilidade e especificidade da detecção.
- II - A combinação de PCR e do método de interrupção da amplificação com didesoxinucleotídeos pode ser usada para a detecção de seqüências de DNA em amostras clínicas (seqüenciamento). Como exemplo, citam-se os testes utilizados para verificar a resistência do HIV-1 a drogas e genotipagem do HCV.
- III - DNAs *microarrays* podem ser produzidos pela fixação de centenas de oligonucleotídeos em suporte sólido com padrões precisos (sonda), onde os produtos amplificados e marcados são hibridizados. A detecção é feita por um sistema informatizado que capta os sinais de hibridização, os quais são mapeados nas posições da seqüência-alvo.
- IV - O método mais simples e sensível de detecção do DNA amplificado é a visualização do produto pela fluorescência do brometo de etídeo ligado ao DNA durante a eletroforese.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

06. Uma modificação da reação de PCR usada para diagnóstico clínico é a *Nested*-PCR.

A respeito dessa reação, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) dois pares de *primers* são utilizados em duas reações diferentes e seqüenciais. Na primeira reação, utiliza-se DNA ou RNA de amostra clínica; na segunda reação, pipeta-se uma alíquota da primeira reação.
- (B) a sensibilidade da amplificação pela técnica de *Nested*-PCR é maior do que a PCR não-*Nested*.
- (C) sua desvantagem é a necessidade de se abrir o tubo e transferir o produto já amplificado na primeira reação; a formação de aerossóis nessa etapa é muito freqüente, podendo ocorrer contaminação.
- (D) os pares de *primers* da reamplificação são internos aos da primeira reação, utilizando-se o DNA gerado como alvo.
- (E) os *primers* da primeira reação devem ter a mesma temperatura de anelamento que os *primers* da segunda reação, caso contrário, não ocorre o anelamento no produto amplificado inicialmente.

07. Reações de PCR são muito utilizadas para diagnóstico de doenças infecciosas, porém reações baseadas em amplificação de DNA e RNA trazem como desvantagem a possibilidade de contaminação ambiental com produto amplificado (*amplicons*).

Podem ser consideradas como medidas preventivas de contaminação ambiental:

- I - a divisão dos ambientes do Laboratório de Biologia Molecular em áreas pré- e pós-amplificação, fisicamente separadas.
- II - o uso de luvas somente para manipulação das amostras clínicas.
- III - o uso de alíquotas de reagentes para não abrir repetidamente frascos contendo tampões, nucleotídeos ou *primers*.
- IV - o uso de luz ultravioleta de baixo comprimento de onda para tratamento da área de trabalho, além de tratar a mistura de reagentes da amplificação previamente à adição de DNA da amostra clínica, visto que a luz UV modifica fotoquimicamente a estrutura dos ácidos nucléicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

08. A etapa de isolamento/purificação do ácido nucléico-alvo é bastante importante nos testes moleculares, principalmente para amostras contendo interferentes, já que a purificação visa a eliminá-los. A presença de inibidores da enzima DNA-polimerase na amostra pode levar os testes moleculares a resultados falso-negativos.

Considerando esse contexto, relacione as colunas, indicando a função de cada um dos reagentes.

- (1) Proteinase K
- (2) Tiocianato de guanidina
- (3) Etanol
- (4) Sílica
- (5) SDS

- () Agente que desnatura proteínas e é um forte inibidor de RNases.
- () Agente desnaturante que promove a precipitação do DNA.
- () Enzima proteolítica utilizada para quebra de membrana celular e nuclear e exposição do DNA ou RNA genômico.
- () Tensoativo utilizado, freqüentemente, para promover a lise de membranas celulares e nucleares.
- () Agente ligante do DNA/RNA, usado nos métodos de purificação para facilitar lavagens de substâncias interferentes ou inibidoras da DNA- polimerase.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta dos números na coluna inferior, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
- (C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (D) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (E) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.

09. A expansão das técnicas de transplante de órgãos, a introdução de novos antineoplásicos, bem como o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) tiveram como consequência o aumento do número de pacientes imunocomprometidos, suscetíveis a infecções oportunistas, como é o caso do CMV (citomegalovírus). A maioria das infecções pelo CMV nos imunodeprimidos deve-se à reativação de uma infecção latente, e o diagnóstico de citomegalovirose por testes sorológicos, nestes casos, pode ser inconclusivo. A demonstração da presença do vírus no órgão acometido seria a melhor maneira de comprovar a participação do CMV no quadro clínico; entretanto, muitas vezes não se dispõe de biópsias para executar esta pesquisa. Nessas situações, demonstrar a viremia positiva é uma alternativa, já que existe boa correlação entre viremia positiva e doença invasiva pelo CMV.

Considerando esse contexto, assinale a afirmativa correta.

- (A) Para demonstrar viremia, podem-se utilizar amostras de urina, lavado gástrico e lavadobroncoalveolar.
- (B) Pode-se pesquisar viremia para CMV em amostras de sangue periférico submetidas a um processo de separação de leucócitos, nas quais é realizada a PCR, amplificando o DNA do CMV.
- (C) A pesquisa de viremia para CMV pode ser realizada pela técnica de RT-PCR por tratar-se de um vírus cujo genoma é formado por RNA.
- (D) A única alternativa para demonstrar viremia para CMV é a pesquisa direta de antígenos do CMV em neutrófilos circulantes (técnica da antigenemia).
- (E) A técnica de hibridização, por ser facilmente realizada e com um custo bastante baixo, é a única escolha para pesquisa de viremia para CMV na rotina laboratorial.

10. Para realização de exames laboratoriais por meio de técnicas de Biologia Molecular com obtenção de resultados confiáveis, é importante considerar qual amostra clínica deve ser obtida do paciente. A escolha do material clínico está diretamente relacionada às características do patógeno e dos sítios que esse preferencialmente infecta, circula e/ou é excretado.

Considerando esse contexto, associe a amostra clínica ao X patógeno, relacionando as colunas.

(1) Soro	() HBV
(2) Urina	() Herpes simples
(3) Liquor	() CMV
(4) Escarro	() HCV
	() <i>M. tuberculosis</i>
	() Enterovírus

A seqüência correta da numeração, na coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2.
- (B) 3 – 2 – 2 – 1 – 3 – 4.
- (C) 2 – 2 – 1 – 3 – 1 – 4.
- (D) 1 – 3 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 1.

11. O teste de diagnóstico para micobactérias mais barato e rápido é o exame direto do material clínico e a identificação dos bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR). A cultura é o diagnóstico definitivo, no entanto, por ser um processo muito demorado, outra alternativa pode ser a reação de PCR.

A respeito dessa forma diagnóstica, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) lavado gástrico, urina e líquido pleural são algumas amostras clínicas utilizadas para o diagnóstico de tuberculose.
- (B) uma das dificuldades para se identificar *M. tuberculosis* por PCR é o processo de extração do DNA desse patógeno.
- (C) a seqüência de inserção IS6110 é específica para o complexo *M. tuberculosis* e é utilizada com mais frequência porque está presente no genoma até vinte vezes, oferecendo alvos múltiplos para a amplificação.
- (D) a técnica de PCR permite identificar a espécie e avaliar a sensibilidade do *M. tuberculosis* aos tuberculostáticos em escarro e a outros materiais biológicos.
- (E) os métodos comerciais são altamente específicos e muito efetivos para diagnóstico de *M. tuberculosis* em amostras de escarro BAAR-negativos.

12. Sobre o programa de controle de qualidade implantado em um Laboratório de Biologia Molecular, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) As amostras destinadas para os ensaios de proficiência não podem ser analisadas por aqueles que habitualmente realizam as análises em questão.
- (B) A garantia da qualidade das amostras clínicas, a participação em programas externos de monitoramento da qualidade e a inclusão de procedimentos operacionais-padrão são alguns dos elementos básicos do programa de controle de qualidade.
- (C) A frequência das provas de controle de qualidade dos produtos comerciais utilizados no laboratório deve ser realizada conforme instruções dos respectivos fabricantes ou referências em literatura.
- (D) O valor e a precisão clínica das análises do material biológico e de seu resultado final são dependentes do programa de controle de qualidade, uma vez que também permitem monitorar todas as etapas dos testes.
- (E) É necessário estabelecer um programa de manutenção preventiva para assegurar o funcionamento apropriado de todos os equipamentos elétricos ou mecânicos.

13. Atualmente, sabe-se da existência de cinco vírus (A, B, C, D e E) causadores dos principais tipos de hepatites virais. A hepatite é hoje considerada um importante problema de saúde pública. Por exemplo, a hepatite B – causada pelo HBV (vírus da hepatite B) – é a nona causa de morte no mundo apesar da vacinação, e a hepatite C – anteriormente conhecida como não-A e não-B – traz grandes problemas ao paciente portador do HCV (vírus da hepatite C) devido a sua grande tendência à cronicidade.

Em relação ao diagnóstico molecular das hepatites B e C, é correto afirmar que

- (A) a PCR não é utilizada para o diagnóstico molecular do HCV e HBV, já que não existe necessidade de amplificar o genoma viral para realizar sua detecção.
- (B) as técnicas de genotipagem são empregadas com a finalidade de detecção direta dos vírus HCV e HBV, sendo, assim, utilizadas somente para confirmar a infecção viral.
- (C) os testes moleculares permitem avaliar o tipo e o grau de comprometimento hepático causado pelo HCV e HBV.
- (D) os testes moleculares são empregados para confirmação da infecção viral no seguimento de pacientes com formas crônicas e também na avaliação terapêutica daqueles pacientes em tratamento.
- (E) as técnicas de hibridização, como, por exemplo, a técnica de *branched-DNA* (b-DNA), são utilizadas no diagnóstico molecular das hepatites B e C por amplificar a seqüência-alvo do genoma viral.

14. Em relação à técnica de amplificação de sinal para detecção molecular de microrganismos, assinale a afirmativa correta.

- (A) É um ensaio de hibridização em fase semi-sólida, tipo sanduíche.
- (B) A leitura do teste é realizada por espectrofotometria.
- (C) A amplificação de seqüência-alvo depende de processos enzimáticos.
- (D) O sinal amplificado é diretamente proporcional à quantidade de seqüências-alvo presentes numa amostra clínica.
- (E) Essa técnica necessita de extração do DNA e/ou RNA.

15. O princípio da PCR é surpreendentemente simples e está relacionado ao processo de replicação de material genético que ocorre *in vivo* durante a divisão celular. Existem algumas regras básicas para o processo de replicação que podem ser aplicadas a todos os organismos procariotos e eucariotos.

Em relação a essas regras *in vivo*, é correto afirmar que

- (A) o movimento da forquilha de replicação pode ser em uma ou duas direções, e o sentido da adição dos nucleotídeos é sempre 3' → 5'.
- (B) a replicação de DNA ocorre de forma contínua nas duas fitas de DNA.
- (C) a DNA-polimerase é a enzima que faz a síntese de uma nova fita de DNA; esta enzima possui a capacidade de adicionar nucleotídeos na região carboxiterminal da pentose.
- (D) a DNA-polimerase vai adicionar sempre uma base púrica complementar a uma base pirimídica da fita-molde, sendo as combinações possíveis C – A e I – G.
- (E) as duas fitas do DNA são copiadas durante a replicação, originando moléculas-filhas pelo processo chamado semiconservativo, pois somente uma das fitas é nova, recém-sintetizada.

16. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva causada por mutações do gene CFTR, caracterizada pela supersecreção de muco, o que acarreta bloqueio das vias respiratórias. A seqüência do gene mutado pode ser utilizada como instrumento diagnóstico em uma técnica de hibridização chamada *Southern blotting*.

Assinale a afirmativa correta sobre a metodologia empregada para esse método.

- (A) A técnica de *Southern blotting* pode ser utilizada para visualização de DNA *fingerprintings*, que são RFLPs separados por eletroforese.
- (B) O DNA é inicialmente digerido por enzimas de restrição, sendo os fragmentos clonados em um plasmídeo.
- (C) As enzimas de restrição são utilizadas, uma vez que reconhecem e clivam apenas uma determinada seqüência no DNA, formando, assim, dois fragmentos de DNA.
- (D) Os fragmentos produzidos pelas enzimas, os RFLPs, são marcados com biotina e, posteriormente, separados por eletroforese.
- (E) Sondas marcadas radioativamente são hibridizadas ao DNA no gel de eletroforese realizado.

17. A medida da carga viral do HIV pode ser realizada por

- (A) teste de imunofluorescência indireta.
- (B) reação em cadeia da polimerase com amplificação da transcriptase reversa.
- (C) teste de Westernblot.
- (D) contagem de células T CD4.
- (E) *nested*-PCR.

18. O resultado da quantificação da carga viral do HIV é expresso em número de cópias do

- (A) HIV/dL de plasma.
- (B) HIV/mL de plasma.
- (C) HIV/mL de sangue.
- (D) HIV/mL de plasma e $\log_{10}$ (logaritmo na base 10).
- (E) HIV/mL de sangue e $\log_{10}$ (logaritmo na base 10).

19. A medida da carga viral do HIV **NÃO** é usada para

- (A) marcar a mudança do tratamento com anti-retrovirais.
- (B) avaliar a velocidade da progressão da doença.
- (C) detectar mutações genéticas do vírus.
- (D) avaliar a velocidade da perda de células T CD4.
- (E) avaliar a destruição do sistema imunológico.

20. Relacione as colunas considerando os principais marcadores laboratoriais para o HIV.

- (1) Contagem de células T CD4
- (2) Método de amplificação de sinal (b-DNA)
- (3) Testes de resistência viral
- (4) Método de amplificação baseada na sequência de ácidos nucleicos (NASBA)

- () Quimioluminescência
- () Detecção de mutações
- () Amplificação isotérmica
- () Citometria de fluxo

A ordem correta dos números na coluna inferior, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

21. O HIV, em ambiente externo, pode ser inativado rapidamente por

- I - água oxigenada;
- II - água sanitária;
- III - glutaraldeído;
- IV - álcool;
- V - calor.

Quais agentes estão corretos?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

22. Segundo a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio), os laboratórios clínicos e de diagnóstico que manipulam amostras com HIV são classificados, conforme o nível de biossegurança e potencial patogênico desse organismo, respectivamente, em

- (A) nível 1 e classe de risco 2.
- (B) nível 2 e classe de risco 3.
- (C) nível 3 e classe de risco 3.
- (D) nível 3 e classe de risco 4.
- (E) nível 4 e classe de risco 4.

23. A utilização de cabine de segurança biológica classe II durante os procedimentos operacionais que envolvem a manipulação de amostras na técnica de carga viral para o HIV é adequada porque

- (A) todas as técnicas de quantificação do RNA do HIV geram *amplicons* que contaminam o ambiente.
- (B) esse tipo de cabine protege o operador, os materiais por ele utilizados e o meio ambiente.
- (C) a cabine é hermeticamente fechada e impermeável a gases.
- (D) a temperatura elevada da cabine impede o crescimento bacteriano, evitando a contaminação das amostras biológicas.
- (E) 80% do ar circulante na cabine é filtrado por um filtro HEPA.

24. Considerando o monitoramento e a avaliação do paciente com sorologia positiva para HIV, analise as afirmações abaixo.

- I - A utilização de medicamentos anti-retrovirais é capaz de manter a carga viral baixa, diminuindo os danos causados pelo vírus no organismo e aumentando a sobrevivência de um indivíduo soropositivo.
- II - As infecções oportunistas no paciente com AIDS somente são causadas por microrganismos potencialmente patogênicos.
- III - Os pacientes usuários de anti-retrovirais devem realizar os exames de carga viral e contagem de linfócitos T CD4/CD8 somente uma vez ao ano.

Quais são verdadeiras?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Uma das atividades mais importantes para manter a área física e os equipamentos em condições adequadas é a limpeza geral do laboratório. A limpeza inclui o cuidado com as superfícies e com o resíduo gerado dentro do laboratório.

Quanto aos processos de limpeza, descontaminação e descarte de resíduos, assinale a afirmativa correta.

- (A) É recomendado para descontaminação de uma bancada contaminada com sangue somente o uso de álcool 70%, deixando-o agir por 15 minutos.
- (B) Nenhum resíduo laboratorial poderá ser reciclado, reutilizado ou descartado como lixo doméstico.
- (C) O processo de esterilização de resíduos laboratoriais visa a destruir ou inativar irreversivelmente vírus e bactérias, mas não tem eficácia contra protozoários, fungos e esporos.
- (D) O processo de desinfecção tem por objetivo destruir ou inativar irreversivelmente vírus, protozoários, bactérias e/ou fungos, mas não necessariamente esporos.
- (E) A esterilização por calor úmido (autoclave) permite somente a descontaminação de vidrarias laboratoriais, uma vez que só este tipo de material resiste a temperaturas elevadas (121 °C).