

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 12

ENFERMEIRO I (Internação Clínica e Cirúrgica)

01.	D	11.	D	21.	D	31.	B
02.	B	12.	C	22.	B	32.	B
03.	C	13.	D	23.	E	33.	E
04.	E	14.	ANULADA	24.	A	34.	D
05.	C	15.	A	25.	C	35.	E
06.	A	16.	E	26.	E	36.	ANULADA
07.	C	17.	C	27.	E	37.	E
08.	D	18.	D	28.	A	38.	A
09.	A	19.	A	29.	ANULADA	39.	D
10.	B	20.	E	30.	D	40.	E



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 02/2017
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 12 - ENFERMEIRO I
(Internação Clínica e Cirúrgica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. São complicações da Nutrição Parenteral (NPT) ao paciente:

- (A) contaminação do cateter, embolia paradoxal e angina.
- (B) sobrecarga de líquidos, sepse e angina.
- (C) hiperglicemia, embolia paradoxal e dor torácica.
- (D) hiperglicemia, embolia gasosa e hipoglicemia de rebote.
- (E) pneumotórax, embolia paradoxal e sepse.

02. As manifestações clínicas mais evidentes da Insuficiência Respiratória Aguda são:

- (A) bradipneia, diminuição da pressão arterial e fadiga.
- (B) dispneia, taquicardia e fadiga.
- (C) taquicardia, fadiga e diminuição da pressão arterial.
- (D) dor torácica, taquicardia e dispneia.
- (E) elevação da pressão arterial, fadiga e dor torácica.

03. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os déficits neurológicos dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) aos respectivos sinais.

- (1) Disartria
- (2) Hemiplegia
- (3) Ataxia
- (4) Hemiparesia
- (5) Afasia expressiva

- () Marcha cambaleante e instável.
- () Dificuldade em formar palavras.
- () Paralisia da face, do braço e da perna em um mesmo lado.
- () Fraqueza da face, do braço e da perna em um mesmo lado.
- () Incapacidade de formar palavras compreensíveis; pode ser capaz de falar de modo monossilábico.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 5 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
- (D) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.

04. São sinais e/ou sintomas do Infarto do Miocárdio (IM), **EXCETO**:

- (A) náuseas.
- (B) ansiedade.
- (C) indigestão.
- (D) dor torácica.
- (E) cianose.

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de angina aos respectivos sintomas ou evidências.

- (1) Angina instável
- (2) Angina estável
- (3) Angina variante
- (4) Angina refratária
- (5) Isquemia silenciosa

- () Paciente não relata nenhuma dor, podendo ter alteração no ECG, na prova de esforço.
- () Sintomas aumentam de frequência e gravidade; podem não ser aliviados nem com o repouso, nem com uso de nitroglicerina.
- () Paciente apresenta dor em repouso, com elevação reversível do segmento ST.
- () Dor torácica intensa e incapacitante.
- () Dor previsível e consistente que ocorre sob esforço e é aliviada pelo repouso ou uso de nitroglicerina.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (C) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.
- (D) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.

06. Considere as afirmações abaixo sobre a classificação e a localização da dor.

- I - A dor cutânea tem como característica ser de curta duração e localizada; geralmente é uma sensação aguda.
- II - A dor profunda é resultante da estimulação de órgãos internos, assumindo qualquer característica em uma parte do corpo.
- III - A dor irradiada se estende do local inicial da lesão a outra parte do corpo, com característica intermitente e constante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Uma das complicações potenciais graves no pós-operatório cirúrgico inclui a trombose venosa profunda. São fatores que aumentam e/ou adicionam o risco de trombose, **EXCETO**:

- (A) baixo débito cardíaco.
- (B) obesidade.
- (C) saída precoce do leito.
- (D) traumatismo.
- (E) desidratação.

08. Uma das complicações graves da cirurgia de artroplastia total de quadril é a luxação da prótese. O enfermeiro precisa estar atento aos cuidados a fim de manter o posicionamento correto e evitar a luxação. Assinale a alternativa correta quanto ao cuidado ao paciente submetido à artroplastia total do quadril.

- (A) É permitido curvar-se ao nível da altura da cintura apenas em atividades como colocar meias e sapatos.
- (B) A rotação interna do membro afetado é evitada, e a rotação externa é permitida.
- (C) A perna afetada pode ser elevada quando o paciente estiver sentado, a fim de evitar edema.
- (D) Ao virar o paciente de decúbito, é importante manter o quadril operado em abdução.
- (E) Quando sentado, o paciente deve manter o quadril mais baixo que os joelhos.

09. Atentar para sinais e sintomas de rejeição é um dos cuidados que o enfermeiro deve observar no paciente transplantado renal. São sinais e sintomas de rejeição:

- (A) oligúria, febre e hipersensibilidade sobre o enxerto.
- (B) poliúria, febre e edema.
- (C) oligúria, perda de peso e pressão arterial crescente.
- (D) edema, pressão arterial decrescente e febre.
- (E) poliúria, aumento de peso e hipersensibilidade sobre o enxerto.

10. Sobre cuidados com prevenção de infecção no paciente com cateter urinário de demora, assinale as afirmações com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Deve-se usar uma técnica asséptica rigorosa durante a inserção do cateter.
- () Deve-se utilizar um sistema de drenagem urinária fechado, estéril e pré-montado.
- () Para coleta de amostras de urina, é permitido desconectar a bolsa do cateter.
- () Deve-se realizar higiene perineal com antisséptico duas vezes ao dia.
- () Deve-se evitar o manuseio desnecessário do cateter pelo paciente ou pela equipe.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – V – V – F – V.

11. Após uma cirurgia torácica, usam-se cânulas (drenos) torácicas para reexpandir o pulmão e remover excesso de ar, líquido e sangue.

Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação aos cuidados com drenos de tórax.

- (A) Vazamento e retenção de ar no sistema de drenagem podem resultar em pneumotórax hipertensivo.
- (B) O sistema de drenagem deve ser mantido a um nível inferior ao tórax do paciente.
- (C) Respiração profunda e tosse ajudam a elevar a pressão pleural que promove drenagem do líquido acumulado no espaço pleural.
- (D) A inserção de uma cânula (dreno) torácica no espaço pleural restaura a pressão intratorácica positiva necessária para reexpansão pulmonar.
- (E) Na drenagem em selo d'água, a água age como uma vedação e impede que o ar retorne para dentro do espaço pleural.

12. São fatores que prejudicam a cicatrização de feridas, **EXCETO**:

- (A) acúmulo de secreção.
- (B) déficits nutricionais.
- (C) presença de tecido de granulação.
- (D) tosse intensa.
- (E) curativo muito apertado.

13. O dispositivo de administração de oxigênio em pacientes, considerado de baixo fluxo e que fornece alta concentração de O₂ é

- (A) o cateter nasal.
- (B) a cânula nasal ou óculos.
- (C) a máscara de Venturi.
- (D) a máscara de não reinalação.
- (E) a tenda facial.

14. Dentre as proposições da Portaria nº 539, no Art. 7º, do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), órgão colegiado e consultivo, são considerados protocolos relacionados à segurança do paciente:

- (A) a identificação de infecções relacionadas à assistência à saúde e a prevenção da dor.
- (B) a prevenção de quedas e a administração segura de antimicrobianos.
- (C) o processo de identificação de pacientes e a transferência de pacientes entre pontos de cuidado.
- (D) os procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia seguros e a prevenção de alergias.
- (E) a administração segura de sangue e hemocomponentes e a notificação de lesões por pressão.

15. São protocolos básicos recomendados pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, que seguem Metas Internacionais de Segurança do Paciente fomentadas pela Organização Mundial de Saúde e pela *Joint Commission International*, **EXCETO**:

- (A) realizar procedimentos invasivos de acordo com lista de verificação.
- (B) melhorar a comunicação entre profissionais de saúde.
- (C) avaliar os pacientes em relação ao risco de quedas.
- (D) identificar corretamente o paciente.
- (E) melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.

16. A 11ª Estratégia recomendada pela Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) – Polo RS destaca o paciente parceiro na sua segurança. São ações importantes para esta estratégia:

- (A) incentivar pacientes e acompanhantes a se tornarem responsáveis pelo seu cuidado e pela prevenção de erros.
- (B) estimular a disseminação de linguagem técnico-científica entre os pacientes e profissionais para facilitar a comunicação efetiva.
- (C) inibir os questionamentos do paciente e esclarecer dúvidas após realização de exames, para garantir eficiência no tempo de diagnósticos complementares.
- (D) fomentar que a parceria entre paciente e profissional da saúde não se estenda ao acompanhante/familiar.
- (E) educar os pacientes e acompanhantes quanto à sua participação no cuidado adequado e seguro.

17. Um paciente está recebendo 1.000mL de solução glicosada 5% e 20mL de cloreto de sódio 20% a 40 gotas por minuto, com início às 8 horas. Ao avaliar o paciente às 10 horas, a enfermeira observa que o paciente recebeu 300mL do soro. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de infusão para o volume total e o volume que o paciente deveria ter recebido nas duas horas.

- (A) 8 horas e 120mL.
- (B) 8 horas e 5 minutos e 240mL.
- (C) 8 horas e 30 minutos e 240mL.
- (D) 8 horas e 50 minutos e 240mL.
- (E) 9 horas e 120mL.

18. Calcule o volume para diluição e calcule o gotejo para infusão endovenosa da Vancomicina 1.250mg, considerando que a concentração máxima de diluição é 5mg/mL e o tempo de infusão é 60 minutos.

- (A) 25mL e 25 gotas por minuto.
- (B) 125mL e 83 gotas por minuto.
- (C) 225mL e 50 gotas por minuto.
- (D) 250mL e 83 gotas por minuto.
- (E) 500mL e 125 gotas por minuto.

19. O local recomendado mais frequentemente para administração de heparina por via subcutânea é

- (A) o abdome.
- (B) a região escapular.
- (C) a região glútea.
- (D) a face posterior do braço.
- (E) a face anterior da coxa.

20. A higiene de mãos é uma medida simples e eficaz para prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A ANVISA (2013), visando à segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos os envolvidos no cuidado, recomenda a higiene de mãos em momentos determinados.

Sobre esses momentos, considere os itens abaixo.

- I - Antes e após tocar o paciente.
- II - Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
- III- Após risco de exposição a fluidos corporais ou excreções.
- IV - Após tocar superfícies próximas ao paciente.

Quais são recomendados pela ANVISA?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

21. Segundo a ANVISA (2013), as infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. Considere as medidas abaixo para a redução do risco de IPCS em pacientes com cateter intravascular periférico.

- I - Higiene de mãos antes e após o manuseio do acesso vascular.
- II - Desinfecção de conectores com solução alcoólica antes de serem acessados.
- III- Troca de equipamentos para infusão contínua a cada 72-96 horas.
- IV - Troca diária do cateter periférico de poliuretano.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

22. De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um desses princípios.

- (A) Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e o luto.
- (B) Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, com o foco no tratamento da doença.
- (C) Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e de seus familiares, incluindo acompanhamento no luto.
- (D) Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença.
- (E) Iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes.

23. Considere as seguintes afirmações sobre a hipodermóclise.

- I - É uma via segura, com pouco risco de complicação, de fácil manipulação e manutenção, porém é fundamental imobilizar o membro para evitar extravasamento.
- II - A infusão pode ser interrompida a qualquer momento sem o risco de complicações, como, por exemplo, formação de coágulos ou trombose de vaso.
- III- Apresenta limitações nas situações em que se desejam velocidade de infusão rápida e reposição com alto volume de fluidos.
- IV- Possibilita a alta precoce do paciente, já que o dispositivo pode ser manejado em domicílio, pelo cuidador/familiar e/ou pelo próprio paciente, após treinamento pela equipe de enfermagem.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

24. Considere o trecho abaixo sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar.

A assistência hospitalar no SUS será organizada a partir das necessidades da população, com a finalidade de _____ o atendimento aos usuários, baseado em equipe multiprofissional, na _____ do cuidado, na organização de linhas de cuidado e na _____ do acesso.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) garantir – horizontalização – regulação
- (B) permitir – centralização – priorização
- (C) garantir – centralização – racionalização
- (D) permitir – horizontalização – regulação
- (E) garantir – horizontalização – priorização

25. Considere o trecho abaixo sobre a Bioética.

Os referenciais teóricos da ética são utilizados para justificar as ações e são compreendidos: pelos princípios, entendidos como _____; pelos direitos humanos, entendidos como individuais, coletivos e transpessoais; pelas _____, como comportamentos individuais adequados; e pela _____, quando a relação com o outro é o fundamento das ações humanas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) deveres – atitudes – neutralidade
- (B) direitos – virtudes – singularidade
- (C) deveres – virtudes – alteridade
- (D) direitos – virtudes – neutralidade
- (E) direitos – atitudes – alteridade

26. Considere os seguintes itens.

- I - Riscos biológicos e químicos
- II - Radiações ionizantes
- III- Lavanderias
- IV - Limpeza e conservação

Quais são contemplados na Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32)?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

27. No que concerne ao Art. 35 da Lei Federal nº 8.080/90, sobre o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, considere os critérios abaixo em relação a esse fim, segundo análise técnica de programas e projetos.

- I - Protocolo clínico e diretriz terapêutica dos usuários da rede de saúde a ser coberta.
- II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- III- Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- IV- Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

28. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de teorias de liderança às suas respectivas concepções teóricas.

- (1) Teoria do Grande Homem/teorias das características
 - (2) Teorias comportamentais
 - (3) Teorias de liderança situacional ou contingencial
 - (4) Teorias interacionais de liderança
- () O comportamento do líder costuma ser determinado pelas relações entre sua personalidade e a situação específica.
 - () Algumas pessoas apresentam determinadas características ou traços de personalidade que as tornam melhores líderes que outras.
 - () Nenhum estilo de liderança é o ideal para cada situação, uma vez que as inter-relações entre o líder e o grupo são influenciadas pela capacidade de o administrador ser um bom líder.
 - () É dada ênfase aos atos e ao estilo de liderança do líder.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 1 – 3 – 4.
- (C) 4 – 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 2 – 4 – 3 – 1.

29. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a um critério geral para definição de infecção relacionada à assistência à saúde segundo a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde.

- (A) Falta de evidência de infecção presente ou em incubação no momento da admissão.
- (B) Infecção adquirida no hospital que se torna evidente ou é identificada após a alta hospitalar.
- (C) Infecção constatada ou em incubação na admissão do paciente, desde que não esteja relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- (D) Na mesma topografia da infecção comunitária, é isolado um microrganismo diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente.
- (E) O período de incubação do microrganismo é desconhecido e não há evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação.

30. Assinale a alternativa que descreve o princípio ético da "Utilidade".

- (A) Promove a autodeterminação e a liberdade de escolha.
- (B) Promove ações na tentativa de evitar danos.
- (C) Realiza ações na tentativa de promover o bem.
- (D) Considera que o bem de muitos ultrapassa os desejos ou as necessidades individuais.
- (E) Permite que um indivíduo assuma o direito de decidir por outro.

31. As quedas representam um dos eventos adversos mais prevalentes no ambiente hospitalar. Considerada um evento multifatorial, apresenta três tipos de fatores de risco.

Assinale a alternativa que corresponde a esses fatores.

- (A) Ocasionais, temporais e contínuos.
- (B) Intrínsecos, extrínsecos e comportamentais.
- (C) Mecânicos, medicamentosos e ambientais.
- (D) Individuais, coletivos e mecânicos.
- (E) Inevitáveis, preveníveis e permanentes.

32. Considere as afirmações abaixo sobre a *Nursing Outcomes Classification* (NOC).

- I - É a primeira classificação padronizada e abrangente utilizada para descrever os resultados obtidos pelos pacientes em decorrência das intervenções de enfermagem.
- II - É considerada complementar à taxonomia da NANDA-I e da *Nursing Interventions Classification* (NIC), não podendo ser usada com outras classificações.
- III - Possui quatro níveis, que são: domínios, classes, resultados e indicadores.
- IV - Cada resultado possui um rótulo (nome), uma definição e uma lista de indicadores que descreve o paciente, o cuidador ou a família.
- V - Um indicador é definido como qualquer tratamento baseado no julgamento e conhecimento clínico, que seja realizado por um profissional enfermeiro para melhorar os resultados do paciente/cliente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas III e V.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas III, IV e V.

33. O diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz pertence ao domínio 4 (atividade/repouso) e à classe 4 (respostas cardiovasculares/pulmonares) da NANDA-I. Dispneia, padrão respiratório alterado, batimento de asa de nariz, cianose, alterações anatômicas da caixa torácica, respiração com lábios cerrados, posição em três pontos, uso de musculatura acessória para respirar e ruídos adventícios são sinais/sintomas associados a esse diagnóstico.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um fator relacionado ou de risco associado a esse diagnóstico de enfermagem.

- (A) Hiperventilação.
- (B) Síndrome da hipoventilação.
- (C) Ansiedade.
- (D) Disfunção neuromuscular.
- (E) Corpo estranho na via aérea.

34. Assinale a alternativa que apresenta um sinal/sintoma associado à hipernatremia.

- (A) Queda na pressão arterial.
- (B) Queda na frequência cardíaca.
- (C) Hipotermia.
- (D) Inquietação.
- (E) Papiledema.

35. A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que afeta principalmente o parênquima pulmonar. Sua transmissão em serviços de saúde é uma preocupação constante dos profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes. São recomendações para a prevenção da transmissão da tuberculose pulmonar em serviços de saúde, **EXCETO**:

- (A) identificação e tratamento precoce de pessoas com TB ativa.
- (B) isolamento para os bacilos acidorresistentes para todos os pacientes com suspeita ou confirmação de TB ativa (quarto particular com pressão negativa em relação às áreas adjacentes e um mínimo de seis trocas de ar por hora).
- (C) uso de respiradores particulados descartáveis por todos que entram no quarto de isolamento.
- (D) realização de busca ativa de contato entre os profissionais de saúde, pacientes e visitantes expostos a um paciente não tratado ou tratado de maneira ineficaz.
- (E) tratamento profilático a todos os profissionais de saúde que apresentem resultado negativo ao teste tuberculínico cutâneo rotineiro.

36. Ruídos adventícios são sons respiratórios anormais que se sobrepõem aos sons respiratórios normais (murmúrios vesiculares).

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os ruídos adventícios às suas respectivas descrições.

- (1) Estertores finos
 - (2) Roncos
 - (3) Estridores
 - (4) Sibilos
- () Sons graves, de baixa frequência, ouvidos mais frequentemente na expiração, que se originam das vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso.
 - () Sons agudos, musicais, contínuos, ouvidos de forma mais alta na expiração, que se originam do estreitamento das pequenas vias aéreas.
 - () Ruídos inspiratórios e expiratórios rudes que podem ser ouvidos sem uso de estetoscópio, sendo um sinal de estreitamento das vias aéreas maiores.
 - () Sons explosivos de alta frequência, descontínuos, que se originam da presença de líquidos e são ouvidos do meio até o final da inspiração.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 3 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 4 – 2 – 3.

37. Considere as afirmações abaixo sobre agentes quimioterápicos vesicantes.

- I - São agentes que, quando depositados no tecido subcutâneo (extravasamento), causam necrose tissular e comprometimento dos tendões, nervos e vasos sanguíneos adjacentes.
- II - São exemplos a doxorrubicina, a vincristina, a mitomicina e a ciclofosfamida.
- III- Apenas médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem especialmente treinados devem administrar substâncias vesicantes.
- IV - Quando o extravasamento de um agente vesicante ocorre ou é suspeitado, sua administração é interrompida de imediato. Se o agente extravasado for um alcaloide da vinca, recomenda-se a aplicação de compressas quentes no local.
- V - A quimioterapia vesicante nunca deve ser administrada nas veias periféricas envolvendo a mão ou o punho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, IV e V.

38. A colelitíase é a presença de cálculos na vesícula biliar.

Assinale a alternativa que corresponde a um fator de risco para a colelitíase.

- (A) Fibrose cística.
- (B) Hipertensão arterial sistêmica.
- (C) Hepatite C.
- (D) Sexo masculino.
- (E) Pancreatite.

39. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a uma alteração sensorial no idoso que pode afetar a diabetes melito e seu tratamento.

- (A) Visão diminuída.
- (B) Olfato diminuído.
- (C) Alterações no paladar.
- (D) Propriocepção aumentada.
- (E) Sede diminuída.

40. Sobre infecção em paciente submetido à gastroplastia, considere os itens abaixo.

- I - História prévia de diabetes melito.
- II - Procedimentos invasivos (acesso venoso, linha arterial radial, ferida operatória, sondagem vesical intermitente).
- III- Obesidade.
- IV - Presença de hematoma na região da ferida operatória.

Quais são fatores de risco para essa infecção?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.