

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 02/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 19

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)

01.	<b>C</b>	11.	<b>A</b>	21.	<b>A</b>	31.	<b>B</b>
02.	<b>D</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>B</b>	32.	<b>A</b>
03.	<b>B</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>C</b>	33.	<b>C</b>
04.	<b>E</b>	14.	<b>E</b>	24.	<b>A</b>	34.	<b>B</b>
05.	<b>D</b>	15.	<b>B</b>	25.	<b>B</b>	35.	<b>E</b>
06.	<b>A</b>	16.	<b>D</b>	26.	<b>B</b>	36.	<b>C</b>
07.	<b>C</b>	17.	<b>A</b>	27.	<b>E</b>	37.	<b>D</b>
08.	<b>E</b>	18.	<b>A</b>	28.	<b>B</b>	38.	<b>D</b>
09.	<b>D</b>	19.	<b>B</b>	29.	<b>D</b>	39.	<b>D</b>
10.	<b>B</b>	20.	<b>E</b>	30.	<b>C</b>	40.	<b>C</b>



**EDITAL Nº 02/2017**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 19 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
**(Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, prevê a execução de ações nos campos a seguir, **EXCETO** um. Assinale-o.

- (A) Vigilância sanitária
- (B) Vigilância epidemiológica
- (C) Vigilância socioassistencial
- (D) Saúde do trabalhador
- (E) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica

**02.** Considere os itens a seguir.

- I - Construir trocas solidárias e comprometidas com dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- II - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, desconsiderando o aspecto subjetivo neles presentes.
- III- Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo gestores, trabalhadores de saúde e usuários.

Quais estão incluídos na Política Nacional de Humanização (PNH)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**03.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo no que se refere a terminologias relacionadas à segurança do paciente.

- ( ) Segurança é a redução a nível zero de risco e dano desnecessário ao paciente.
- ( ) Incidente de segurança do paciente é o evento ou a circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- ( ) Incidente sem dano é um evento que atingiu o paciente, mas não causou dano discernível.
- ( ) Incidente com dano é um incidente que resulta na morte do paciente.
- ( ) Erro é uma falha em executar um plano de ação como pretendido ou aplicação de um plano incorreto. Pode ocorrer por fazer a coisa errada ou falhar em fazer a coisa certa na fase de planejamento ou na fase de execução.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – V.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – V – F – V – F.

**04.** Considere os itens a seguir.

- I - Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- II - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica e legal, e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- III- Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

Quais são Responsabilidades e Deveres dos Profissionais de Enfermagem, previstos no Código de Ética da Enfermagem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**05.** Assinale a alternativa correta quanto à Bioética.

- (A) Utiliza simplesmente os conhecimentos de outras ciências.
- (B) Não cria espaço de diálogo interdisciplinar.
- (C) É conservadora e não aborda novos problemas de forma contemporânea.
- (D) Estimula novos patamares de discussão e de reflexão.
- (E) Limita-se a solucionar problemas isolados.

**06.** Em relação à Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale a alternativa correta.

- (A) São considerados agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.
- (B) Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, desde que estejam previstas no PPRA.
- (C) Os trabalhadores podem deixar seu local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- (D) É permitido o consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho, desde que o profissional tenha realizado a higiene das mãos.
- (E) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) deverão ficar armazenados no posto de trabalho, em local chaveado, para permitir o controle dos mesmos.

**07.** Apenas um dos objetivos abaixo **NÃO** consta na Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Assinale-o.

- (A) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde.
- (B) Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.
- (C) Promover o envolvimento exclusivo de profissionais especializados, sem interferência dos pacientes e familiares, pois entendem que isso pode atrapalhar o processo.
- (D) Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
- (E) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde.

**08.** Quanto à Estratégia de Identificação do Paciente, considere os momentos abaixo.

- I - Antes de procedimentos invasivos.
- II - Na transferência do paciente para outra unidade.
- III- No encaminhamento para a realização de exames e tratamentos.

Em quais momentos é indispensável a reconferência dos dados de identificação do paciente?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**09.** A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – Polo RS recomenda cores padronizadas das pulseiras utilizadas para identificar o paciente, sinalizar risco de queda e de alergias. Considerando essa padronização, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Pulseira amarela
  - (2) Pulseira branca
  - (3) Pulseira azul
  - (4) Pulseira vermelha
- ( ) Identificação do paciente
  - ( ) Risco de queda
  - ( ) Não é padronizada
  - ( ) Alerta de alergia

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4.

**10.** A infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) está entre as infecções mais comuns relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O maior fator de risco para aquisição dessas infecções é

- (A) a desnutrição.
- (B) a presença de dispositivos vasculares instalados no paciente.
- (C) a reduzida manipulação dos cateteres.
- (D) a utilização de cateter venoso central de curta permanência.
- (E) a nutrição enteral.

**11.** As lesões por pressão são apontadas como um dos principais fatores responsáveis pela qualidade da assistência prestada pelos serviços de saúde. Assinale a alternativa que descreve o estágio três da lesão por pressão.

- (A) Perda total de tecido, necrose subcutânea até a fáscia.
- (B) Pele íntegra, sinais de hiperemia, descoloração, endurecimento local.
- (C) Perda parcial de tecido, bolha, abrasão ou cratera rosa/vermelha.
- (D) Destruição significativa do tecido, necrose até os ossos.
- (E) Pele hiperemiada, bolhas e pequena área de necrose.

**12.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao controle e à prevenção de infecções hospitalares.

- ( ) Faringite, laringite e bronquite são infecções respiratórias do trato respiratório superior.
- ( ) Infecção comunitária é constatada na admissão do paciente desde que não esteja relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- ( ) A redução de custos com infecção hospitalar dá-se pela diminuição da incidência de infecções e da morbidade causada pelo prolongamento da doença e pela redução da permanência hospitalar.
- ( ) As infecções relacionadas à assistência à saúde elevam os gastos, aumentam a morbidade e a mortalidade hospitalar.
- ( ) A cultura de cateter é um exame de baixa especificidade e deve ser utilizado sempre para diagnóstico de infecção relacionada a acesso vascular central.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) F – V – V – V – F.

**13.** É medida para realizar Prevenção por Contato de infecções hospitalares:

- (A) uso de máscara cirúrgica.
- (B) higiene oral de 4/4 horas.
- (C) desinfecção de materiais e equipamentos.
- (D) proibição de visitas e acompanhantes.
- (E) manutenção da cabeceira do leito elevada entre 30° e 45°.

**14.** Pacientes hospitalizados possuem risco aumentado de sofrer quedas devido ao ambiente desconhecido e à situação clínica em que se encontram. Considere as afirmações abaixo sobre quedas.

- I - Acidentes por quedas podem gerar repercussões clínicas, psicológicas e sociais.
- II - As repercussões psicológicas são mais frequentes nos idosos, podendo levar à depressão e ao isolamento social.
- III- A ocorrência de quedas também está relacionada com maiores índices de reinternação e de alta para casas geriátricas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**15.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a classificação de choque às suas respectivas características.

- (1) Choque hipovolêmico
- (2) Choque cardiogênico
- (3) Choque séptico
- (4) Choque neurológico
- (5) Choque anafilático

- ( ) Ocorre quando a capacidade do coração para se contrair e bombear o sangue se mostra comprometida, e o suprimento de oxigênio é inadequado para o coração e para os tecidos.
- ( ) Ocorre quando existe uma diminuição do volume intravascular.
- ( ) É causado por uma reação alérgica grave quando os pacientes já produziram anticorpos para uma substância estranha (antígeno) e desenvolvem uma reação antígeno-anticorpo sistêmica.
- ( ) É causado por uma infecção disseminada.
- ( ) Pode ser causado por uma lesão da medula espinal, anestesia espinal ou por outra lesão do sistema nervoso.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 3 – 5 – 2.
- (B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (E) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.

**16.** Considere as afirmações abaixo sobre o tratamento do câncer.

- I - As opções de tratamento oferecidas aos pacientes com câncer deverão ser baseadas em metas realistas e atingíveis para cada tipo específico de câncer.
- II - A cura ocorre quando há a erradicação completa ou parcial da doença maligna.
- III- O tratamento paliativo alivia os sintomas associados à doença.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**17.** As manifestações clínicas mais evidentes em pacientes com tuberculose pulmonar são:

- (A) febre baixa, tosse, sudorese noturna, fadiga e perda de peso.
- (B) febre alta, perda de peso, sudorese noturna e edema de membros inferiores.
- (C) febre baixa, palidez, inapetência, visão turva e sudorese noturna.
- (D) febre alta, sudorese noturna, tremores, palidez e cianose.
- (E) febre alta, sudorese noturna, tremores, palidez e inapetência.

**18.** A embolia pulmonar refere-se à obstrução da artéria \_\_\_\_\_ ou de um de seus ramos por um trombo que se origina de algum lugar do sistema \_\_\_\_\_ ou no lado \_\_\_\_\_ do coração.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) pulmonar – venoso – direito
- (B) aorta – arterial – esquerdo
- (C) pulmonar – venoso – esquerdo
- (D) aorta – venoso – direito
- (E) aorta – arterial – direito

**19.** São considerados fatores de risco para aspiração de conteúdo gástrico nos pulmões:

- (A) atividade convulsiva e sepse.
- (B) acidente vascular cerebral e distúrbio de deglutição.
- (C) parada cardiorrespiratória e câncer de esôfago.
- (D) nível de consciência diminuído e inapetência.
- (E) parada cardiorrespiratória e agitação psicomotora.

**20.** Considere as afirmações abaixo sobre orientações para cuidado de paciente com convulsões.

- I - Afrouxar roupas apertadas.
- II - Se o paciente estiver no leito, remover travesseiros e elevar grades laterais.
- III- Não se deve fazer nenhuma tentativa de conter o paciente durante a crise, porque as contrações musculares são fortes e a contenção pode produzir lesões.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**21.** Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para hepatite C.

- (A) Tratamento pregresso com hemodiálise crônica.
- (B) Receptor de hemoderivados antes de 1998.
- (C) Alcoolismo.
- (D) Homens com mais de 65 anos.
- (E) Tabagismo.

**22.** Considere as afirmações abaixo sobre diabetes melito.

- I - A diabetes tipo 2 é caracterizada pela destruição das células betapancreáticas.
- II - A diabetes tipo 2 está relacionada à resistência à insulina e à sua secreção prejudicada.
- III- A redução de peso e a prática de exercícios físicos moderados podem evitar ou retardar o aparecimento da diabetes melito 1 em pessoas com alto risco para a doença.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**23.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao período pré-operatório.

- ( ) Em geral, os pelos não são removidos antes da cirurgia, a menos que os pelos do local da incisão ou em torno dele possam interferir no procedimento.
- ( ) Os enemas não são comumente prescritos no pré-operatório, a menos que o cliente seja submetido a uma cirurgia abdominal ou pélvica.
- ( ) Se o cliente se recusar a receber transfusão de sangue por motivos religiosos, essa informação deve ser transmitida apenas para a equipe médica.
- ( ) O prontuário preenchido com a lista de verificação pré-operatória acompanha o cliente para a sala de operação com o termo de consentimento cirúrgico em anexo, juntamente com todos os resultados de exames laboratoriais e registros de enfermagem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) V – V – V – F.

**24.** Em relação ao Consentimento Informado ou Consentimento Livre e Esclarecido, assinale a alternativa correta.

- (A) É um documento necessário antes de uma cirurgia não emergencial, para proteger o cliente de uma cirurgia não autorizada e para proteger o cirurgião de queixas contra uma cirurgia não autorizada ou lesão física.
- (B) Não se trata de uma exigência legal, mas ajuda o cliente a se preparar psicologicamente, pois visa garantir que ele compreenda a cirurgia que será realizada.
- (C) É um documento necessário apenas para cirurgias de emergência.
- (D) Antes de o cliente dar o seu consentimento, é responsabilidade do enfermeiro fornecer uma explicação clara e simples das implicações da cirurgia.
- (E) O termo de consentimento pode ser assinado após a administração da pré-medicação psicoativa, pois não influencia na capacidade de julgamento e tomada de decisão.

**25.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre artroplastia total do quadril.

- ( ) As indicações para essa cirurgia incluem a osteoartrite, a artrite reumatoide e as fraturas do colo do fêmur.
- ( ) Quando o quadril está em flexão máxima, adução (pernas juntas) e rotação interna, diminuem os riscos de luxação da prótese.
- ( ) Entre as complicações que podem ocorrer, estão luxação da prótese de quadril, infecção e úlcera por pressão do calcânhar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

**26.** A prostatectomia consiste na remoção cirúrgica, aberta ou laparoscópica, de toda a próstata. Nessa cirurgia, as complicações potenciais podem ser:

- (A) infecção, dispneia e disfunção sexual.
- (B) hemorragia e choque, incontinência urinária e disfunção sexual.
- (C) incontinência urinária, dispneia e incontinência fecal.
- (D) hemorragia e choque, incontinência urinária e incontinência fecal.
- (E) disfunção sexual, infecção e incontinência fecal.

**27.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere aos cuidados com feridas.

- ( ) As feridas cirúrgicas ou traumáticas devem ser limpas na direção da área mais contaminada para a menos contaminada, aplicando soluções não citotóxicas com gaze estéril.
- ( ) Em feridas abertas e profundas, a limpeza da ferida pode ser realizada por irrigação.
- ( ) Um dos objetivos do curativo é promover o isolamento térmico das superfícies da ferida.
- ( ) A cicatrização por primeira intenção dá-se quando as bordas da pele são aproximadas ou fechadas e o risco de infecção é baixo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – V.

**28.** Aproximadamente 60% do peso de um adulto normal consiste em líquido (água e eletrólitos). São órgãos através dos quais ocorrem perdas de líquido:

- (A) pulmões, rins, membros inferiores.
- (B) rins, pulmões, trato gastrointestinal.
- (C) pele, glúteos, rins.
- (D) trato gastrointestinal, ossos, pele.
- (E) membros inferiores, pele.

**29.** A cefazolina é um dos medicamentos utilizados para profilaxia cirúrgica, com apresentação em frasco ampola de 1.000mg em 10mL. Conforme prescrição médica, devem ser administrados 600mg, de 6/6 horas, por via endovenosa. Qual a dose que deverá ser administrada a cada 6 horas?

- (A) 0,4mL.
- (B) 0,6mL.
- (C) 4mL.
- (D) 6mL.
- (E) 10mL.

**30.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as vias de administração de medicamentos às respectivas características.

- (1) Via subcutânea
- (2) Via intradérmica
- (3) Via intramuscular
- (4) Via intravenosa
- (5) Via oral

- ( ) A vascularização dessa via garante uma absorção rápida. Os riscos são punção em vaso sanguíneo profundo, formação de nódulos e fascite.
- ( ) A absorção é lenta devido à pouca vascularização da via. Os locais utilizados são a face externa do braço, a região abdominal periumbilical, o terço médio externo da coxa, a região dorso-glútea e ventro-glútea. O volume máximo é de 1mL por aplicação.
- ( ) Via econômica e de fácil administração, indicada para pacientes conscientes e sem problemas de deglutição. A absorção dessa via dá-se no trato digestivo.
- ( ) A administração por essa via garante um efeito imediato. Via muito utilizada em situações de emergência. A administração pode ser intermitente ou contínua.
- ( ) Via utilizada para substâncias de absorção lenta, como testes de sensibilidade a alérgenos e teste tuberculíneo. Os locais de aplicação são a face interna do antebraço ou a região escapular.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 5 – 4 – 1.
- (C) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- (D) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (E) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.

**31.** Em relação aos erros de medicação, considere as afirmações abaixo.

- I - Quando um erro acontece, a segurança do paciente e seu bem-estar vêm em primeiro lugar.
- II - Aqueles erros que não geram dano óbvio ou imediato ao paciente não precisam ser relatados.
- III- O erro pode estar relacionado à prescrição deficiente, à administração de medicação errada ou aos intervalos incorretos entre as doses, por fornecimento de doses extras ou não administração da dose.
- IV- Na ocorrência de um erro, dependendo da gravidade, a enfermeira não precisa comunicar ao médico que acompanha e prescreve o paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

**32.** Em relação à administração segura de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) O envolvimento do paciente e seu acompanhante, sustentado pela educação contínua, contribui para redução de riscos associados ao uso de medicamentos.
- (B) As soluções eletrolíticas concentradas são de grande utilização e não trazem riscos ao paciente.
- (C) Os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos são exclusivamente relacionados ao processo de administração.
- (D) A existência de medicamentos com nomes parecidos não é um fator de risco no processo de administração de medicamentos.
- (E) O aprazamento incorreto não é considerado um erro de administração de medicamentos.

**33.** A higienização das mãos é, com certeza, uma das práticas de maior relevância no cuidado à saúde das pessoas. Sobre essa prática, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) Conforme a Organização Mundial da Saúde, a higienização das mãos pode ser realizada somente com água e sabonete líquido.
- ( ) Os cinco momentos para higienização das mãos, conforme a Organização Mundial da Saúde, são: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- ( ) A higienização simples das mãos, com água e sabonete líquido, tem a finalidade de remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas.
- ( ) O uso de adornos, como anéis e relógios, é permitido, desde que realizada a correta técnica de higiene de mãos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**34.** Em relação à RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as formas de gerenciamento de resíduos às respectivas definições.

- (1) Manejo
- (2) Segregação
- (3) Acondicionamento
- (4) Identificação

- ( ) Consiste na separação dos resíduos no momento e local da sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
- ( ) É a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extraestabelecimento desde a geração até a disposição final.
- ( ) Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações sobre o correto manejo.
- ( ) Consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 2 – 3 – 1 – 4.
- (D) 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 4 – 1 – 2 – 3.

**35.** As características abaixo são consideradas fatores de risco para o suicídio, **EXCETO** uma. Assinale-a.

- (A) Depressão grave.
- (B) Idade menor que 20 anos ou maior que 45 anos.
- (C) Histórico familiar de suicídio.
- (D) Ansiedade grave.
- (E) Idade maior que 20 anos e menor que 45 anos.

**36.** No que se refere às estratégias para a segurança do paciente, considere as afirmações abaixo.

- I - O uso de pulseiras de identificação, bastante difundido, é um sistema que apresenta limitações. Informações incorretas ou pacientes sem pulseira, bem como a falta de padronização do código de cores utilizadas pelos serviços/instituições, têm sido causas de erros na atenção à saúde.
- II - A comunicação efetiva é bidirecional. Para que ela ocorra com segurança, é necessário que haja resposta e validação das informações emitidas. A técnica "leia de volta" (*read-back*), ou "repita o que foi dito", pode ser utilizada, por exemplo, para validar as informações transmitidas na passagem de plantão entre os turnos de trabalho: o profissional anota a informação recebida e repete para a pessoa que a transmitiu de modo a confirmar que a compreendeu corretamente.
- III - A prática da identificação de risco por meio de pulseiras coloridas está se tornando comum e, embora sirva como um mecanismo de alerta valioso, não traz riscos implícitos caso não se utilize um código de cores padronizado, não só dentro de um serviço, mas, principalmente, entre serviços e instituições de atenção à saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**37.** Assinale a alternativa correta em relação à dor em pacientes com câncer.

- (A) Diversas são as barreiras existentes para manejo e controle adequados da dor, entre elas, a não adesão ao tratamento por parte dos doentes, a resistência do paciente ao uso de opioides e a crença de que a dor é inevitável são comportamentos observados, rotineiramente, na prática em ambiente hospitalar.
- (B) A escala visual analógica (EVA) é um método de autoavaliação representado por uma linha reta de 15cm, na qual, em um dos extremos, se discrimina a ausência de dor e, no outro, a dor insuportável; destaca-se por ser considerada sensível, complexa, reproduzível e universal.
- (C) A dor é considerada leve quando a intensidade varia de 1 a 3 na escala visual analógica (EVA); a intensidade de 4 a 8 é considerada dor moderada; e de 9 a 10, dor severa.
- (D) O registro da intensidade deve incluir não somente o momento da dor, mas também o momento em que é aliviada ou exacerbada.
- (E) Na investigação da dor, a possibilidade de o paciente discorrer sobre ela mediante um autorrelato é importante, mas não é o ponto de partida para diagnóstico, implementação terapêutica e posterior avaliação de sua eficácia.

**38.** A hipodermóclise é um método alternativo para a administração de fluidos e medicamentos pela via subcutânea em pacientes com cuidados paliativos. No que se refere aos cuidados com esse procedimento, considere as seguintes recomendações.

- I - Fazer rodízio do sítio de punção respeitando a distância mínima de 5cm do local da punção anterior. Atentar para condições clínicas do paciente, características ambientais e do dispositivo.
- II - Após a administração de medicamentos, injetar 10mL de SF a 0,9% para garantir que todo o conteúdo do dispositivo seja introduzido no sítio de punção.
- III- Observado edema local persistente, diminuir o gotejamento ou suspender a infusão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**39.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os distúrbios que afetam o sistema biliar às respectivas definições.

- (1) Colecistite
  - (2) Colelitíase
  - (3) Coledoclitíase
  - (4) Coledocostomia
  - (5) Colectistectomia
- ( ) Cálculo na vesícula biliar.
  - ( ) Abertura do ducto colédoco.
  - ( ) Inflamação da vesícula biliar, podendo ser aguda ou crônica.
  - ( ) Cálculos no ducto colédoco.
  - ( ) Remoção da vesícula biliar.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- (B) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- (D) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
- (E) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.

**40.** Em relação à candidíase oral, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) É uma infecção fúngica que se caracteriza por placas marrons ou roxas na cavidade oral.
- ( ) Os sinais e sintomas associados incluem deglutição difícil e dolorosa, às vezes com dor retroesternal.
- ( ) Se não for tratada, pode evoluir, acometendo o esôfago e o estômago.
- ( ) Alguns pacientes também desenvolvem lesões orais ulcerativas, mas que não são suscetíveis à disseminação para outros órgãos.
- ( ) Comumente precede outras infecções que comportam risco de vida; caracteriza-se por placas esbranquiçadas cremosas ao redor dos lábios e do nariz.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.