

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 37

ENFERMEIRO I (Hemodiálise)

01.	E	11.	D	21.	E
02.	D	12.	B	22.	A
03.	E	13.	A	23.	E
04.	B	14.	C	24.	A
05.	A	15.	E	25.	D
06.	C	16.	D		
07.	B	17.	C		
08.	D	18.	C		
09.	E	19.	D		
10.	A	20.	B		

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 37 - ENFERMEIRO I (Hemodiálise)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____



INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se, preferencialmente, de caneta esferográfica de tinta azul. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **26**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **duas horas e meia (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

01. Paciente com doença renal crônica e portador de hepatite B (HbSAg positivo) iniciou em programa de hemodiálise.

Considere as afirmações abaixo, com relação aos cuidados de atenção e segurança na assistência a esse paciente, de acordo com a Resolução n.º 11, de 13 de março de 2014.

- I - Paciente com hepatite B deve ser assistido por profissional exclusivo durante toda a sessão de hemodiálise.
- II - No caso de pacientes com sorologia positiva para hepatite B, é permitido o reuso automatizado.
- III- Ao profissional que não soroconverteu após o esquema de vacinação para hepatite B, é vedado assistir pacientes com HbSAg positivo.
- IV- Não é permitido reutilizar dialisadores de paciente com sorologia positiva para hepatite B.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, III e IV.

02. A doença renal crônica, em estágio final, predispõe ao surgimento de complicações decorrentes da perda progressiva e irreversível da função renal. Dentre essas complicações, observa-se a anemia que pode ser tratada com a reposição de eritropoetina.

Assinale a alternativa **INCORRETA**, com relação aos efeitos adversos desse medicamento.

- (A) Dor e irritação no local da injeção.
- (B) Fraqueza e artralgias.
- (C) Acidente vascular cerebral isquêmico transitório.
- (D) Náuseas e vômitos.
- (E) Zumbidos e tosse.

03. Paciente em programa de hemodiálise, está com diarreia. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar confirma contaminação por *clostridium difficile* e orienta precauções baseadas na rota de transmissão. No que se refere à instalação de medidas preconizadas para a unidade de hemodiálise, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as recomendações abaixo (KUPLICH, 2011).

- () O rastreamento de portadores assintomáticos é recomendado para evitar a disseminação desse germe multirresistente.
- () Utilizar agente com ação esporocida para higienização dos materiais.
- () Manter precauções de contato em quarto individual ou de coorte por até 48h após o término da diarreia.
- () O uso de álcool gel é recomendado para higienização de mãos.
- () Lavar as mãos com água e sabão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) F – V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

04. O sucesso do transplante renal depende de indicação correta e inclui a identificação de fatores que possam contraindicá-lo. Considere os critérios abaixo, segundo Pestana (2011).

- I - Doença vascular periférica grave
- II - Neoplasia maligna ativa
- III- Incompatibilidades dos antígenos leucocitários humanos
- IV - Falta de adesão comprovada
- V - Índice de Massa Corpórea maior do que 30 kg/m²

Quais são critérios de exclusão absoluta?

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I, II, IV.
- (C) Apenas I, II, III, e V.
- (D) Apenas I, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

05. Pacientes transplantados renais têm maior risco de infecção e devem ser adequadamente vacinados. No que se refere a esse procedimento, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A administração das vacinas deve ser preferencialmente após o segundo ano de transplante.
- () Todas as vacinas com germes inativados devem ser encorajadas.
- () As vacinas que contenham microrganismos vivos atenuados devem ser administradas.
- () A vacina sazonal contra *influenza* inativada não deve ser administrada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – F – F.

06. A água de abastecimento do serviço de diálise deve ter um padrão de potabilidade que esteja de acordo com a sua normatização, uma vez que o tratamento de hemodiálise é dependente de água tratada e monitorizada, conforme padrões estabelecidos pela Resolução n.º 11, de 13 de março de 2014. Assinale a alternativa **INCORRETA**, com relação à análise da qualidade da água para hemodiálise.

- (A) A avaliação de coliforme total deve ser realizada mensalmente.
- (B) O valor máximo permitido para endotoxinas é de 0,25 EU/ml.
- (C) A contagem de bactérias heterotróficas deve ser semestral.
- (D) A dosagem de alumínio e cálcio deve ser semestral.
- (E) O valor máximo permitido de contagem de bactérias heterotróficas é de 100 UFC/ml.

07. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente as etapas de _____, _____, _____, _____ e _____ dos serviços de assistência de Enfermagem, conforme Lei Reg. n.º 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado acima.

- (A) controle de riscos – coordenação – planejamento – cuidados – avaliação
- (B) planejamento – organização – coordenação – execução – avaliação
- (C) prognóstico – decisão – gerenciamento – conclusão – controle de riscos
- (D) cuidado – prescrição – supervisão – execução – planejamento
- (E) planejamento – construção – coordenação – controle – dimensionamento

08. Paciente, no 25º dia de pós-operatório de transplante renal, está com diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz.

Assinale a alternativa correta em relação ao Fator Relacionado (FR) e Características Definidoras (CD) para esse diagnóstico, conforme Nanda/2012-2014.

- (A) FR: terapias com medicamentos; CD: tosse, dor aguda, cianose, confusão, ortopneia.
- (B) FR: conhecimento deficiente; CD: ansiedade, sudorese, arritmia, hipertensão, taquicardia.
- (C) FR: distúrbios imunológicos; CD: fraqueza, dor aguda, alteração dos níveis de hemoglobina, taquicardia.
- (D) FR: terapias com medicamentos; CD: fadiga, alteração na coagulação, deficiência na imunidade, dispneia, prurido.
- (E) FR: desnutrição; CD: anorexia, congestão, edema, dispneia, dor abdominal.

09. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os aspectos englobados no Código de Ética às suas respectivas características.

- (1) Dever
 (2) Responsabilidade
 (3) Proibição
 (4) Direito
 (5) Princípio Fundamental
- () A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade.
 () Associar-se, exercer cargos e participar das atividades de entidades de classe.
 () Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem.
 () Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
 () Provocar, cooperar ou ser conivente com maus-tratos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
 (B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
 (C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
 (D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
 (E) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.

10. A progressão da doença renal crônica pode ocorrer de diferentes formas, e os sinais e sintomas, assim como os fatores de risco, variam de acordo com a gravidade e/ou a etiologia da doença.

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à doença renal crônica.

- (A) A acidose metabólica é um distúrbio em que há elevação na concentração de hidrogênio, gerando pH alto no fluido extracelular.
 (B) A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial.
 (C) A anemia, na insuficiência renal crônica, poder ser ocasionada por deficiência de eritropoetina.
 (D) Anúria é definida como diurese ≤ 100 ml/24h.
 (E) Fraqueza é um dos sintomas da progressão da doença renal crônica.

11. O paciente com doença renal crônica, em terapia renal substitutiva, requer atenção, por parte do enfermeiro, ao realizar cada etapa da anamnese e exame físico. No procedimento de punção de enxerto arteriovenoso, as técnicas de exame físico que devem ser empregadas compreendem: _____, _____ e _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- (A) avaliação – palpação – escolha das agulhas
 (B) inspeção – avaliação – percussão
 (C) palpação – percussão – ausculta
 (D) inspeção – palpação – ausculta
 (E) avaliação – intensidade – entrevista

12. Em relação à diálise peritoneal, qual das alternativas abaixo representa uma contraindicação absoluta?

- (A) Presença de vazamentos peritoneais.
 (B) Ausência de cuidador e incapacidade física ou mental para realizar as trocas das bolsas de diálise.
 (C) Doença intestinal inflamatória ou isquêmica.
 (D) Pacientes com colostomia ou ileostomia.
 (E) Obesidade mórbida.

13. Como se denomina a peritonite que ocorre em até quatro semanas após o término da antibioticoterapia, na qual se identifica o mesmo microrganismo ou com resultado da cultura negativa?

- (A) Recidivante.
 (B) Fúngica.
 (C) Refratária.
 (D) Repetida.
 (E) Recorrente.

14. Qual das características abaixo **NÃO** constitui um objetivo da liderança, hoje?

- (A) Habilidades pessoais.
 (B) Cooperação.
 (C) Competição.
 (D) Finalidade de discernir.
 (E) Confiança.

15. A avaliação de desempenho é um dos recursos mais valiosos que as empresas dispõem para o desenvolvimento e a motivação de funcionários. Assinale a alternativa correta em relação à avaliação do desempenho dos funcionários.

- (A) Deve ser realizada de forma objetiva, sistemática e informal.
- (B) Quando realizada adequadamente, é capaz de estimular os empregados e diminuir a taxa de permanência e produtividade.
- (C) Para a avaliação do desempenho, deve-se reunir dados justos e subjetivos.
- (D) Impossibilita *feedback* frequente sobre a atuação profissional.
- (E) Gera informações para ajuste salarial, promoções, transferências, ações disciplinares e dispensa de funcionários.

16. A Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32) preconiza algumas práticas para reduzir os riscos de infecção, associados aos cuidados de saúde. Assinale a alternativa correta em relação a essas práticas.

- (A) Adornos como relógios, pulseiras e anéis devem ser removidos, apenas as alianças finas são permitidas.
- (B) O uso de álcool gel pode ser substituído pela lavagem das mãos, em todas as situações.
- (C) A lavagem das mãos não se faz necessária após o contato com o paciente, apenas antes.
- (D) A lavagem das mãos deve ser realizada após o contato com a área, materiais e equipamentos individuais do paciente.
- (E) Psicólogos, Assistentes Sociais, Nutricionistas não necessitam adotar as medidas instituídas por esta norma.

17. Eloi e cols. (2010) traduziram, adaptaram e aplicaram um questionário a respeito da dor para pacientes com doença renal policística. Considere as afirmações abaixo retiradas do referido artigo.

- I - A dor é um sintoma comum em paciente com doença renal policística, acometendo em torno de 60% dos casos.
- II - O questionário permitiu melhor caracterização da localização, intensidade e frequência da dor.
- III - A dor torácica foi mais frequentemente observada nos pacientes com doença renal policística.
- IV - Os pacientes com dor apresentaram volume renal e tamanho do maior cisto, significativamente, maiores em relação aos pacientes que não apresentaram dor.

Quais estão de acordo com o artigo?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

18. Para um paciente em tratamento conservador da função renal, é importante o enfermeiro incluir, no plano de cuidados, algumas orientações para evitar a progressão da doença renal crônica e/ou sua agudização. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os riscos aos respectivos fatores.

- (1) Risco para progressão da doença renal crônica.
 - (2) Risco de agudização da insuficiência renal.
- () Desidratação
 - () Tabagismo
 - () Controle glicêmico ineficaz
 - () Hipotensão arterial
 - () Dislipidemia

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
- (E) 1 – 1 – 2 – 2 – 2.

19. Considerando os cuidados e encaminhamentos recomendados ao paciente portador de doença renal crônica, em tratamento conservador da função renal, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Pacientes em tratamento conservador devem ser submetidos à confecção da fístula, de acordo com a condição vascular, quando a taxa de filtração glomerular for menor do que 20 ml/min/1,73m².
- () Pacientes portadores de doença renal crônica, com *clearance* de creatinina abaixo de 60ml/min/1,73m², devem ser atendidos em Unidades Básicas de Saúde.
- () O uso moderado de anti-inflamatórios não esteroides e antibióticos da classe dos aminoglicosídeos não influenciam na perda de função renal de pacientes em tratamento conservador.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – F.



20. Em uma unidade que atende pacientes em programa regular de diálise, o enfermeiro é parte fundamental da equipe de saúde na avaliação do paciente durante a sessão de hemodiálise. Nessa avaliação o enfermeiro precisa saber que a redução do fluxo sanguíneo na bomba de sangue pode resultar em _____.

O peso seco deve ser reavaliado pelo menos a cada _____.

O acesso vascular do paciente deve ser examinado _____, à procura de sinais de infecção.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) hemólise – duas semanas – mensalmente
- (B) subdiálise – duas semanas – em todas as sessões de hemodiálise
- (C) subdiálise – três semanas – semanalmente
- (D) hemólise – semana – em todas as sessões de hemodiálise
- (E) subdiálise – duas semanas – semanalmente

21. O enfermeiro ao acompanhar e avaliar os acessos vasculares permanentes dos pacientes em hemodiálise, pode se deparar com indicadores clínicos de estenose, no acesso vascular permanente – fístula arteriovenosa ou enxerto arteriovenoso.

Assinale a alternativa que apresenta dois indicadores clínicos dessa complicação.

- (A) Eritema e dificuldade com a hemostasia.
- (B) Inserção difícil da agulha e equimoses recorrentes.
- (C) Hematoma e coágulos recorrentes na canulação.
- (D) Edema do membro e equimoses recorrentes.
- (E) Coágulos recorrentes na canulação e dificuldade na hemostasia.

22. Em relação a um paciente em hemodiálise que tem como acesso vascular um cateter duplo lúmen de curta permanência, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) 1,5 ml é o volume para o preenchimento dos lúmens do cateter com solução anticoagulante.
- (B) não se deve iniciar a diálise através de um cateter sabidamente infectado, principalmente na presença de manifestações sistêmicas como febre.
- (C) a ausência total de fluxo no cateter sugere trombose com completa obstrução da luz do cateter.
- (D) as infecções são as principais causas de morbidade nos pacientes que dialisam por cateter.
- (E) o fechamento do cateter com soluções anticoagulantes com propriedade bactericida reduz o risco de infecção.

23. A retirada de solutos por difusão durante uma sessão de hemodiálise tende a reduzir a osmolaridade plasmática. Quando ocorrem reduções significativas da osmolaridade pode haver queda da volemia e manifestações de edema cerebral, tais como cefaleia e náuseas. Nesse caso, qual seria a complicação dialítica em questão?

- (A) Hiperpotassemia.
- (B) Reação anafilática.
- (C) Embolia gasosa.
- (D) Hemólise.
- (E) Síndrome de desequilíbrio.

24. Nas afirmativas abaixo, coloque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as questões relativas aos princípios norteadores da Política de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS).

- () Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão para a construção da autonomia e do protagonismo de sujeitos e coletivos.
- () Valorização da dimensão objetiva e individual em algumas práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
- () Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- () Utilização da informação, da comunicação, da educação continuada e dos espaços da gestão na construção da dependência e do protagonismo de sujeitos e coletivos.
- () Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estímulo à transdisciplinaridade e à grupalidade.
- () Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- () Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V – V – V.
- (B) V – V – F – V – V – V – V.
- (C) F – F – V – F – V – F – F.
- (D) V – V – F – F – F – V – V.
- (E) F – F – V – V – F – V – F.

25. O enxerto arteriovenoso é uma opção de acesso muito menos desejável do que a fístula arteriovenosa (DAURGIRDAS, 2008). No que se refere a essas opções de acesso, considere as afirmações abaixo.

- I - Fístulas possuem taxas reduzidas de permeabilidade.
- II - Enxertos promovem, com muita frequência, hiperplasia da íntima da veia na anastomose.
- III- Fístulas possuem taxas mais elevadas de permeabilidade prolongada.
- IV- Fístulas apresentam menos infecções do que enxertos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II, IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.