

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 02/2015 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 10

ENFERMEIRO I (Internação Clínica e Cirúrgica)

01.	B	11.	A	21.	E	31.	E
02.	D	12.	D	22.	A	32.	B
03.	B	13.	C	23.	D	33.	E
04.	E	14.	B	24.	E	34.	E
05.	A	15.	D	25.	C	35.	ANULADA
06.	A	16.	A	26.	C	36.	B
07.	C	17.	C	27.	E	37.	A
08.	B	18.	D	28.	A	38.	B
09.	E	19.	A	29.	D	39.	D
10.	D	20.	B	30.	C	40.	C



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 02/2015
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

PS 10 - ENFERMEIRO I
(Internação Clínica e Cirúrgica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica) e o Caderno de Respostas, quando se tratar de prova dissertativa. Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art. 45 – Das Disposições Finais e Transitórias, os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde – SUS, mediante _____, preservada a sua autonomia _____, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e _____, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) pactuação – administrativa – técnicos
- (B) convênio – administrativa - financeiros
- (C) pactuação – financeira – assistenciais
- (D) co-gestão – política - financeiros
- (E) convênio – financeira – técnicos

02. Considere as afirmações abaixo sobre a implementação da PNH – Política Nacional de Humanização.

- I - No eixo das instituições do SUS, propõe-se que a PNH faça parte do plano governamental, incentivando a construção de redes solidárias e interativas na instância federal.
- II - No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão.
- III- No eixo da atenção, propõe-se uma política incentivadora de ações integrais, promocionais e intersetoriais de saúde, inovando nos processos de trabalho que busquem o compartilhamento dos cuidados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde, seja no âmbito nacional, estadual, regional, e mesmo municipal, deve considerar o conceito de Educação Permanente em Saúde e articular as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutive dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de saúde. Pode-se entender a educação permanente como

- (A) a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores pautados pelas necessidades e levantamentos governamentais.
- (B) aprendizagem-trabalho acontecendo no cotidiano das pessoas e das organizações.
- (C) forma de solucionar os problemas enfrentados na realidade cotidiana, desconsiderando os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm.
- (D) processo de ruptura nas transformações das práticas profissionais e de saberes populares.
- (E) enfrentamento e ruptura da construção da cadeia de cuidado progressivo à saúde.

04. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às características de um líder.

- (A) Habilidade de enfatizar as relações interpessoais.
- (B) Capacidade de influenciar o grupo.
- (C) Competência para direcionar seu foco no processo de grupo.
- (D) Capacidade de motivar o grupo de trabalho.
- (E) Habilidade de dirigir tanto os subordinados interessados quanto os desinteressados.

05. Ocupar um cargo não torna alguém líder. O que determina se o indivíduo exerce liderança é

- (A) seu comportamento.
- (B) seu currículo.
- (C) sua formação profissional.
- (D) seu conhecimento.
- (E) seu negócio.

06. Assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas relacionados às alterações do sistema respiratório que contribuem para a formulação do diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz.

- (A) Cianose e uso de musculatura acessória para respirar.
- (B) Hemoptise e agitação.
- (C) Expectoração e taquipneia.
- (D) Taquicardia e dor.
- (E) Gases sanguíneos arteriais anormais e fadiga.

07. Os diagnósticos de enfermagem (DE) estão organizados em classes e domínios da NANDA – I (*North American Nursing Diagnosis Association International*). Qual é o primeiro componente estrutural de um DE?

- (A) Fatores relacionados.
- (B) Resultados esperados.
- (C) Título.
- (D) Características Definidoras.
- (E) Intervenções de Enfermagem.

08. A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo com essa Lei, são atividades privativas do enfermeiro

- (A) prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar.
- (B) prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) execução e avaliação de programas de saúde.
- (D) auxílio na realização de procedimentos cirúrgicos de grande porte.
- (E) coordenação da equipe de saúde.

09. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, reformulado em 2007 por meio da Resolução COFEN Nº 311/2007, apresenta a Enfermagem como uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, da família e da coletividade nos seus princípios fundamentais. De acordo com esse código, são proibições

- (A) administrar medicamentos conhecendo a ação da droga e potenciais risco.
- (B) garantir assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (C) respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte.
- (D) registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
- (E) executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.

10. Considere as afirmações abaixo sobre higienização de mãos.

- I - A técnica de higienização simples das mãos deve ser aplicada após remoção de luvas, identificação de sujidade aparente e aplicações consecutivas de produtos alcoólicos.
- II - A Organização Mundial da Saúde recomenda-a em cinco momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas.
- III- A higienização antisséptica das mãos com preparação alcoólica elimina a carga microbiana e a sujidade aparente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. Segundo a Portaria nº 529, do Ministério da Saúde, de 1º de Abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, compete ao Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP) propor e validar protocolos voltados para a segurança do paciente em diferentes áreas como _____, _____ e _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) processo de identificação de pacientes – prevenção de quedas – comunicação no ambiente dos serviços de saúde
- (B) farmacovigilância – hemovigilância – tecnovigilância
- (C) higienização das mãos – infecções relacionadas à assistência à saúde – uso racional de antimicrobianos
- (D) uso seguro de equipamentos e materiais – transporte de pacientes – cirurgia e procedimentos invasivos seguros
- (E) úlceras por pressão – administração segura de medicamentos – prevenção de óbitos e acidentes



12. Com base no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos (Ministério da Saúde e ANVISA em parceria com FIOCRUZ e FHEMIG), considere as afirmações abaixo sobre as prescrições verbais de medicamentos.

- I - As prescrições verbais devem ser restritas às situações de urgência/emergência ou a situações em que o médico não possa executar a prescrição do medicamento por estar ausente.
- II - O prescritor deve falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o que foi dito e ser confirmado pelo prescritor antes de administrar o medicamento.
- III- A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim que possível.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

13. O Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão (Ministério da Saúde, ANVISA e FioCruz) tem a finalidade de promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão (UPP) e outras lesões de pele. De acordo com esse protocolo, considere as afirmações abaixo.

- I - A avaliação de risco de desenvolvimento de UPP deve contemplar os seguintes fatores: mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional (incluindo desidratação).
- II - A escalas de Braden e Braden Q classificam o risco para a ocorrência de UPP de maneira diretamente proporcional à pontuação, ou seja, quanto maior é o número de pontos na escala, maior é o risco do paciente.
- III- Durante a hidratação da pele não devem ser massageadas áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas. A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos suaves e circulares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

14. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando os tempos de ação às respectivas insulinas.

- | | | |
|------------------------|-----|----------|
| (1) Ação rápida | () | Glargina |
| (2) Ação curta | () | Lispro |
| (3) Ação intermediária | () | Regular |
| (4) Ação muito longa | () | NPH |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
 (B) 4 – 1 – 2 – 3.
 (C) 1 – 4 – 2 – 3.
 (D) 2 – 1 – 3 – 4.
 (E) 4 – 2 – 3 – 1.

15. São princípios dos cuidados paliativos, **EXCETO**

- (A) promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis.
 (B) afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida.
 (C) melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença.
 (D) acelerar ou adiar a morte, dependendo do momento do curso da doença.
 (E) iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia.

16. Segundo o Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a escolha do opioide mais adequado deve basear-se, a princípio, na intensidade da dor, conforme indicação médica. Em geral, nas dores de pequena intensidade, essa classe de analgésicos, segundo a escala analgésica da OMS, não está indicada, devendo-se dar preferência aos analgésicos anti-inflamatórios, enquanto nas de maior intensidade (EAV>5) preferem-se os opioides de _____ potência como a codeína e _____, associados a anti-inflamatórios ou opioides de _____ potência como a morfina e _____, conforme proposto pela OMS.

Assinale a alternativa que completa, adequada e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) baixa – o tramadol – alta – a metadona
 (B) baixa – a metadona – alta – o tramadol
 (C) alta – o tramadol – baixa – a metadona
 (D) alta – a metadona – baixa – o tramadol
 (E) baixa – a escopolamina – alta – o tramadol



17. Assinale a alternativa correta em relação às alterações do sistema respiratório.

- (A) Hipoxemia é a diminuição no suprimento de oxigênio para os tecidos e células enquanto a hipoxia é a diminuição na pressão de oxigênio arterial no sangue.
- (B) São manifestações clínicas da pneumonia por aspiração: início lento da dispneia, febre alta e tosse.
- (C) A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente o parênquima pulmonar, mas que pode, também, ser transmitida a outras partes do corpo, incluindo as meninges e os rins, por exemplo.
- (D) A terapia anticoagulante com uso de heparina, AAS e clopidogrel tem sido, tradicionalmente, o principal método para o tratamento da trombose venosa profunda aguda e da embolia pulmonar.
- (E) Pneumotórax é o colapso parcial ou completo do pulmão em consequência de pressão positiva no espaço peritoneal.

18. Assinale a alternativa correta em relação aos tipos de dor.

- (A) A dor aguda costuma ter início lento e, geralmente, não possui associação com alguma lesão específica.
- (B) A dor crônica é a dor constante ou intermitente, de origem conhecida e com início bem definido.
- (C) A dor relacionada com o câncer não pode ser considerada um tipo de dor.
- (D) A dor aguda geralmente tem início súbito e indica que um dano ou lesão aconteceu.
- (E) A dor crônica geralmente é mais fácil de ser tratada por ser atribuída a uma lesão específica.

19. Considere a solução abaixo, que deverá ser administrada a um paciente por via EV, infundindo o volume em um total de 16 horas.

Glicose 5%, 1000ml – Administrar 1000ml
 Cloreto de Sódio 20%, 10ml – Administrar 40ml
 Cloreto de Potássio 10%, 10ml – Administrar 20ml

Durante o preparo da solução, o técnico de enfermagem constata que só tem disponível, na unidade, bolsas de Glicose 5% com volume de 500 ml. A conduta mais adequada, nesse momento, é preparar uma solução cujo volume final será de _____ ml e infundi-lo em uma velocidade de aproximadamente _____, repetindo mais uma vez a infusão, de uma solução de composição idêntica após o término da administração da primeira solução.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto acima.

- (A) 530 – 66ml/h
- (B) 560 – 70ml/h
- (C) 1060 – 44ml/h
- (D) 530 – 22 microgotas/minuto
- (E) 560 – 23 microgotas/minuto

20. Assinale a alternativa correta em relação aos sistemas de drenagem torácica.

- (A) O enchimento do compartimento do selo d'água deve ser realizado com solução fisiológica 0,9% até o nível especificado pelo fabricante.
- (B) É permitido realizar a ordenha delicada do equipo, na direção do compartimento de drenagem, quando necessário.
- (C) A presença de flutuações do líquido no compartimento com selo d'água pode indicar que o aspirador ou o vácuo de parede não está funcionando adequadamente.
- (D) Ao utilizar macas para transportar pacientes para outras áreas, recomenda-se que o sistema de drenagem seja colocado no nível do tórax.
- (E) Durante o transporte de pacientes, o dreno de tórax deve ser clampeado para evitar o refluxo do conteúdo.

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os déficits neurológicos de acidente vascular cerebral a suas manifestações clínicas.

- (1) Hemiparesia
 (2) Hemiplegia
 (3) Ataxia
 (4) Afasia receptiva
 (5) Hemiamopsia
- () Negligência de um dos lados do corpo
 () Incapacidade de manter os pés juntos, marcha cambaleante e instável
 () Fraqueza da face, braço e perna no mesmo lado
 () Incapacidade de compreender a palavra falada; dificuldade de expressar-se em linguagem verbal com sentido
 () Paralisia da face, braço e perna do mesmo lado

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
 (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
 (C) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.
 (D) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
 (E) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.

22. Assinale a alternativa correta em relação ao acidente vascular cerebral isquêmico.

- (A) É uma perda súbita da função, resultante da ruptura do suprimento sanguíneo para a parte do cérebro.
 (B) É um sangramento dentro do tecido cerebral, dos ventrículos ou do espaço subaracnoideo.
 (C) Hipertensão é a causa mais comum de hemorragia intracerebral.
 (D) É a dilatação de uma artéria cerebral que se desenvolve em consequência da fraqueza da parede arterial.
 (E) Resulta em defeito na parede do vaso com fraqueza subsequente da parede da artéria cerebral.

23. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre as sondas nasoenterais.

- (A) A sonda pode ser via nasal e posicionada no duodeno, denominada sonda nasoduodenal; aquelas posicionadas no jejuno são denominadas sondas nasojejunais.
 (B) Sondas nasoenterais são usadas para fornecer nutrientes e podem ser inseridas, antes ou no decorrer da cirurgia, por radiologistas assistidos por fluoroscopia ou à beira do leito.
 (C) Após a inserção, a sonda inicialmente está localizada no estômago e leva, em geral, 24hs para atravessar o estômago e adentrar o intestino pela peristalse.
 (D) O comprimento da sonda é determinado pela medição da distância da extremidade do nariz até o lobo da orelha e do lobo da orelha até o processo xifoide.
 (E) O posicionamento correto da sonda pode ser confirmado por meio da realização de uma radiografia ou pela combinação com outros métodos, como a medição do comprimento da sonda, a avaliação da coloração do aspirado e a ausculta de ar.

24. Considere as afirmações abaixo sobre os cuidados de enfermagem com gastrostomia.

- I - A primeira alimentação com líquidos é administrada logo após a inserção da sonda, podendo ser água potável, soro fisiológico ou glicose a 10%.
 II - A pele ao redor da sonda requer cuidados especiais, pois pode tornar-se irritada em decorrência da ação enzimática dos sucos gástricos.
 III- O desalojamento de uma sonda recentemente inserida requer atenção imediata, pois o trato pode fechar-se dentro de 4-6h se a mesma não for substituída.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.



25. O papel da enfermeira no tratamento da dor consiste em realizar a _____ dor e identificar as metas para o seu tratamento, promovendo o ensino do paciente.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do texto acima.

- (A) intervenção na
- (B) identificação da
- (C) avaliação da
- (D) assistência à
- (E) especificação da

26. Após o paciente ter uma convulsão, o papel da enfermagem é documentar os eventos anteriores, bem como os que ocorrem durante e após a convulsão, procurando evitar complicações. Assim, o paciente é posicionado em _____, para facilitar a _____ de secreções orais, e a _____ é realizada, quando necessário, para manter uma via respiratória patente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) decúbito lateral – aspiração – drenagem
- (B) decúbito dorsal – drenagem – aspiração
- (C) decúbito lateral – drenagem – aspiração
- (D) decúbito dorsal – aspiração – drenagem
- (E) decúbito ventral – drenagem – aspiração

27. Considere as afirmações abaixo sobre o linfedema.

- I - Resulta quando os canais linfáticos funcionais são inadequados.
- II - Quando se desenvolve, tende a ser crônico.
- III- Ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes que se submeteram à dissecação dos linfonodos axilares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

28. Assinale a alternativa correta sobre os métodos usados para evitar luxação da prótese de quadril após cirurgia de substituição.

- (A) O quadril não pode ser flexionado para vestir roupas e calçar sapatos.
- (B) Os joelhos devem manter-se próximos durante o tempo todo.
- (C) O quadril pode ser inclinado mais de 90°.
- (D) A perna afetada do paciente pode ser elevada quando ele estiver sentado.
- (E) O joelho não pode ser flexionado.

29. Considere os itens a seguir.

- I - Estimular a deambulação precoce para reduzir o risco de trombose venosa profunda.
- II - Evitar exercícios perineais, até que tenha havido a recuperação do controle urinário.
- III- Evitar atividades que produzam efeitos de Valsalva.

Quais constituem cuidados no pós-operatório de prostatectomia?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

30. Para que ocorra a hipertensão arterial sistêmica, deve haver alteração em um ou mais fatores que afetam a resistência periférica ou o débito cardíaco.

Assinale a alternativa que apresenta uma das causas da hipertensão.

- (A) Diminuição de atividade do sistema nervoso simpático.
- (B) Vasodilatação aumentada nas arteríolas.
- (C) Aumento da atividade do sistema de renina-angiotensina-aldosterona, resultando em expansão do volume de líquido extracelular.
- (D) Vasodilatação da resistência vascular sistêmica.
- (E) Atrofia do ventrículo esquerdo do coração.

31. São complicações associadas à cirurgia de histerectomia, **EXCETO**

- (A) disfunção vesical.
- (B) hemorragia.
- (C) trombose venosa profunda.
- (D) infecção.
- (E) disfunção renal.

32. Qual é o tipo de neoplasia maligna, comum em pacientes com HIV/AIDS?

- (A) Leucemia mieloide crônica.
- (B) Linfoma de células B.
- (C) Leucemia linfóide aguda.
- (D) Granuloma piogênico.
- (E) Linfangioma.

33. Das alternativas abaixo, qual **NÃO** caracteriza um sintoma de embolia arterial aguda nos membros com fluxo colateral sanguíneo deficiente?

- (A) Dor.
- (B) Ausência de pulso.
- (C) Parestesia.
- (D) Palidez.
- (E) Calor local.

34. Das alternativas abaixo, qual **NÃO** apresenta uma razão para aplicação de um curativo a uma ferida?

- (A) Fornecer um ambiente adequado para a cicatrização.
- (B) Promover a hemostasia.
- (C) Conter ou imobilizar.
- (D) Proteger contra a contaminação bacteriana.
- (E) Manter a drenagem e o calor local.

35. Com relação ao cateter venoso central, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Após a realização da coleta de sangue para exames laboratoriais, se a via estiver heparinizada, deve-se lavar e proceder a heparinização.
- () O local da inserção deve ser avaliado diariamente.
- () A solução antisséptica utilizada para a troca do curativo é a clorexidina alcoólica 0,05%.
- () A película transparente deverá ser trocada a cada sete dias, mesmo se a inserção apresentar drenagens, evitando ao máximo a manipulação do local.
- () Deve-se suspender a infusão de medicações se o paciente apresentar hipertermia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

36. Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta uma manifestação clínica de insuficiência cardíaca?

- (A) Ortopneia.
- (B) Polaciúria.
- (C) Estertores pulmonares que não limpam com a tosse.
- (D) Distensão venosa jugular.
- (E) Ganho de peso.

37. A atelectasia, a pneumonia e a hipoxemia são complicações respiratórias comuns nos pós-operatórios. Como medidas de prevenção dessas complicações, os exercícios pulmonares devem começar tão logo o paciente seja admitido na unidade de internação.

Assinale a alternativa que apresenta cirurgias em que a tosse é contraindicada no pós-operatório.

- (A) Intracranianas, oftalmológicas e plásticas.
- (B) Cirurgia de revascularização do miocárdio, prostatectomia e herniorrafia.
- (C) Ortopédicas, vasculares e plásticas.
- (D) Plásticas, oftalmológicas e histerectomia.
- (E) Intracranianas, oftalmológicas e gástricas.

38. Com relação ao pós-operatório de ileostomia, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O ostoma deve apresentar coloração de rosado a vermelho vivo e brilhoso.
- () A drenagem fecal deverá iniciar cerca de seis horas após a cirurgia.
- () As primeiras fezes poderão ser endurecidas.
- () A ocorrência de distensão abdominal e náuseas pode indicar uma obstrução intestinal.
- () Há uma perda de grandes volumes de líquido no pós-operatório inicial, podendo haver a depleção de sódio e potássio.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V – V.



39. A Hemorragia é uma complicação grave, que pode ocorrer no pós-operatório imediato ou até vários dias após a cirurgia.

Considere as afirmações abaixo sobre hemorragia.

I - Quando o sangramento for evidente, uma compressa de gaze esterilizada e um curativo compressivo devem ser aplicados.

II - É uma complicação comum, visto que a integridade tissular da pele está prejudicada por fatores mecânicos.

III- Pode resultar em choque hipovolêmico e morte.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

40. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma medida de prevenção de infecção no paciente com cateter urinário de demora.

- (A) Assegurar um fluxo livre de urina.
- (B) Evitar o movimento de vaivém do cateter.
- (C) Coletar amostras de urina desconectando o equipo somente após assepsia, com antisséptico padronizado.
- (D) Usar técnica asséptica rigorosa durante a inserção do cateter.
- (E) Trocar o cateter somente para corrigir problemas, como extravasamento, bloqueio ou incrustações.