

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 02/2015 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 15

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Adulto: Clínica, Cirúrgica e Obstétrica)

01.	C	11.	E	21.	D	31.	A
02.	A	12.	E	22.	D	32.	E
03.	D	13.	B	23.	D	33.	B
04.	B	14.	B	24.	E	34.	D
05.	C	15.	E	25.	C	35.	E
06.	D	16.	A	26.	C	36.	D
07.	A	17.	D	27.	D	37.	E
08.	A	18.	C	28.	E	38.	B
09.	A	19.	B	29.	A	39.	B
10.	A	20.	D	30.	C	40.	B



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 02/2015 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

PS 15 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Adulto: Clínica, Cirúrgica e Obstétrica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica) e o Caderno de Respostas, quando se tratar de prova dissertativa. Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Assinale a alternativa que apresenta os cuidados a serem dispensados ao paciente em pós-operatório imediato de prostatectomia.

- (A) Avaliação da dor, observação dos sinais vitais, verificação de oligúria e disúria, de sinais de disfunção ventilatória e de rigidez de nuca.
- (B) Avaliação da dor, verificação de hipoglicemia, manutenção de infusão de heparina plena em bomba para prevenção de trombose venosa profunda.
- (C) Avaliação da dor, observação dos sinais vitais, manutenção de registros quanto à ingestão de líquidos e ao débito urinário, verificação da permeabilidade do sistema de drenagem urinária.
- (D) Observação dos sinais vitais, verificação de hipoglicemia, manutenção de registros quanto à ingestão de líquidos e ao débito urinário, observação de icterícia.
- (E) Observação dos sinais vitais, manutenção de registros quanto à ingestão e ao débito, verificação de fotofobia e distensão abdominal.

02. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda, associando as definições aos respectivos termos relacionados ao paciente cirúrgico.

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Gastrectomia | () Abertura do estômago com a finalidade de administrar líquidos e medicamentos |
| (2) Gastrostomia | () Utilizada para descomprimir o estômago e remover gás e líquidos, administrar medicamentos e alimentos, lavar o estômago e remover substâncias tóxicas |
| (3) Sonda Gástrica | () Alimentação por sonda localizada no estômago ou duodeno |
| (4) Alimentação parenteral | () Alimentação por cateter central inserido em veia subclávia ou jugular externa |
| (5) Alimentação Enteral | () Retirada parcial / total do estômago |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (C) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- (D) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (E) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.

03. Considere as afirmações abaixo sobre os drenos cirúrgicos.

- I - São tubos que saem da área peri-incisional, podendo drenar sangue e líquidos serosos.
- II - Devem ser realizados registros do local do dreno, do volume e do aspecto da drenagem.
- III- É importante tracionar os diferentes tipos de drenos localizados na região abdominal, diariamente, após o banho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. Histerectomia é uma operação cirúrgica que consiste na retirada do útero. Quais os cuidados de enfermagem específicos a uma paciente submetida à histerectomia?

- (A) Controlar os sinais vitais, observar hipoglicemia, bem como turgência na veia jugular externa.
- (B) Controlar os sinais vitais e a dor, observar sangramento vaginal e na ferida operatória (FO), bem como a distensão abdominal.
- (C) Controlar os sinais vitais, a dor, a cefaleia, a epistaxe.
- (D) Observar sangramento vaginal e na ferida operatória (FO), bem como hiperglicemia e hálito cetônico.
- (E) Observar sangramento vaginal e na ferida operatória (FO), bem como vômitos esverdeados.



05. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados com paciente com dreno de tórax.

- (A) Verificação dos sinais vitais, oximetria de pulso, decúbito dorsal, cuidados com drenos de tórax em sistema fechado, mantendo clampeadas as extensões do sistema de drenagem.
- (B) Verificação dos sinais vitais, oximetria de pulso, posicionamento da cabeceira com elevação de 30°, cuidados com drenos de tórax em sistema aberto e com as extensões para não dobrarem e não ocluírem a drenagem.
- (C) Verificação dos sinais vitais, oximetria de pulso, posicionamento da cabeceira elevada, cuidados com drenos de tórax em sistema fechado e com as extensões para não dobrarem e não ocluírem a drenagem.
- (D) Verificação dos sinais vitais, oximetria de pulso, posicionamento em decúbito dorsal ou lateral, cuidados com drenos de tórax em sistema aberto, mantendo fechado pelo menos um dos sistemas de drenagem.
- (E) Verificação dos sinais vitais, oximetria de pulso, posicionamento em decúbito lateral em ângulo reto, cuidados com drenos de tórax em sistema fechado e com as extensões para não dobrarem e não ocluírem a drenagem.

06. Tireoidectomia consiste em remoção cirúrgica da tireoide, sendo um possível tratamento para o câncer de tireoide. Quais os cuidados de enfermagem a um paciente submetido à tireoidectomia?

- (A) Verificar sinais vitais, avaliar a dor, manter cabeceira plana, incentivar o paciente a sair do leito e a conversar.
- (B) Verificar sinais vitais, avaliar a dor, observar sinais de hemorragia subcutânea e de formação de hematoma na ferida operatória e realizar coleta de fezes.
- (C) Verificar sinais vitais, avaliar a dor, manter cabeceira em 90°, observar sinais de hemorragia intracraniana e formação de hematoma na ferida operatória.
- (D) Verificar sinais vitais, avaliar a dor, observar sinais de hemorragia subcutânea e formação de hematoma na ferida operatória, realizar testes hipocalcemia.
- (E) Verificar sinais vitais, avaliar a dor de seis em seis horas, manter cabeceira plana, manter o paciente em repouso absoluto no leito, com a menor comunicação possível, realizar testes de hipocalcemia.

07. Considere os cuidados a seguir.

- I - Verificação da pulseira de identificação do paciente antes de encaminhar ao Centro Cirúrgico, troca da roupa por avental.
- II - Remoção de prótese dentária após a indução anestésica, retirada de joias, alianças e *piercing*.
- III- Troca da roupa por avental na chegada ao Centro Cirúrgico, identificação dos objetos de valor e guarda em local seguro, de acordo com a rotina da instituição.

Quais desses cuidados deve receber o paciente já internado em hospital e encaminhado a Centro Cirúrgico para realização de cirurgia abdominal?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

08. As precauções de isolamento são diretrizes criadas para evitar a transmissão de micro-organismos. Assinale a alternativa correta em relação a esse tema.

- (A) As precauções baseadas na transmissão destinam-se ao cuidado de pacientes com doenças infecciosas suspeitas ou comprovadas.
- (B) As precauções padrão visam o cuidado aos pacientes com doenças infecciosas comprovadas.
- (C) Os elementos das precauções padrão incluem máscara de carvão ativado, avental, propés, luvas e óculos de proteção.
- (D) A máscara cirúrgica comum deve ser usada em casos de secreção abundante em ferida operatória.
- (E) Todos os pacientes com doenças infecciosas deveriam ser colocados em quartos de isolamento, independentemente do modo de transmissão.

09. Assinale a alternativa correta em relação à verificação dos sinais vitais.

- (A) Um tamanho do manguito do esfigmomanômetro inadequado ao paciente pode mostrar uma medida não fidedigna da pressão arterial.
- (B) O número de movimentos respiratórios deve sempre ser observado com o paciente deitado.
- (C) A temperatura que apresenta maior fidedignidade é tomada na região axilar.
- (D) A medida do pulso é expressa em mmHg.
- (E) A intensidade da dor deve ser medida com o paciente sentado.



10. Assinale a alternativa correta sobre Ética.

- (A) A Ética, a Moral e a Lei se referem às ações desenvolvidas pelos seres humanos.
- (B) A Lei busca as justificativas para as ações e a Moral e a Ética estabelecem regras para essas ações.
- (C) A regras éticas têm, em geral, caráter universal, enquanto que as morais se aplicam a uma determinada comunidade organizada.
- (D) As inter-relações da Ética com a Moral e a Lei não geram conflitos por tratarem aspectos diferenciados.
- (E) A Ética, a Moral e a Lei possuem visões iguais sobre o comportamento humano.

11. Considere as afirmações abaixo sobre a identificação do paciente.

- I - Deve-se manter vigilância constante quanto à integridade da pele do membro onde se encontra a pulseira de identificação.
- II - Em caso de não aceitação do uso da pulseira de identificação ou de impossibilidade do seu uso em virtude das condições clínicas do paciente, deve-se utilizar uma alternativa contendo dados de identificação.
- III - A confirmação da identidade deve ser feita com o próprio paciente ou com o seu acompanhante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

12. Paciente com prescrição de soroterapia, com volume de 1000ml em Bomba de Infusão (BI) a 60ml/hora, iniciou a solução às 5 horas, sendo que às 7 horas, restavam 750ml para serem infundidos. Nesse caso, a bomba foi

- (A) planejada corretamente a 60ml/hora.
- (B) planejada mais lenta a 25ml/hora.
- (C) planejada mais rápida a 250ml/hora.
- (D) planejada mais lenta a 50ml/hora.
- (E) planejada mais rápida a 125ml/hora.

13. Se prescrita uma solução de 500ml de soro glicosado a 5%, correndo a 50 gotas por minuto, em quanto tempo essa solução deverá terminar aproximadamente?

- (A) 2,33 horas.
- (B) 3,33 horas.
- (C) 4,33 horas.
- (D) 5,33 horas.
- (E) 6,33 horas.

14. Considerando a Norma Regulamentadora (NR) 32, que determina as questões sobre segurança do trabalhador, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser assegurado ao trabalhador o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança.
- (B) Após o uso de agulhas, o trabalhador deve reencapar as mesmas e colocar em lixo próprio para perfurocortantes.
- (C) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes são os responsáveis pelo seu descarte.
- (D) As medidas de prevenção de acidentes devem ser fornecidas por escrito aos trabalhadores.
- (E) O empregador deve assegurar capacitação oferecida pelas empresas comercializadoras de dispositivos de segurança aos trabalhadores do serviço de saúde.

15. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à Política Nacional de Humanização (PNH).

- (A) Tem como princípio norteador o estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- (B) Prioriza a redução das filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- (C) Fortalece o trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a formação de grupos de trabalho.
- (D) Garante, na atenção hospitalar, a visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- (E) Desestimula a prática terapêutica alternativa e incentiva o uso de medicamentos.



16. Com relação à administração de antineoplásicos, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Cabe ao técnico de enfermagem comunicar ao enfermeiro responsável qualquer alteração com a infusão da quimioterapia ou qualquer queixa do paciente.
- () Devem-se usar luvas quando for necessário manusear os agentes antineoplásicos e as excreções dos pacientes que receberam quimioterapia.
- () Os resíduos de antineoplásicos devem ser descartados no lixo comum.
- () São sinais indicativos de extravasamento de agentes vesicantes: queimação ou dor, edema ou rubor no local.
- () Náuseas e vômitos são os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

17. Com relação à administração de medicamentos, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A via subcutânea é muito vascularizada, sendo sua absorção rápida.
- () A via retal é indicada para a administração de medicamentos nos casos em que há constipação intestinal e no preparo de exames e cirurgias.
- () Punção em vaso sanguíneo profundo, formação de nódulos e fascite são riscos da administração de medicamento por via intramuscular.
- () Não é necessário checar o nome do paciente ao administrar o medicamento.
- () A via oral é econômica e de fácil administração, indicada para pacientes conscientes e sem problemas de deglutição.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira relacionando cada termo ao seu respectivo significado.

- (1) Quimioterapia
 - (2) Radioterapia
 - (3) Extravasamento
 - (4) Neoplasia
 - (5) Vesicante
- () Substância que pode causar necrose e dano tecidual, principalmente quando extravasada.
 - () Uso de medicamento para matar as células tumorais ao interferir com as funções e a reprodução celular.
 - () Crescimento celular descontrolado que não sucede a nenhuma demanda fisiológica.
 - () Uso de radiação ionizante para interromper o crescimento das células malignas.
 - () Infiltração de medicamentos a partir das veias para os tecidos subcutâneos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (B) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 5 – 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.

19. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem em paciente com sonda vesical de demora.

- (A) A bolsa de drenagem deve ser colocada no chão para evitar refluxo de urina.
- (B) Deve-se realizar a higiene das mãos antes e depois de manusear o sistema de drenagem.
- (C) Deve-se manter o sistema de drenagem acima do nível da bexiga do paciente.
- (D) Deve-se desconectar o sistema de drenagem para coletar amostras de urina.
- (E) Para medir drenagem de urina, devem ser utilizadas luvas esterilizadas.

20. Sobre o banho de leito, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) tem como finalidade proporcionar higiene e conforto.
- (B) permite ao cuidador avaliar as condições da pele.
- (C) o autocuidado deve ser estimulado.
- (D) deve ser iniciado pela região perineal.
- (E) a privacidade do paciente deve ser preservada.



21. Considere as afirmações abaixo sobre cuidados de enfermagem na administração de medicações por sonda nasointestinal (SNE).

- I - Antes da administração do medicamento, o paciente deve ser colocado em posição de Fowler (cabeceira elevada em torno de 45°), e a sonda deve ser testada para saber se está na posição correta.
- II - Após o uso com alimentos ou medicação, é necessário irrigar a sonda com 20ml de água, evitando possíveis obstruções.
- III- Para melhorar a absorção, os medicamentos, ao serem administrados, devem ser misturados diretamente com as fórmulas enterais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados de enfermagem em paciente com insuficiência cardíaca.

- (A) Deve-se realizar balanço hídrico no mínimo uma vez por semana.
- (B) Deve-se pesar o paciente diariamente, comumente pela manhã e após evacuar, após urinar e após caminhar.
- (C) Deve-se avaliar rigidez de nuca e vômitos.
- (D) Deve-se avaliar sintomas de sobrecarga hídrica, como dispneia noturna, ortopneia.
- (E) Deve-se estimular a adesão à dieta rica em sódio, bem como a ingestão de líquidos.

23. Assinale a alternativa correta sobre a pressão arterial.

- (A) A hipotensão postural ocorre quando o paciente assume a posição deitada.
- (B) A pressão arterial deverá ser verificada com o paciente sentado, de pernas cruzadas, evitando conversar enquanto é feita a medida.
- (C) A hipertensão arterial é definida como pressão arterial diastólica acima de 130mmHg e sistólica acima de 60mmHg.
- (D) O paciente deve evitar o uso de cigarros e ingestão de cafeína por 30 minutos antes que sua a pressão arterial seja medida.
- (E) O tratamento da hipertensão arterial é apenas farmacológico.

24. Considere as afirmações abaixo sobre a administração de insulina.

- I - As insulinas NPH e Regular podem ser misturadas na mesma seringa, quando administradas no mesmo horário.
- II - Para a via de administração subcutânea de insulina, é recomendado o rodízio sistemático de sítios de injeção, para evitar alterações no tecido subcutâneo (lipodistrofia).
- III- As principais regiões de aplicação de insulina são: abdômen, parte superior dos braços (superfície posterior), coxas (superfície anterior) e quadris.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

25. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando cada tipo de insulina a suas características.

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Insulina Regular | () Início de ação de 30 minutos a 1 hora após aplicação. |
| (2) Insulina NPH | () Início de ação de duas a três horas após aplicação. |
| | () Tem coloração esbranquiçada, turva. |
| | () Pode ser administrada por via endovenosa. |
| | () Tem ação prolongada. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (C) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (E) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.



26. Assinale a alternativa correta sobre a administração de oxigênio suplementar.

- (A) Tem como objetivo melhorar a oxigenação, a perfusão tecidual, sem necessidade de prescrição médica.
- (B) O cateter nasal tem como vantagens ser leve, de baixo custo, devendo permanecer na mesma narina.
- (C) O uso por máscara de Venturi tem como vantagem permitir a administração de variadas concentrações de oxigênio.
- (D) A equipe de enfermagem deve estar atenta para sinais de sofrimento respiratório como taquipneia, rigidez de nuca, vibração de asas do nariz.
- (E) O uso do umidificador de oxigênio ocasiona irritação e lesão das mucosas nasais.

27. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando os distúrbios do sistema renal aos seus respectivos conceitos.

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) Anúria | () Micção dolorosa ou difícil |
| (2) Oligúria | () Sangue na urina |
| (3) Hematúria | () Pus na urina |
| (4) Piúria | () Produção urinária quase ausente. |
| (5) Disúria | () Baixa produção de urina |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.

28. Considere as definições abaixo relativas aos distúrbios da vesícula biliar.

- I - Colecistite: inflamação da vesícula biliar.
- II - Colelitíase: presença de cálculos na vesícula biliar.
- III- Colectomia: remoção da vesícula biliar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, no que se refere à cirurgia ortopédica.

- | | |
|------------------------|---|
| (1) Fixador externo | () Armação metálica externa presa aos fragmentos ósseos de modo a estabilizá-los. |
| (2) Aparelho gessado | () Infecção óssea. |
| (3) Tração cutânea | () Dispositivo de imobilização externa rígido, modelado de acordo com os contornos da parte do corpo afetada. |
| (4) Tração esquelética | () Emprega-se para controlar o espasmo muscular por meio de uma tração com pesos sobre a fita de tração ou de uma bota de espuma presa à pele. |
| (5) Osteomielite | () Aplica-se diretamente no osso por meio de um pino ou fio metálico, inserido através do osso distal a fratura. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.
- (B) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (D) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.
- (E) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

30. Marque com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações a seguir sobre a traqueostomia.

- () A aspiração da traqueostomia não deve ser prolongada, pois pode provocar hipóxia.
- () A limpeza da cânula metálica deve ser realizada com água e sabão neutro.
- () A traqueostomia pode ser um procedimento temporário ou permanente.
- () A pressão de balonete da cânula plástica de traqueostomia deve ser controlada a fim de evitar lesão tecidual.
- () O curativo da traqueostomia deve manter-se úmido para promover uma regeneração da pele e o posterior fechamento do orifício.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.



31. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a assistência integral ao paciente e a sua família.

- (A) No âmbito hospitalar, deve-se orientar as famílias de que a religiosidade não traz benefícios à saúde, desmistificando as crenças individuais e desencorajando as práticas religiosas.
- (B) A família desempenha um papel central na vida do paciente e é parte importante do contexto de sua vida. Quando um membro da família fica doente, todos os membros são afetados.
- (C) A depressão é uma resposta comum aos problemas de saúde e, com frequência, é um problema subdiagnosticado na população de pacientes.
- (D) Para promover um cuidado espiritual, deve-se estar apto e presente para apoiar os pacientes quando vivenciam dúvida, medo, sofrimento, desespero ou outros estados psicológicos difíceis da vida.
- (E) As intervenções com os membros da família baseiam-se no reforço das habilidades de enfrentamento do estresse através do cuidado direto, habilidades de comunicação e educação.

32. Considere as afirmações abaixo sobre a dor.

- I - A dor aguda tem início súbito e quase sempre é associado a uma lesão específica, indicando que ocorreu comprometimento ou lesão.
- II - A dor crônica é a dor constante ou intermitente que persiste certo período de tempo.
- III- Na avaliação da dor do paciente, pode-se utilizar escalas análogas visuais e numéricas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

33. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação à dor.

- (A) As respostas comportamentais à dor podem incluir afirmações verbais, comportamentais, vocais, expressões faciais, movimentos corporais.
- (B) Frequências cardíaca e respiratória aumentadas, palidez e sudorese constituem indicadores de dor, substituindo o relato verbal do paciente orientado.
- (C) A experiência dolorosa de uma pessoa é influenciada por inúmeros fatores, incluindo as experiências pregressas com dor, ansiedade, idade e expectativas a respeito do alívio da dor.
- (D) A fadiga provocada pela dor pode deixar o paciente exausto, impedindo-o de resmungar ou chorar, comportamentos que seriam uma resposta normal à dor.
- (E) Além do tratamento farmacológico para a dor, pode-se orientar o paciente a utilizar técnicas não farmacológicas, como massagem, terapia de calor e frio e técnicas de relaxamento.



34. Considere os dados abaixo.

Horário	Vômitos	Sonda nasointestinal	Sonda vesical de demora	Medicação endovenosa	Dreno de sucção	Anotações
1:00	200ml					Vômitos borráceos
5:00				32ml		Dipirona + metoclopramida
5:30		250ml	300ml		50ml	Administrado água
8:00		240ml				Dieta
11:00				30ml		Dipirona
12:00		240ml	400ml		40ml	Dieta
16:00		240ml				Dieta
17:00				30ml		Dipirona
18:00		250ml	350ml		35ml	Administrado água
20:00		240ml				Dieta
23:00				30ml		Dipirona
24:00		240ml	400ml		30ml	Dieta

De acordo com os dados acima, qual o balanço hídrico parcial do turno da manhã – das 7 às 13 horas – e o balanço hídrico total?

- (A) Balanço hídrico parcial = 510ml; balanço hídrico total = 1822ml
- (B) Balanço hídrico parcial = 440ml; balanço hídrico total = 1805ml
- (C) Balanço hídrico parcial = 70ml; balanço hídrico total = 1822ml
- (D) Balanço hídrico parcial = 70ml; balanço hídrico total = 17ml
- (E) Balanço hídrico parcial = -17ml; balanço hídrico total = 70ml

35. Considere as afirmativas a seguir sobre o processo de enfermagem.

- I - O processo de enfermagem é uma abordagem de solução de problemas para satisfazer as necessidades de enfermagem e de cuidados de saúde de uma pessoa.
- II - A criação de um plano de cuidados atualizado e flexível para atender aos vários problemas e necessidades do paciente faz parte do processo de enfermagem.
- III- O registro escrito do processo de enfermagem é uma forma efetiva de comunicação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

36. Considere as afirmativas abaixo sobre as vantagens do alojamento conjunto.

- I - A convivência contínua entre mãe e bebê facilita o conhecimento mútuo e a satisfação das necessidades físicas e emocionais do recém-nascido (RN).
- II - O alojamento conjunto aumenta a promoção do aleitamento materno e prolonga o tempo de amamentação.
- III- Bebês em alojamento conjunto dormem menos e choram mais do que quando se encontram no berçário.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.



37. Com relação às atribuições da equipe de saúde no alojamento conjunto, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Deve-se manter o aleitamento materno a cada quatro horas.
- () Não se deve dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser por indicação médica.
- () Devem-se utilizar bicos artificiais ou chupetas com crianças amamentadas no seio.
- () Deve-se orientar as mães para que não amamentem outros RNs que não os seus.
- () Devem-se realizar visitas diárias à mãe, esclarecendo, orientando e promovendo segurança quanto ao estado de saúde de seu filho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

38. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a posição mais adequada para o RN dormir é a posição

- (A) ventral.
- (B) dorsal.
- (C) lateral.
- (D) prona.
- (E) próclive.

39. Mulher de 62 anos de idade, que se recupera de um infarto do miocárdio, é admitida na unidade de internação. Durante a explicação da rotina da unidade, a paciente informa que está ansiosa e, de repente, diz que não consegue respirar. Qual a primeira conduta a ser tomada?

- (A) Chamar o acompanhante ou familiar.
- (B) Verificar os sinais vitais.
- (C) Verificar a temperatura axilar.
- (D) Conferir o horário da próxima medicação.
- (E) Revisar o prontuário da paciente.

40. Em relação à coleta de exames laboratoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) As fezes podem ser coletadas das fraldas, mesmo na presença de urina, se o paciente fizer uso das mesmas.
- (B) Nas coletas laboratoriais, a pulseira de identificação do paciente deve ser comparada com a etiqueta da amostra coletada.
- (C) Amostras de escarro devem ser coletadas preferencialmente após as refeições.
- (D) A amostra de urina do paciente que faz uso de sonda vesical de demora deve ser obtida diretamente da bolsa de drenagem.
- (E) Após a coleta de urina, o transporte pode ser feito em 24 horas, sem prejuízo da amostra.

