

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 01/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

# PS 12 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica e/ou Centro Cirúrgico Ambulatorial)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n.º: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 01/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 12

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

(Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica e/ou Centro Cirúrgico Ambulatorial)

01.	D	11.	C	21.	D	31.	A
02.	ANULADA	12.	E	22.	C	32.	B
03.	A	13.	D	23.	D	33.	E
04.	D	14.	C	24.	E	34.	C
05.	D	15.	B	25.	C	35.	ANULADA
06.	B	16.	A	26.	B	36.	E
07.	A	17.	A	27.	A	37.	E
08.	C	18.	E	28.	D	38.	D
09.	A	19.	B	29.	C	39.	B
10.	B	20.	D	30.	D	40.	D



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3,5)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1,5) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** Os principais objetivos da estrutura terminológica para as cirurgias é fornecer, de forma verbal e escrita, uma definição do termo cirúrgico, descrever os diversos tipos de cirurgia, facilitar o preparo de instrumentais e equipamentos apropriados e padronizar uma linguagem que seja de alcance universal para o entendimento. Com base nesta afirmação, relacione os termos cirúrgicos aos seus respectivos objetivos.

- (1) Blefaroplastia
- (2) Esplenectomia
- (3) Flebotomia
- (4) Gastrostomia
- (5) Histerectomia

- ( ) Dissecção da veia  
 ( ) Remoção do útero  
 ( ) Alteração da forma das pálpebras  
 ( ) Abertura e colocação de sonda no estômago  
 ( ) Remoção do baço

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- (B) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- (D) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- (E) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

**02.** Para que a cirurgia possa ser realizada adota-se, obrigatoriamente, o consentimento informado. Assinale a alternativa correta em que o consentimento informado é necessário:

- (A) procedimentos invasivos, como incisão cirúrgica, uma biópsia ou uma aplicação de botox.
- (B) procedimentos que exigem sedação e/ou anestesia.
- (C) procedimento cirúrgico, como arteriografia, em que há risco para o paciente.
- (D) procedimento sem radiação.
- (E) procedimento com RX abdominal ou torácico.

**03.** No que diz respeito à avaliação sistemática do paciente, durante o período em que o paciente permanecer na sala de recuperação pós-anestésica, é recomendado

- (A) que ele seja avaliado a cada 15 minutos na 1ª hora, caso se apresente estável, a cada 30 minutos na 2ª hora e, a partir daí, de hora em hora.
- (B) avaliar os sinais vitais, desconsiderando os valores obtidos no período pré-operatório.
- (C) avaliar a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura axilar e a presença de dor, não considerando o estado emocional do paciente.
- (D) avaliar a presença ou a ausência de eliminação urinária apenas nos pacientes submetidos a anestesia geral.
- (E) avaliar o padrão respiratório, desconsiderando a SPO<sub>2</sub>.

**04.** Sobre o objetivo do uso dos sedativos e analgésicos na endoscopia, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) causa a diminuição da memória do procedimento.
- (B) alivia a ansiedade.
- (C) evita ou diminui o processo de dor.
- (D) melhora os parâmetros de monitoração.
- (E) os fármacos com propriedades hipnótico-sedativas mais utilizados são benzodiazepínicos, propofol e opioides.

**05.** Em relação à transmissão de infecções relacionadas aos procedimentos endoscópicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Do paciente para ele mesmo (microbiota endógena).
- (B) Do paciente para outro paciente.
- (C) Do ambiente para o paciente.
- (D) Do endoscópio para o paciente.
- (E) Do paciente para a equipe médica.

**06.** A desinfecção é o processo de eliminação ou destruição de microorganismos na forma vegetativa, independentes de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos ou objetos. Sobre a desinfecção em endoscópios, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Existe a desinfecção de alto nível e a desinfecção de nível intermediário.
- (B) Na desinfecção de alto nível são inativadas todas as formas vegetativas de bactérias, micobactérias, fungos, vírus e esporos bacterianos.
- (C) A desinfecção de nível intermediário não necessariamente inativa todas as formas vegetativas (ex. *Mycobacterium SP.*).
- (D) A desinfecção pode ser de baixo, médio ou alto nível.
- (E) A desinfecção pode ser realizada através de processos físicos e químicos.

**07.** A colonoscopia ou endoscopia baixa consiste no exame de intestino grosso com aparelho flexível com finalidades diagnósticas e terapêuticas. Sobre a colonoscopia, é correto afirmar que

- (A) o exame é realizado após o preparo intestinal.
- (B) geralmente é feita sob anestesia geral.
- (C) é indicada somente para esclarecer quadros de anemia.
- (D) apenas a montagem e organização da sala de exame estão dentre as atribuições da equipe de enfermagem.
- (E) se trata de um exame invasivo, simples e sem riscos.



**08.** A broncoscopia é um procedimento invasivo que permite a avaliação da via respiratória, podendo ser um procedimento diagnóstico ou terapêutico. Sobre a broncoscopia em pediatria, é correto afirmar que

- (A) é realizada apenas com aparelhos flexíveis.
- (B) o broncoscópio não possibilita que o exame seja gravado.
- (C) pode ser indicada para crianças com estridor.
- (D) o endoscopista realiza os exames sem a equipe de enfermagem.
- (E) o exame é realizado em posição lateral.

**09.** Os agentes antissépticos são mundialmente utilizados na área hospitalar para a realização do preparo da pele em procedimentos invasivos. Assinale a alternativa que contém os tipos de antissépticos mais utilizados.

- (A) Iodóforos, álcool e gluconato de clorexidina.
- (B) Iodóforos, álcool e glutaraldeído.
- (C) Ácido peracético, álcool e gluconato de clorexidina.
- (D) Iodóforos, glutaraldeído e gluconato de clorexidina.
- (E) Glutaraldeído, álcool e gluconato de clorexidina.

**10.** O campo de enfermagem perioperatória inclui uma ampla variedade de funções de enfermagem. Este período consiste em três fases e uma delas é a fase intraoperatória. Qual a alternativa que corresponde à atividade da enfermagem na fase intraoperatória?

- (A) Avaliação do estado do paciente (estados de dor e nutricional basal).
- (B) Aplicação do dispositivo de aterramento do paciente.
- (C) Preenchimento da avaliação pré-operatória.
- (D) Determinar a resposta imediata do paciente à intervenção cirúrgica.
- (E) Orientar o autocuidado do paciente durante o período de recuperação imediato.

**11.** A primeira avaliação no período pós-operatório imediato consiste em manter

- (A) o paciente aquecido.
- (B) a capacidade de deglutição.
- (C) a ventilação pulmonar.
- (D) o nível de consciência.
- (E) o paciente sem dor.

**12.** Considere as afirmações a seguir sobre os cuidados de enfermagem em sala de recuperação pós-anestésica.

I - As principais complicações cardiovasculares observadas em sala de recuperação pós-anestésica incluem a hipotensão e o choque, hemorragia, hipertensão e arritmias.

II - Os objetivos dos cuidados de enfermagem ao paciente em sala de recuperação consistem em fornecer cuidados até que o paciente tenha se recuperado dos efeitos da anestesia, esteja orientado, apresente sinais vitais estáveis, sem sinais de hemorragia, nem de outras complicações.

III - As avaliações frequentes e competentes do nível de saturação de oxigênio no sangue, frequência e regularidade do pulso, profundidade e natureza das respirações, coloração da pele, nível de consciência e a capacidade de responder aos comandos são referenciais nos cuidados de enfermagem na sala de recuperação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**13.** A oximetria de pulso (SPO<sub>2</sub>) mede a saturação de oxigênio da hemoglobina. Os valores normais da SPO<sub>2</sub> são

- (A) abaixo de 85%.
- (B) acima de 100%.
- (C) abaixo de 50%.
- (D) de 95 a 100%.
- (E) de 50 a 85%.

**14.** Dentre os cuidados no pós-operatório de cirurgia de Bypass arterial é necessário avaliar e comparar o membro operado com o outro membro, atentando para

- (A) enchimento capilar e trocas gasosas.
- (B) pulsos e oximetria.
- (C) pulsos, cor e temperatura.
- (D) trocas gasosas e pressão arterial.
- (E) cor, temperatura e trocas gasosas.

**15.** Quais dos sinais e sintomas **NÃO** estão relacionados à reação ao látex?

- (A) Eritema de contato.
- (B) Hipertermia.
- (C) Broncoespasmo.
- (D) Sibilância.
- (E) Dor ou opressão torácica.



**16.** No pós-operatório imediato do paciente submetido à traqueostomia é importante observar rigorosamente sinais de \_\_\_\_\_, edema e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) sangramento – enfisema subcutâneo
- (B) sangramento – taquicardia
- (C) rubor – enfisema subcutâneo
- (D) taquicardia – cefaleia
- (E) rubor – cefaleia

**17.** Sobre os cuidados pós-transplante renal, está correto afirmar que

- (A) o rim de um doador vivo aparentado com o paciente geralmente começa a funcionar logo após a cirurgia.
- (B) o paciente transplantado renal nunca mais precisará de hemodiálise.
- (C) os líquidos EV serão sempre administrados em pequenos volumes no pós-operatório imediato.
- (D) não é necessário monitorar o acesso vascular para hemodiálise após a cirurgia.
- (E) o rim de um doador cadavérico funcionará somente após passadas 3 semanas da cirurgia.

**18.** O nível de consciência é avaliado com base nos critérios da Escala de Coma de

- (A) Aldrete e Kroulik.
- (B) Chvostek e Trousseau.
- (C) Braden.
- (D) Chipps.
- (E) Glasgow.

**19.** O posicionamento da perna do paciente em pós-operatório de Artroplastia do Quadril é

- (A) cruzada.
- (B) em abdução.
- (C) elevada.
- (D) em adução.
- (E) flexionada.

**20.** Drogas vasoativas é a denominação dada aos medicamentos que têm a propriedade de atuar no endotélio vascular das veias ou artérias. Apresentam respostas dose-dependentes de efeito rápido e curto. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as drogas vasoativas com a sua utilização em pacientes críticos.

- (1) Adrenalina
- (2) Noradrenalina
- (3) Nitroprussiato de sódio
- (4) Dobutamina

- ( ) Droga de escolha na terapia do choque séptico.
- ( ) Utilizada para elevar pressão arterial nos pacientes com choque.
- ( ) Utilizada em manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
- ( ) Utilizada no tratamento de crises hipertensivas.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2.

**21.** A retenção urinária, depois da cirurgia, pode acontecer por diversos motivos. Qual das afirmações abaixo está **INCORRETA**?

- (A) A cirurgia abdominal, pélvica e do quadril pode aumentar a probabilidade de retenção secundária à dor.
- (B) Todos os métodos para incentivar o paciente a urinar deverão ser tentados.
- (C) Anestésicos, agentes anticolinérgicos e opioides interferem com a percepção da plenitude vesical.
- (D) O cateterismo de demora é preferido em relação ao cateterismo intermitente.
- (E) Mesmo quando o paciente urinar, a bexiga pode não ser necessariamente esvaziada.

**22.** Um SUS humanizado é aquele que reconhece o outro como legítimo cidadão de direitos, valorizando os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos aos seus respectivos significados, segundo a Política Nacional de Humanização.

- (1) Acolhimento
- (2) Alteridade
- (3) Ambiência
- (4) Equidade
- (5) Trabalho

- ( ) Conjunto dos fenômenos que caracterizam o ser vivo.
- ( ) Ambiente físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana.
- ( ) Processo construtivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador / equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- ( ) Experiência internalizada da existência do outro, não como um objeto, mas como um outro sujeito co-presente no mundo das relações intersubjetivas.
- ( ) Meios necessários para se alcançar a igualdade.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (B) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5.
- (E) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.

**23.** O decúbito dorsal é a posição cirúrgica mais comum. Assinale a alternativa que **NÃO** descreve os cuidados de enfermagem rotineiros desse posicionamento.

- (A) Utilizar colchão da mesa de cirurgia com redução de pressão e, se necessário, acolchoamento adicional.
- (B) Com os braços apoiados em talas, a extensão deverá ter um ângulo menor que 90 graus para evitar o estiramento e compressão do plexo braquial.
- (C) As talas de braço devem ser niveladas com o colchão da mesa cirúrgica.
- (D) É preferível que a posição rotacional da mão sobre a tala de braço esteja em pronação (palmas para baixo).
- (E) Uma faixa de segurança deverá ser aplicada a 5 cm acima dos joelhos. Um lençol ou cobertor sempre deverá ser colocado entre a faixa de segurança e a pele do paciente.

**24.** Sobre os cuidados de enfermagem com o eletrodo de dispersão da unidade eletrocirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O eletrodo de dispersão deverá ser posicionado sobre uma área que seja bem vascularizada, como uma massa muscular.
- (B) Em locais com excesso de pelos, proeminências ósseas, pele excessivamente seca ou tecido adiposo devem ser evitados.
- (C) Quando um paciente for reposicionado após aplicação do eletrodo de dispersão, o sítio deste deverá ser inspecionado para garantir adesão apropriada.
- (D) Quando o eletrodo de dispersão está em forma de tenda, os arcos de corrente elétrica da pele do paciente para o eletrodo fecham o circuito e podem provocar queimadura.
- (E) A monitorização da posição do eletrodo de dispersão não é responsabilidade da equipe de enfermagem.

**25.** Quanto aos cuidados de enfermagem durante cirurgias pediátricas, assinale a alternativa correta.

- (A) Ajustar a temperatura ambiente aproximadamente 5 minutos antes da chegada da criança.
- (B) Aquecer os cobertores, soluções de preparação da pele (de acordo com as instruções do fabricante) e soluções de irrigação e outras soluções até a temperatura de 39° C antes do uso.
- (C) Medir e registrar a quantidade de líquido de irrigação utilizado.
- (D) Fazer a pesagem somente das gazes descartadas em campo cirúrgico, em balanças em gramas, e anotar a perda estimada.
- (E) Medir e registrar o débito urinário. Os demais débitos de outros tubos de drenagem devem ser esvaziados e desprezados.

**26.** Sobre o controle da disseminação de organismos multirresistentes, assinale a alternativa correta.

- (A) As mãos dos profissionais de saúde não adquirem microrganismos multirresistentes por meio de contato direto com pacientes colonizados ou infectados por esses agentes.
- (B) As mãos dos profissionais de saúde podem adquirir microrganismos multirresistentes por meio de contato direto com o meio ambiente ou superfícies próximas aos pacientes.
- (C) Os microrganismos multirresistentes podem se tornar parte da microbiota da pele dos profissionais de saúde, sendo dificilmente removidos pela higienização das mãos.
- (D) As mãos dos profissionais de saúde não constituem a principal ponte entre o paciente colonizado e aquele que anteriormente não tinha tal *status*.
- (E) A bactéria *Acinetobacter spp*, apesar de resistente aos antibióticos, também permanece resistente aos antissépticos utilizados na higienização das mãos.

**27.** Sobre higienização das mãos e uso de luvas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É permitido o toque em superfícies e materiais (tais como telefone, maçanetas, portas) quando se estiver com luvas.
- (B) A utilização de gel alcoólico, preferencialmente a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina, pode substituir a higienização com água e sabonete, quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
- (C) Para higienização simples das mãos a duração do procedimento é de 40 a 60 segundos e, para fricção antisséptica das mãos (com preparações alcoólicas), a duração do procedimento é de 20 a 30 segundos.
- (D) Antes de iniciar uma das técnicas, é necessário retirar joias (anéis, pulseiras, relógio), pois sob tais objetos podem acumular microrganismos.
- (E) Durante o contato com o paciente, troque a luva quando for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo ou quando a luva estiver danificada.

**28.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a estrutura terminológica para cirurgias com suas respectivas referências.

- (1) Elevação, fixação de uma estrutura corpórea
- (2) Cálculo; pedra
- (3) Relativo à pálpebra
- (4) Relativo aos ovários
- (5) Realização de uma "nova boca"; comunicação de um órgão tubular ou oco com o meio externo
- (6) Relativo ao intestino delgado

- ( ) Blefaro
- ( ) Entero
- ( ) Ooforo
- ( ) Pexia
- ( ) Stomia
- ( ) Lito

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 6 – 4 – 1 – 5 – 3.
- (B) 3 – 5 – 4 – 1 – 6 – 2.
- (C) 4 – 5 – 3 – 1 – 6 – 2.
- (D) 3 – 6 – 4 – 1 – 5 – 2.
- (E) 3 – 6 – 5 – 2 – 4 – 1.



**29.** Sobre instrumentais e equipamentos videolaparoscópicos, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Os cabos ópticos utilizados em videocirurgia devem ser acondicionados em caixas fechadas com as pontas protegidas, seguindo uma conformação circular com diâmetro aproximado de 10 cm.
- ( ) Os telescópios podem ser segurados tanto pela parte ocular como pela parte distal, sendo guardados separadamente em caixas que permitam uma fixação adequada, evitando danos.
- ( ) Ao identificar a inexistência de fluxo de gás no laparoflato, verificar, inicialmente, se há gás disponível no cilindro por meio do mostrador, se a válvula do cilindro está aberta e revisar o sistema de fluxo de gás, descartando a possibilidade de obstruções na tubulação.
- ( ) A agulha de Verres é o segundo instrumental a ser utilizado no paciente e serve para conduzir o O<sub>2</sub> até a cavidade abdominal, possibilitando criar o pneumoperitônio.
- ( ) A microcâmera deve ser manipulada cuidadosamente, evitando quedas que provoquem um deslocamento das lentes, procurando não torcer, dobrar ou tracionar o cabo, pois acarretaria ruptura de fios.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

**30.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes aos cuidados com enfermagem durante o intraoperatório

- ( ) Deve-se colocar toalhas absorventes ou compressas sob a área a ser preparada para captar o excesso da solução degermante que goteje do sítio de preparação.
- ( ) Rugas e dobras no lençol da mesa cirúrgica não são fontes adicionais de pontos de pressão.
- ( ) Uma técnica efetiva para evitar o deslizamento do braço durante a cirurgia consiste em enrolar o lençol móvel suavemente ao redor do braço e, em seguida, enfiar o lençol entre o colchão e a plataforma da mesa cirúrgica.
- ( ) Deve-se evitar puxar ou arrastar o paciente; em lugar disso, utilizar as técnicas de levantamento.
- ( ) Fixar seguramente o paciente à mesa de cirurgia sem comprometer a circulação abaixo das faixas de contenção.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – F – F – V – V.

**31.** A Lista de Verificação da Organização Mundial da Saúde para Segurança Cirúrgica divide a cirurgia em três fases, cada uma correspondendo a um momento específico no fluxo normal de um procedimento. Assinale a alternativa correta quanto à divisão das três fases.

- (A) Entrada: período anterior à indução anestésica. Pausa cirúrgica: período após a indução e antes da incisão cirúrgica. Saída: período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, mas anterior à remoção do paciente da sala de operação.
- (B) Entrada: período anterior à indução anestésica. Pausa cirúrgica: período após a indução e a incisão cirúrgica. Saída: período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, mas anterior à remoção do paciente da sala de operação.
- (C) Entrada: período anterior à indução anestésica. Pausa cirúrgica: período após a indução e antes da incisão cirúrgica. Saída: período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida.
- (D) Entrada: período posterior à indução anestésica. Pausa cirúrgica: período após a indução e antes da incisão cirúrgica. Saída: período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, mas anterior à remoção do paciente da sala de operação.
- (E) Entrada: período anterior à indução anestésica. Pausa cirúrgica: período após a indução. Saída: período durante o fechamento da ferida.

**32.** Considere as afirmações a seguir sobre os itens que compõem a Lista de Verificação da Organização Mundial da Saúde para Segurança Cirúrgica.

- I - Identificação do paciente, sítio cirúrgico, procedimento, consentimento, oximetria de pulso no paciente e em funcionamento, risco de perda sanguínea maior que 500 ml.
- II - Confirmar que todos os membros da equipe se apresentaram pelo nome e função, quais as etapas críticas ou inesperadas, duração da cirurgia, os materiais necessários estão presentes e dentro do prazo de esterilização.
- III- As radiografias (RX) essenciais estão disponíveis, capnografia está funcionando, contagem de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas, se há algum problema com equipamento a ser resolvido.
- IV- Via aérea difícil / risco de aspiração, alergia conhecida, profilaxia antimicrobiana foi realizada nos últimos 60 minutos, há alguma preocupação específica em relação ao paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**33.** Tempos cirúrgicos caracteriza a sequência de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras, durante o ato operatório, sendo identificada por quatro tempos básicos na seguinte ordem:

- (A) Exérese, hemostasia, diérese, síntese.
- (B) Exérese, diérese, hemostasia, síntese.
- (C) Diérese, hemostasia, síntese, exérese.
- (D) Diérese, síntese, hemostasia, exérese.
- (E) Diérese, hemostasia, exérese, síntese.

**34.** Em relação aos tipos de anestesia, preencha corretamente as lacunas.

A \_\_\_\_\_ é um estado de inconsciência reversível, caracterizado por amnésia, analgesia, depressão dos reflexos, relaxamento muscular e depressão neurovegetativa.

A \_\_\_\_\_ é definida como a perda reversível da sensibilidade, decorrente da administração de um agente anestésico para bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo.

A \_\_\_\_\_ pode ser tópica ou infiltrativa e aplicada em mucosas.

A \_\_\_\_\_ pode ser utilizada em conjunto com outros tipos de anestesia. A droga mais utilizada tem sido o midazolam.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das frases acima.

- (A) anestesia geral – anestesia regional – sedação – anestesia local
- (B) anestesia geral – anestesia local – anestesia combinada – anestesia regional
- (C) anestesia geral – anestesia regional – anestesia local – sedação
- (D) anestesia inalatória – anestesia regional – anestesia local – sedação
- (E) anestesia intravenosa – anestesia peridural – sedação – anestesia local

**35.** A atuação profissional precisa estar alinhada com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o qual considera a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Marque a opção correta quanto aos direitos, responsabilidades e deveres pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem.

- (A) É uma responsabilidade exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- (B) É um direito exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (C) É um direito recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (D) É um dever avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (E) É uma responsabilidade proteger a pessoa, a família e a coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde.

**36.** Em relação aos analgésicos opioides comumente utilizados no tratamento da dor moderada e grave em adultos, assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A meperidina possui ação mais longa que a da morfina.
- ( ) A codeína, além de ser um analgésico opioide fraco, é também um antitussígeno.
- ( ) A morfina é um analgésico opioide potente de primeira escolha para analgesia pós-operatória.
- ( ) A meperidina produz um metabólito tóxico para o sistema nervoso central e pode provocar convulsões.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – V – V – F.

**37.** Em relação ao conceito de dor, considere as afirmações abaixo.

- I - A dor é uma experiência subjetiva.
- II - A dor pode ser compartilhada pela expressão verbal e não verbal.
- III- A dor é considerada uma experiência emocional e sensorial desagradável, associando ao dano tecidual real ou potencial.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**38.** Em relação à Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- ( ) Cabe ao SUS executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.
- ( ) Assistir o trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional.
- ( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- ( ) Formar recursos humanos na área de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) V – F – V – F – V.

**39.** As atividades desenvolvidas pelos integrantes das equipes que atuam no centro cirúrgico devem estar de acordo com as competências que lhe são exigidas e embasadas nos respectivos códigos do exercício profissional. Assinale a alternativa correta em relação às atribuições do circulante de sala.

- (A) Realizar a manutenção de equipamentos e reparos na área física da sala cirúrgica.
- (B) Fazer o controle dos pacotes de gases e compressas e, quando necessário, realizar a pesagem destes.
- (C) Auxiliar o cirurgião responsável no desenvolvimento do ato cirúrgico.
- (D) Participar no planejamento de reformas da planta física do setor.
- (E) Avaliar a permeabilidade das vias aéreas e nível de consciência do paciente após o término do procedimento.

**40.** Assinale a alternativa correta em relação ao registro de informações no prontuário do paciente.

- (A) O prontuário do paciente é um meio de comunicação entre a equipe médica e de enfermagem.
- (B) O prontuário fornece dados úteis à pesquisa, educação e planejamento a curto prazo.
- (C) O prontuário não serve como base para rever a qualidade do cuidado prestado.
- (D) O prontuário serve como registro legal e de cobrança dos serviços prestados e dos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente.
- (E) As instituições de saúde dispõem de um único sistema para registrar o cuidado ao paciente.