



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

# CADERNO DE QUESTÕES

## EDITAL 01/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 05 - ENFERMEIRO I - Psiquiatria

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 01/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 05


##### ENFERMEIRO I - Psiquiatria

01.	ANULADA	11.	E	21.	D
02.	A	12.	B	22.	ANULADA
03.	D	13.	E	23.	E
04.	D	14.	E	24.	D
05.	C	15.	A	25.	C
06.	E	16.	A		
07.	D	17.	C		
08.	B	18.	A		
09.	A	19.	B		
10.	C	20.	E		

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **duas (2) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**



**01.** Em relação aos principais conceitos desenvolvidos por Pichon-Rivière (apud ZIMERMAN, 2000), relacionados a grupos operativos, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o conceito de verticalidade se refere ao aqui e agora da totalidade grupal, e que o de horizontalidade, à história de cada indivíduo.
- (B) a pré-tarefa corresponde aos movimentos grupais que favorecem a realização de uma ação de real transformação.
- (C) na teoria dos vínculos, todo vínculo bicorporal é sempre tripessoal, tendo em vista os personagens parentais que estão introjetados em cada indivíduo.
- (D) o conceito de "tele", no modelo de cone invertido, designa o clima emocional do grupo.
- (E) na formação de papéis, o líder pode ser do tipo autoritário, democrático, *laissez-faire* ou demagógico.

**02.** A desospitalização e o movimento de crítica e reforma na psiquiatria introduziram novos elementos no campo de negociação entre famílias e no campo da saúde mental, obrigando as partes implicadas a rediscutirem as bases de uma nova relação. Considere as afirmações abaixo relacionadas às modalidades de cuidado aos familiares.

- I - As diferentes abordagens sistêmicas e psicodinâmicas contribuíram significativamente com suas teorias e práticas para confirmar, apoiadas no estatuto de ciência, a culpa da família na gênese da doença mental.
- II - As ideias do construcionismo social afetaram o modo de ver o trabalho com as famílias, as quais deixaram de existir independentemente do observador e começaram a ser abordadas como um desenho social não flexível, composto por pessoas que não compartilham significados.
- III- O modelo psicoeducativo tem por finalidade essencial diminuir ou impedir recaídas, correlacionando vulnerabilidade individual com fatores de estresse ambiental. Esse modelo resulta de estudos indicando que pacientes que retornaram ao convívio com familiares com alto grau de envolvimento emocional apresentaram menor taxa de recaídas no que se refere à reagudização dos sintomas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**03.** Considere as afirmações abaixo, referentes aos vínculos e configurações grupais, tendo em vista os planos das inter-relações do indivíduo.

- I - O plano intrapessoal não se refere à maneira como os objetos internalizados se relacionam entre si ou à forma como se vinculam mutuamente o consciente, o pré-consciente e o inconsciente; os pensamentos e os sentimentos; a parte infantil e a adulta.
- II - O plano interpessoal diz respeito às diversas formas pelas quais o indivíduo se relaciona com as demais pessoas de seus diversos grupos de convivência familiar, institucional e profissional.
- III- O plano transpessoal se refere às distintas modalidades pelas quais os indivíduos e os grupos se vinculam com as normas, leis e valores dos demais macrogrupos, bem como aos papéis e funções que eles desempenham no contexto sócio-político-cultural no qual estão inseridos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**04.** A partir da Reforma Psiquiátrica, as transformações na saúde mental operam em quatro campos: teórico-assistencial, técnico-assistencial, jurídico-político e sociocultural. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- I - No campo teórico-assistencial, tem-se construído uma rede de novos serviços nos quais se enfatiza a produção de saúde como produção de subjetividades.
- II - O campo técnico-assistencial tem como proposta a modernização e a humanização do hospital psiquiátrico e a ampliação de serviços hospitalares.
- III- No campo jurídico-político, destacam-se transformações referentes à doença mental que possibilitam o exercício dos direitos à cidadania, ao trabalho e à inclusão social.
- IV - No campo sociocultural, tem-se construído a imagem da instituição como um espaço de circulação, e a imagem da pessoa com diagnóstico psiquiátrico como cidadão que deve almejar contratualidade social.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.



**05.** Em relação às dimensões essenciais da atenção psicossocial, considere as seguintes afirmações.

- I - As concepções do processo saúde-doença e dos meios teórico-técnicos consideram a determinação e consistência psíquica e sociocultural dos problemas, e também os conflitos e contradições como constitutivos do sujeito e contingentes a sua situação, não sendo necessariamente removidos como efeito das ações terapêuticas.
- II - A organização das relações intrainstitucionais ocorre por meio da verticalização, havendo livre trânsito do usuário e da população e, também, divisão do trabalho interprofissional, integrada em profundidade.
- III- As relações da instituição e de seus agentes com a clientela e a população em geral caracterizam-se por ações que visam à integralidade em extensão (no território) e em profundidade (considerando toda a complexidade das demandas), e não por ações de atenção estratificada por níveis (primário, secundário e terciário).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.  
 (B) Apenas I e II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**06.** A esquizofrenia causa alterações no processo do pensamento, na percepção, no afeto e deteriora o funcionamento social. Assinale a alternativa que lista os sinais e os sintomas característicos da esquizofrenia.

- (A) Comportamento catatônico, fala desorganizada, impulsividade.  
 (B) Apatia, desagregação, hiperatividade.  
 (C) Embotamento afetivo, comportamento desorganizado, humor expansivo.  
 (D) Fala desorganizada, hiperatividade, abulia.  
 (E) Delírios, alucinações, embotamento afetivo.

**07.** Um homem de 44 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, chega à internação psiquiátrica, retraído, atento ao ambiente, com afeto embotado e relata para a enfermeira que alguém está tentando enviar uma mensagem através da televisão para ele. O relato do paciente sobre a tentativa de envio de mensagem através da televisão é um delírio de

- (A) perseguição.  
 (B) prejuízo.  
 (C) somatização.  
 (D) referência.  
 (E) grandeza.

**08.** Sobre os distúrbios bipolares assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) Os sintomas de depressão podem ser descritos como alterações em quatro esferas de funcionamento: afetiva, comportamental, cognitiva e fisiológica.
- ( ) Os sintomas de depressão moderada podem ser incapacidade de sentir prazer, pensamento delirante, apatia e autoacusações.
- ( ) O distúrbio bipolar I caracteriza-se por episódios recorrentes de depressão maior, com a ocorrência episódica de hipomania.
- ( ) Os distúrbios bipolares caracterizam-se por oscilações do humor, partindo da mais profunda depressão à extrema euforia.
- ( ) O distúrbio distímico não apresenta sintomas psicóticos, e a sua principal característica é o humor deprimido.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.  
 (B) V – F – F – V – V.  
 (C) F – F – V – V – F.  
 (D) F – V – V – F – V.  
 (E) F – V – V – V – F.

**09.** Sobre o do transtorno de personalidade *borderline*, está **INCORRETO** afirmar que são sinais e sintomas

- (A) conduta dramática, delírios de grandeza, comportamento manipulativo.  
 (B) relacionamentos superficiais, tentativa de suicídio, conduta dramática.  
 (C) comportamento extrovertido, tentativa de suicídio, dificuldade de manter relacionamento de longa duração.  
 (D) instabilidade afetiva, impulsividade, relacionamentos intensos.  
 (E) instabilidade afetiva, conduta sedutora, relacionamentos intensos.

**10.** Os efeitos colaterais mais comuns da fluoxetina são

- (A) boca seca, sedação, gosto amargo, cefaléia.  
 (B) astenia, boca seca, cefaléia, fraqueza.  
 (C) anorexia, ansiedade, cefaléia, inquietude.  
 (D) dor epigátrica, hipotensão postural, sonolência, sedação.  
 (E) diminuição da atenção, fadiga, impulsividade, irritabilidade.

**11.** Assinale a alternativa que apresenta características definidoras do diagnóstico de enfermagem "interação social prejudicada".

- (A) Tristeza; capacidade diminuída ou incapacidade para se comunicar sem contato olho no olho; estado de bem-estar alterado.
- (B) Retardo ou dificuldade no desempenho de habilidades; alteração no crescimento físico; tristeza.
- (C) Desconforto verbalizado ou observado em situações sociais; ausência de apoio significativo de outros; incapacidade para se apresentar em público.
- (D) Depressão; diminuição do nível da consciência; disfunção interativa com seu grupo etário, família e outros.
- (E) Desconforto verbalizado ou observado em situações sociais; disfunção interativa com seu grupo etário, família e outros; relato de familiares de mudança no estilo ou padrão de interação.

**12.** No que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem e aos seus conceitos, relacione o bloco superior ao inferior.

- (1) Alteração na nutrição para menos do que o corpo necessita.
- (2) Déficit no autocuidado: alimentação.
- (3) Distúrbio do padrão do sono.
- (4) Déficit no autocuidado: banho e/ou higiene.
- (5) Negação ineficaz.
- ( ) Estado consciente ou inconsciente no qual o indivíduo tenta negar o conhecimento ou o significado de um evento para reduzir a ansiedade ou o medo, prejudicando a sua saúde.
- ( ) Estado no qual o indivíduo apresenta um prejuízo da capacidade de se alimentar.
- ( ) Estado no qual o indivíduo está apresentando uma ingestão de nutrientes insuficiente para atender às necessidades metabólicas diárias.
- ( ) Estado no qual o indivíduo experimenta capacidade prejudicada ou incapacidade para realizar ou complementar, por si mesmo, atividades de aplicar água, ensaboar, esfregar e secar o próprio corpo.
- ( ) Estado em que o indivíduo experimenta descontinuidade no período de sono noturno, causando desconforto ou interferindo no estilo de vida desejado.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (D) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- (E) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.

**13.** Considere as afirmações acerca do distúrbio de déficit de atenção e da hiperatividade na criança.

- I - A criança apresenta um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade.
- II - A criança tem grande distraibilidade e é incapaz de conter os estímulos.
- III- Os distúrbios são frequentemente reconhecidos quando a criança entra para a escola.
- IV- A criança apresenta uma atividade motora excessiva, e os movimentos são ao acaso e impulsivos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.



**14.** A bioética é o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e atenção à saúde. Considere as afirmações abaixo sobre as múltiplas abordagens da bioética.

- I - A bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço de diálogo interdisciplinar.
- II - A bioética estimula novos patamares de discussão e reflexão que podem vir a possibilitar soluções adequadas.
- III- Para a bioética, a memória é um dos fundamentos da interdisciplinariedade e deve ser vista como um processo de contínua reconstrução.
- IV- A bioética tem uma abordagem sistemática, não se limitando a solucionar problemas isolados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**15.** No que diz respeito às fases de intervenção em uma crise, relacione o bloco superior ao inferior.

- (1) Avaliação.
  - (2) Planejamento da intervenção terapêutica.
  - (3) Intervenção.
  - (4) Análise final da resolução da crise.
- ( ) Solicitar ao indivíduo que descreva o evento que precipitou a crise.
  - ( ) Proceder uma abordagem orientada para a realidade.
  - ( ) Estabelecer objetivos para a resolução da crise.
  - ( ) Determinar se o objetivo explicitado foi atingido.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 4.
- (B) 1 – 2 – 4 – 3.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 2 – 1 – 3 – 4.

**16.** Uma crise, enquanto situação que produz um desequilíbrio psicológico em uma pessoa que enfrenta uma circunstância perigosa, constitui, para ela, um problema importante do qual, no momento, não pode fugir, e que não pode resolver com seus recursos habituais de resolução de problemas. No que diz respeito aos tipos de crises existentes e às suas definições, relacione o bloco superior ao inferior.

- (1) Crises de transição de vida esperadas.
  - (2) Crises decorrentes de um estresse traumático.
  - (3) Crises disposicionais.
  - (4) Crises de maturação.
- ( ) São normais no ciclo de vida, mas o indivíduo pode sentir-se sem controle sobre elas.
  - ( ) São precipitadas por fatores externos inesperados sobre os quais o indivíduo tem pouco ou nenhum controle, sentindo-se emocionalmente derrotado e dominado.
  - ( ) São respostas agudas a fatores de estresse externo.
  - ( ) Ocorrem em resposta a situações que desencadeiam emoções relacionadas a conflitos não resolvidos na vida da pessoa.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2 – 4.

**17.** O *feedback* é um método de comunicação para ajudar o paciente a considerar uma modificação de comportamento, fornecendo-lhe informações de como é percebido pelos outros. Considere as afirmações abaixo sobre critérios necessários para a realização de um *feedback* benéfico para o paciente.

- I - Deve ser dirigido a um comportamento que ele possa modificar.
- II - Deve comunicar informações e não dar conselhos.
- III- Deve ser uma avaliação focalizada no paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**18.** Em relação a indicações e efeitos colaterais mais comuns das medicações abaixo, relacione o bloco superior ao inferior.

- (1) Olanzapina  
 (2) Ácido Valproico  
 (3) Biperideno
- ( ) Esquizofrenias e transtornos esquizoafetivos, transtorno afetivo bipolar na fase maníaca – aumento de peso, sedação, sonolência.  
 ( ) Epilepsia e episódios de mania aguda – aumento de peso, náuseas, diarreia, queda de cabelo, sedação e tremores finos.  
 ( ) Antiparkinsonismo, reações distônicas agudas – boca seca, constipação, visão borrada.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.  
 (B) 2 – 3 – 1.  
 (C) 3 – 2 – 1.  
 (D) 3 – 1 – 2.  
 (E) 1 – 3 – 2.

**19.** O encaminhamento para Eletroconvulsoterapia (ECT) deve ter base em uma combinação de fatores que inclui diagnóstico, tipo e gravidade de sintomas e história de tratamento prévio.

Qual a contraindicação para esse tratamento?

- (A) Gravidez.  
 (B) Pressão intracraniana aumentada.  
 (C) Esquizofrenia.  
 (D) Idade avançada.  
 (E) Uso de medicamentos.

**20.** Quanto aos objetivos a serem atingidos pelo pacientes através do cuidado de enfermagem, no transtorno obsessivo-compulsivo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Executar independentemente as atividades da vida diária.  
 (B) Demonstrar estratégias de ajustes mais adaptativas para lidar com estresse.  
 (C) Manter a ansiedade em um nível controlável, sem recorrer ao uso de comportamento ritualístico.  
 (D) Compreender a relação entre ansiedade e comportamento ritualístico.  
 (E) Evitar verbalizar situações específicas que, em épocas anteriores, provocaram ansiedade e ocasionaram a busca de alívio por meio de rituais.

**21.** Um paciente procura atendimento em uma internação psiquiátrica apresentando sintomas de delírios de grandeza, delírios místicos; pensamento acelerado; história de agressão com familiares; inquietude. Quais os diagnósticos de enfermagem para esse paciente?

- (A) Conforto alterado – processo de pensamento alterado.  
 (B) Risco de automutilação – risco para violência.  
 (C) Confusão crônica – desobediência.  
 (D) Processo de pensamento alterado – risco para violência.  
 (E) Ansiedade – intolerância à atividade.

**22.** Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) começaram a surgir nas cidades brasileiras na década de 1980. Em relação a esses centros, assinale a alternativa correta.

- (A) Os CAPS I são serviços de menor porte e dão cobertura a municípios com menos de 20.000 habitantes.  
 (B) Os CAPS devem ser complementares ao hospital psiquiátrico, prestando atendimento de base ambulatorial para pessoas com transtornos leves.  
 (C) Os CAPS II são serviços de médio porte e dão cobertura a municípios com mais de 50.000 habitantes.  
 (D) Os CAPSad, especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e de outras drogas, têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 1000 pessoas por mês.  
 (E) Os CAPSi, especializados no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais, devem funcionar durante 24 horas, em todos dias da semana e feriados.

**23.** Considere as afirmações abaixo acerca da Reforma Psiquiátrica no Brasil.

- I - O II Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) ocorreu em 1987, em Bauru (SP).
- II - A I Conferência Nacional de Saúde Mental ocorreu em 1987, no Rio de Janeiro.
- III- Na década de 1990, passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**24.** Considere as afirmações abaixo acerca da política para usuários de álcool e de outras drogas.

- I - Em 2002, o Ministério da Saúde passa a implementar o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e de outras Drogas.
- II - O paradigma da redução de danos se situa como estratégia que visa a reduzir os danos causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, tendo como exigência a abstinência do usuário.
- III- Os CAPSad – Centros de Atenção Psicossocial para atendimento de pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e de outras drogas, passam a ser implantados sobretudo em grades regiões metropolitanas e em municípios de fronteira.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**25.** Considere as afirmações abaixo acerca do suicídio.

- I - Tentativas de suicídio são atos intencionais de autoagressão que resultam em morte.
- II - As tentativas de suicídio são três vezes mais comuns em homens com idade abaixo dos 35 anos.
- III- Na maioria dos países, o suicídio situa-se entre as dez mais comuns causas de morte na população geral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.