



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

# CADERNO DE QUESTÕES


## EDITAL 02/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 20 - ENFERMEIRO I

### Centro de Tratamento Intensivo Adulto

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 02/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 20

##### ENFERMEIRO I


##### Centro de Tratamento Intensivo Adulto

01.	E	11.	E	21.	D
02.	A	12.	B	22.	C
03.	B	13.	D	23.	C
04.	E	14.	E	24.	B
05.	B	15.	D	25.	D
06.	D	16.	ANULADA		
07.	C	17.	A		
08.	C	18.	E		
09.	C	19.	D		
10.	ANULADA	20.	A		

# INSTRUÇÕES

- ❶ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❷ Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- ❸ Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❹ Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- ❺ Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- ❻ Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- ❼ Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- ❽ A duração da prova é de **duas (2) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- ❾ O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- ❿ A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**



**01.** O Sistema Único de Saúde – SUS – constitui-se no conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Assinale a alternativa que apresenta corretamente princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde para todos aqueles cuja saúde estiver comprovadamente comprometida em nível de internação.
- (C) Formulação de políticas de saúde, de medicamentos, de equipamentos imunológicos e outros insumos de interesse para a saúde e desenvolvimento científico e tecnológico.
- (D) Igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios, acompanhada por ações seletivas, para determinar os casos em que as pessoas atendidas devem ser informadas sobre seu estado de saúde.
- (E) Integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**02.** Qual das alternativas abaixo apresenta atividades que devem ser exercidas privativamente pelo enfermeiro, de acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem?

- (A) Prescrever e executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (B) Prevenir e controlar sistematicamente eventuais danos físicos a pacientes durante a assistência de saúde.
- (C) Fazer curativos, colher material para exames laboratoriais e prestar cuidados de enfermagem em pré e pós-operatório.
- (D) Cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem em todas as etapas da assistência.
- (E) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.

**03.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente as etapas do processo de enfermagem na ordem em que devem ser realizadas.

- (A) Planejamento, investigação, implementação, diagnóstico e avaliação.
- (B) Investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.
- (C) Diagnóstico, investigação, planejamento, implementação e avaliação.
- (D) Avaliação, diagnóstico, investigação, implementação e planejamento.
- (E) Implementação, investigação, diagnóstico, planejamento e avaliação.

**04.** Aspiração é a sucção mecânica de secreções orais e pulmonares com a finalidade de manter uma via aérea pérvia. Os três tipos de aspiração de vias aéreas são: orofaríngea, nasofaríngea e endotraqueal. Assinale a alternativa que apresenta complicações potenciais da aspiração endotraqueal.

- (A) Sangramento e trauma da mucosa oral.
- (B) Saturação de oxigênio aumentada e hiperventilação.
- (C) Hipertensão, atelectasias e redução da PIC.
- (D) Náusea, infecção e diminuição da produção de muco.
- (E) Produção de muco aumentada, hipotensão e bradicardia.

**05.** A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) caracteriza-se por uma alteração da membrana alveolo-capilar causada por uma lesão de natureza inflamatória. Por se tratar de uma síndrome com comprometimento pulmonar importante, requer, na maioria das vezes, suporte ventilatório mecânico invasivo. A posição prona foi proposta como uma alternativa coadjuvante ao tratamento. Com base nisso, considere os cuidados abaixo.

- I - Analisar condições hemodinâmicas, posição e fixação do TET.
- II - Suspender nutrição enteral e reavaliar nível de sedação.
- III- Evitar aspiração endotraqueal e estímulos que piorem a ventilação.
- IV- Suspender a VM temporariamente, reduzindo o risco de extubação.
- V - Assegurar-se de que acessos, TET e cateteres estejam devidamente conectados.

Quais devem nortear a assistência, antes da mudança do paciente para a posição prona?

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

**06.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, relacionadas à terapia de reposição renal contínua.

- ( ) A embolia gasosa é um risco quando usados circuitos extracorpóreos.
- ( ) O cateter de acesso ideal para terapia veno-venosa é longo e possui um pequeno calibre para minimizar a resistência.
- ( ) Alterações significativas no equilíbrio eletrolítico e ácido-básico poderão ser catastróficas se os valores laboratoriais não forem monitorizados atentamente.
- ( ) A remoção lenta e contínua de líquidos e solutos resulta em maior instabilidade hemodinâmica e elevação abrupta da pressão intracraniana.
- ( ) A formação de coágulos no filtro ou circuito é vista como uma complicação, pois interrompe a eficácia da terapia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – V.

**07.** Um paciente em parada cardiorrespiratória (PCR) recebe atendimento da equipe e, logo após entubação, insuflação do balão (*cuff*) e verificação do posicionamento do tubo, o enfermeiro aplica as ventilações. Qual alternativa descreve corretamente as ações necessárias durante a reanimação cardiopulmonar (RCP)?

- (A) Aplicar ventilações com volume corrente de 10ml/kg.
- (B) Aplicar ventilações de forma rápida desde que haja elevação visível do tórax a cada ventilação.
- (C) Aplicar 8 a 10 ventilações por minuto sem pausas para compressões torácicas.
- (D) Aplicar 10 a 15 ventilações usando ar ambiente.
- (E) Aplicar quantas ventilações forem necessárias para hiperventilar o paciente.

**08.** O avanço tecnológico nos CTIs tem proporcionado maior taxa de sobrevivência aos pacientes criticamente enfermos. A disponibilidade de agentes vasoativos para o tratamento das síndromes hemodinâmicas tem sido cada vez maior. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando cada fármaco às suas respectivas funções e características.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) Esmolol        | ( ) Reduz o tônus vascular venoso e arterial; é fragmentado no fígado em tiocianeto, podendo levar a toxicidade. |
| (2) Nitroprussiato | ( ) Pode substituir a Dobutamina em pacientes com ICC; causa certo grau de vasodilatação.                        |
| (3) Dopamina       | ( ) Age sobre inúmeros receptores no organismo; em dosagem alta, pode elevar a FC, PA e diminuir o DC.           |
| (4) Milrinona      | ( ) É um cronotrópico negativo, porque diminui a FC.   |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima pra baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 2 – 4 – 3 – 1.
- (D) 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 4 – 2 – 1 – 3.

**09.** Os pacientes com cetoacidose diabética e síndrome não cetótica hiperglicêmica hiperosmolar precisam ser submetidos a avaliações neurológicas frequentes, devido a algumas complicações secundárias à terapia e à própria condição clínica. Assinale a alternativa que apresenta algumas dessas complicações.

- (A) edema periférico e redução da contratilidade do miocárdio
- (B) ascite e fibrilação ventricular
- (C) edema cerebral e trombose vascular
- (D) taquicardia e anemia falciforme
- (E) edema periférico e ascite

**10.** Um paciente é admitido na UTI com queixa de dor retroesternal de grande intensidade. Durante o exame, ele apresenta quadro de sudorese e dispneia. Seus sinais vitais evidenciam: PA: 170/110mmHg, FC:100bpm, FR: 32mpm e saturação de 90%. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento adequado para esse paciente.

- (A) Administrar oxigênio; a seguir, administrar NTG SL; se a dor não diminuir, administrar morfina e, por fim, administrar aspirina.
- (B) Deve-se aplicar oxigênio e NTG SL. Não se deve administrar aspirina nem morfina devido à alta TA.
- (C) Deve-se administrar oxigênio, morfina e aspirina. Se a dor persistir, deve-se administrar NTG SL.
- (D) Deve-se administrar oxigênio, NTG SL e morfina. Não se deve usar aspirina, a menos que o segmento ST esteja acima de 3mm.
- (E) Deve-se aplicar morfina, oxigênio, aspirina e NTG SL.

**11.** A Naloxona é um antagonista específico usado para reversão dos efeitos adversos de qual medicamento?

- (A) Atracúrio.
- (B) Midazolam.
- (C) Pancurônio.
- (D) Diazepam.
- (E) Morfina.

**12.** A enfermagem tem um importante papel no cuidado ao paciente após um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo. Com base nisso, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) A pressão arterial deve atingir valores baixos.
- ( ) A temperatura corporal acima de 37,5°C deve ser tratada.
- ( ) O maior risco de tratamento trombolítico com rt-PA (ativador do plasminogênio tissular recombinante) é o sangramento intracerebral.
- ( ) A sonda vesical não deve ser passada até 30 minutos após o término do rt-PA endovenoso.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – F.

**13.** Em relação aos cuidados de enfermagem necessários para a monitorização da pressão intracraniana (PIC) e a derivação ventricular externa (DVE), assinale as alternativas com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O ponto zero deve ser estabelecido a partir do forame de Monro.
- ( ) Deve-se checar se as conexões do cateter e a bolsa de DVE estão firmes.
- ( ) A via de saída para a bolsa de DVE não deve ser clampeada antes de manipular o paciente no leito ou alterar a cabeceira.
- ( ) A bolsa coletora de DVE deve ser esvaziada quando atingir um terço (1/3) do seu volume total.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – F – V.

**14.** Em qual situação tem-se uma pressão de perfusão cerebral (PPC) normal?

- (A) PAM = 60mmHg e PIC = 15mmHg.
- (B) PAM = 65mmHg e PIC = 20mmHg.
- (C) PAM = 70mmHg e PIC = 25mmHg.
- (D) PAM = 80mmHg e PIC = 35mmHg.
- (E) PAM = 90mmHg e PIC = 20mmHg.

**15.** Considere as alternativas abaixo, acerca do diagnóstico de enfermagem Risco de Infecção.

- I - Esse diagnóstico aponta uma situação em que o organismo do paciente apresenta risco aumentado de invasão por organismos patogênicos.
- II - Entre seus fatores de risco encontram-se doenças crônicas e desnutrição.
- III- Uma das características que definem esse diagnóstico é a presença de hiperemia e febre.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**16.** Ao término de uma cirurgia torácica, um ou dois drenos são posicionados na cavidade pleural, para garantir uma perfeita reexpansão pulmonar. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação aos cuidados com drenos de tórax.

- (A) Os drenos são conectados em sistemas fechados de selo d'água, que podem ou não ser conectados a um sistema de aspiração, mediante o emprego de frasco redutor.
- (B) O curativo oclusivo no local de inserção do dreno garante a vedação e previne a formação de enfisema subcutâneo.
- (C) O dreno deve ser fixado junto ao corpo do paciente, garantindo uma angulação que favoreça a drenagem, e também deve ser clampeado para mobilização do paciente.
- (D) Podem ocorrer complicações como pneumotórax hipertensivo e enfisema cutâneo quando um dreno com escape de ar for pinçado em um paciente em ventilação mecânica.
- (E) O objetivo do selo d'água é impossibilitar a entrada de ar em um sistema de pressão subatmosférico.

**17.** As infecções relacionadas a cateter venoso central (CVC) são um problema de grande magnitude, particularmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Em relação ao CVC, é correto afirmar que

- (A) se deve usar clorexidine alcoólica a 2% na inserção do cateter e nas trocas de curativo para a realização de antissepsia.
- (B) os locais para injeção e as conexões do cateter (dânulas) devem ser desinfetados com clorexidine degermante a 5%.
- (C) a escolha de cateteres com múltiplos lumens reduz o risco de infecção na corrente sanguínea.
- (D) o equipo e as cânulas das soluções de nutrição parenteral total devem ser trocados a cada 72 horas.
- (E) cateteres inseridos na femoral, em pacientes adultos, oferecem maior risco de complicações mecânicas, porém menor risco para infecção.

**18.** A úlcera de pressão (UP) é uma lesão localizada de pele, que surge devido a uma interrupção do fornecimento de sangue para a área. A taxa de UPs é um indicador-chave da qualidade dos cuidados em Centros de Terapia Intensiva (CTIs). Inúmeros trabalhos sugerem que a maioria das UPs poderia ser evitada com uma intervenção precoce. Com base nisso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se realizar avaliação de risco para UP no momento de admissão do paciente no CTI e sempre que houver mudança no estado clínico do paciente.
- (B) Quanto maior o APACHE do paciente, maior o risco de UP.
- (C) O reposicionamento do paciente no leito deve ser realizado, pelo menos, a cada duas horas, observando-se as condições clínicas.
- (D) O uso de travesseiros ou cunhas de espuma tem por objetivo aliviar a pressão no corpo do paciente e evitar o contato entre proeminências ósseas.
- (E) A massagem nas proeminências ósseas favorece a circulação sanguínea na pele.

**19.** Quais princípios orientam o suporte sistêmico para a cicatrização de úlceras de pressão?

- (A) Alívio da pressão, manutenção da umidade da ferida e nutrição.
- (B) Alívio da pressão, manutenção da umidade da ferida e perfusão.
- (C) Alívio da pressão, perfusão e nutrição.
- (D) Perfusão, oxigenação e nutrição.
- (E) Perfusão, oxigenação e manutenção da umidade da ferida.

**20.** Na fase inicial da Ressuscitação Cardiorrespiratória, que medicamento **NÃO** deve ser utilizado porque pode determinar hiperosmolaridade plasmática, hipernatremia e alterações neurológicas, e piorar situações de acidose láctica, não melhorando a possibilidade de reanimação?

- (A) Bicarbonato de Sódio 8,4%.
- (B) Gluconato de Cálcio 10%.
- (C) Sulfato de Magnésio 50%.
- (D) Cloreto de Sódio 0,9%.
- (E) Cloreto de Sódio 20%.

**21.** Qual alternativa apresenta corretamente as condições necessárias para que ocorra a interdisciplinaridade na área de enfermagem?

- (A) Linguagem médica, objetivos comuns, desconsideração das diferenças, domínio de conteúdos e síntese complementar.
- (B) Linguagem médica, objetivos específicos, reconhecimento da igualdade, domínio de conteúdos e síntese complementar.
- (C) Linguagem comum, objetivos comuns, reconhecimento da igualdade, domínio de conteúdos e síntese complementar.
- (D) Linguagem comum, objetivos comuns, reconhecimento das diferenças, domínio de conteúdos e síntese complementar.
- (E) Linguagem comum, objetivos específicos, reconhecimento das diferenças, domínio de conteúdos e síntese complementar.

**22.** O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é um conjunto de procedimentos de gestão, implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais. O objetivo é dar aos resíduos um encaminhamento seguro e eficaz, garantindo a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente um desses procedimentos?

- (A) Os recipientes para uso nas salas de cirurgia e nas salas de parto necessitam de tampas para garantir a vedação.
- (B) Os resíduos líquidos não devem ser acondicionados em recipientes rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
- (C) Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos constituídos de material resistente a ruptura e vazamento, e não devem ser esvaziados.
- (D) Os sacos de acondicionamento devem ser resistentes a punctura, ruptura e vazamento, podendo, em determinados casos, ser reaproveitados.
- (E) A identificação dos recipientes não deverá ser feita com adesivos, pois estes não garantem boa visibilidade e resistência.

**23.** "Apreciação do desempenho" é o termo mais atualizado para denominar o que foi chamado de "classificação de mérito" e "avaliação de desempenho", os quais destinam-se a conhecer o nível de desempenho do pessoal. Assinale a afirmação correta em relação à apreciação do desempenho.

- (A) A apreciação do desempenho tem mais probabilidade de causar um resultado positivo se for realizada por uma pessoa externa ao setor, pois poderá fazer uma avaliação com maior neutralidade.
- (B) A manutenção de registros precisos é um elemento que auxilia na exatidão das apreciações, mas não pode ser considerado um elemento essencial.
- (C) O funcionário precisa acreditar que a apreciação se baseia em um padrão cobrado igualmente de todos os funcionários que ocupam o mesmo cargo.
- (D) A eficácia de um sistema de apreciação de desempenho não depende dos instrumentos utilizados, e sim da capacidade de comunicação do avaliador.
- (E) Aquele que faz a apreciação deve desenvolver uma percepção de suas próprias tendências e preconceitos, embora esses aspectos não interfiram num processo de apreciação.

**24.** A liderança é um processo por meio do qual um grupo é conduzido em determinada direção, de forma não coercitiva. Esse processo pode ocorrer, inclusive, fora de um contexto organizacional. Entre as alternativas abaixo, assinale a afirmação correta acerca da liderança.

- (A) Atualmente a concepção de liderança está apoiada nas características e no comportamento do líder.
- (B) A teoria do grande homem afirma que algumas pessoas nascem para liderar, ao passo que outras, para ser lideradas.
- (C) As habilidades de liderança não podem ser desenvolvidas, pois elas são herdadas, já nascendo com o indivíduo.
- (D) O estilo autocrático de liderança promove a autonomia e o crescimento do funcionário, enfatizando o "nós" em vez do "eu" e do "você".
- (E) Na liderança situacional ou de contingência, os líderes possuem um estilo dominante, caracterizando-se como autoritários ou democráticos.

**25.** As afirmações abaixo se referem à humanização da atenção à saúde. Assinale as alternativas com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A reflexão sobre práticas humanizadoras em saúde iniciou-se nos anos 70, por meio da discussão sobre os direitos do paciente.
- ( ) Em 2005, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH).
- ( ) Humanizar é tratar as pessoas levando em conta seus valores e vivências; no entanto, é praticamente impossível manter a autonomia dos indivíduos em situações de hospitalização.
- ( ) O Humaniza-SUS é uma política que visa a atingir todos os níveis de atenção à saúde, entendendo humanização como uma transformação cultural da atenção aos usuários.
- ( ) O PNHAH propõe a valorização da formação educacional dos profissionais de saúde, reforçando a compreensão de que a qualidade em saúde não se resume apenas aos aspectos técnicos ou organizacionais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) F – V – V – F – F.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – F – F – F – F.