



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

# CADERNO DE QUESTÕES

## EDITAL 05/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 48 - MÉDICO I

### Medicina de Família e Comunidade

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 05/2010 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 48


##### ENFERMEIRO I – Medicina de Família e Comunidade

01.	C	11.	B	21.	E	31.	C
02.	D	12.	D	22.	C	32.	E
03.	E	13.	C	23.	B	33.	B
04.	E	14.	D	24.	E	34.	D
05.	E	15.	E	25.	A	35.	C
06.	E	16.	A	26.	B	36.	D
07.	ANULADA	17.	A	27.	C	37.	A
08.	D	18.	D	28.	E	38.	B
09.	D	19.	D	29.	E	39.	A
10.	D	20.	D	30.	D	40.	B

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de 40 (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato

**Boa Prova!**



**01.** Mulher de 23 anos procura atendimento médico em uma Unidade de Saúde da Família queixando-se de corrimento vaginal e com odor desagradável há 3 dias. Durante o exame ginecológico, ela refere que é portadora do vírus HIV. Com relação às vulvovaginites em pacientes portadoras do vírus HIV, considere as afirmações abaixo.

- I - O tratamento da candidíase vaginal é o mesmo que para mulheres não portadoras do vírus HIV.
- II - As vaginoses bacterianas devem ser tratadas com Clindamicina como primeira opção devido à grande resistência ao Metronidazol.
- III- Os casos de tricomoníase devem ser tratados com Metronidazol 2g/dia por 5 dias.
- IV- O uso de Fluconazol 150mg, dose única, é uma das opções de tratamento para candidíase vaginal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**02.** A vulvovaginite é um dos problemas ginecológicos mais comuns e incômodos que afetam a saúde da mulher e representa cerca de 70% das queixas ginecológicas. Dentre as causas abaixo, qual **NÃO** aumenta o risco de adquirir vulvovaginite por cândida?

- (A) Gravidez.
- (B) Obesidade.
- (C) Diabetes Melito descompensado.
- (D) Pelo menos um episódio de vulvovaginite por cândida nos últimos 18 meses.
- (E) Uso de antibióticos e corticoides sistêmicos.

**03.** Um aluno cursando o quinto ano de Medicina e realizando estágio em Unidade Básica de Saúde atende uma primeira consulta de Pré-natal de gestante com idade gestacional de 26 semanas e último citopatológico de colo uterino realizado há 3 anos. Durante o atendimento, o aluno sai do consultório e vem perguntar ao seu preceptor se deve ou não coletar o exame citopatológico do colo uterino, pois tem medo de romper a bolsa. Assinale a alternativa que contém a orientação correta a dar a esse aluno.

- (A) Você tem razão. Idade gestacional maior que 24 semanas contra-indica a coleta devido ao risco de romper a bolsa.
- (B) Você tem razão. O seu medo é pertinente. Você deve orientá-la a realizar o exame após o parto.
- (C) Fique tranquilo. Você pode realizar a coleta apenas com a escova de coleta endocervical.
- (D) Você tem razão. Oriente a gestante que a coleta do citopatológico só tem importância no primeiro trimestre de gestação. Após esse período não vale a pena coletar.
- (E) Fique tranquilo. Não tenha medo. Você pode realizar a coleta tranquilamente utilizando somente a espátula de Ayre.

**04.** A prevenção da sífilis congênita pode ser feita com medidas simples, de baixo custo e altamente eficazes. Com relação à transmissão vertical da sífilis, assinale a única alternativa **INCORRETA**.

- (A) A transmissão para o feto pode ocorrer em qualquer estágio da gestação.
- (B) A apresentação assintomática é a mais frequente.
- (C) Até 40% das gestações que cursam com sífilis resultam em morte do concepto.
- (D) O objetivo maior é identificar e tratar as gestantes com sífilis e seu(s) parceiro(s), a fim de se evitar a transmissão para o feto.
- (E) A transmissão para o feto ocorre somente no segundo e terceiro trimestres.

**05.** A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses. As alternativas abaixo apresentam consequências associadas à introdução precoce de outros alimentos, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Maior número de episódios de diarreia.
- (B) Menor duração do aleitamento materno.
- (C) Menor eficácia da lactação como método anticoncepcional.
- (D) Maior número de hospitalizações por doenças respiratórias.
- (E) Maior absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco.

**06.** Menino de 10 anos acompanhado da mãe chega ao posto de saúde para consulta do dia por apresentar crise de asma. A mãe refere que o filho vem apresentando, há vários meses, crises diárias durante o dia e pelo menos uma crise noturna durante a semana, não apresentando melhora com o uso da "bombinha" de salbutamol. Com relação à asma desse paciente, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve-se associar ao beta agonista de curta duração um corticoide inalatório em dose média a alta como tratamento de manutenção.
- II - Pode ser utilizado corticoide via oral por período de 5 a 10 dias nas exacerbações.
- III- Essa criança pode apresentar uma espirometria com PFE ou VEF 1 entre 60-80% do previsto no momento da crise.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**07.** Com relação ao acompanhamento do desenvolvimento esperado da criança, relacione as colunas abaixo, associando os estágios de desenvolvimento da criança aos respectivos marcos de desenvolvimento.

- (1) 1 mês a 2 meses.
- (2) 2 a 4 meses.
- (3) 4 a 6 meses.
- (4) 6 a 9 meses.
- (5) 9 meses a 1 ano.
- (6) 1 ano a 1 ano e 6 meses.

- ( ) Arrasta-se e engatinha.
- ( ) Responde ao sorriso.
- ( ) Anda sozinha.
- ( ) Vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro.
- ( ) De bruços, levanta a cabeça e ombros.
- ( ) Engatinha ou anda com apoio.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 2 – 3 – 1 – 6 – 4.
- (B) 4 – 1 – 6 – 2 – 3 – 5.
- (C) 4 – 2 – 6 – 1 – 3 – 5.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 6 – 4.
- (E) 5 – 3 – 6 – 1 – 2 – 4.

**08.** Criança de 3 anos de idade é trazida pela mãe à consulta médica por apresentar lesões vesiculosas e crostosas no corpo todo. A mãe acha que é catapora e pede orientações quanto ao afastamento da creche e cuidados. Confirmado o diagnóstico de varicela, a orientação correta é afastar a criança da creche

- (A) por 5 dias.
- (B) por 7 dias.
- (C) por 7 dias e vacinar os contactantes até 5 dias após a exposição.
- (D) até todas as lesões estarem crostosas.
- (E) até todas as lesões estarem crostosas e vacinar os contactantes até 5 dias após a exposição.

**09.** A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, que lesa o trato respiratório, produzindo tosse espasmódica característica. Com relação à coqueluche, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A principal complicação é a pneumonia, responsável pela maioria das mortes.
- (B) É de grande transmissibilidade, sendo que há 90% de probabilidade de contágio ao primeiro contato em pessoas suscetíveis.
- (C) A maioria dos óbitos ocorre em crianças menores de 1 ano de idade.
- (D) São complicações frequentes a otite média, as atelectasias, o pneumotórax e o edema cerebral.
- (E) Pode apresentar Reação Leucemoide na segunda fase da doença.

**10.** O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido a sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Com relação ao câncer de mama, assinale a afirmação correta.

- (A) Menopausa precoce é considerada fator de risco.
- (B) Recomenda-se o rastreamento com mamografia, anualmente, a partir dos 40 anos de idade em todas as mulheres.
- (C) O exame clínico das mamas associado à mamografia a partir dos 40 anos reduz a mortalidade em 35%.
- (D) O achado na mamografia categoria BI-RADS III apresenta risco de até 2% para câncer de mama.
- (E) Mulheres com mamografia BI-RADS O e sem fatores de risco não necessitam de avaliação adicional.

**11.** No que se refere a paciente que relata perda de peso involuntária, considere as afirmações abaixo.

- I - Na maioria das séries de casos estudados, as causas encontradas com maior frequência estão relacionadas a transtornos psicossociais.
- II - A perda não intencional de 10 kg está associada a um aumento de risco de mortalidade de 5 a 10 vezes.
- III- A investigação laboratorial não deve ficar restrita aos sintomas clínicos apresentados pelo paciente.
- IV- Trata-se da perda superior a 10% em um ano.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**12.** Correlacione os medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica com efeitos colaterais observados com os mesmos.

- |                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| I Propranolol  | (1) constipação                           |
| II Hidralazina | (2) hipercalemia                          |
| III Furosemida | (3) hipocalcemia                          |
| IV Captopril   | (4) achados de Lupus                      |
| V Verapamil    | (5) insuficiência circulatória periférica |

Assinale a alternativa que contém apenas correlações corretas.

- (A) I-1 – II-2 – III-3 – IV-4 – V-5
- (B) I-1 – II-5 – III-3 – IV-2 – V-4
- (C) I-5 – II-3 – III-4 – IV-2 – V-1
- (D) I-5 – II-4 – III-3 – IV-2 – V-1
- (E) I-4 – II-1 – III-2 – IV-3 – V-5

**13.** Leia as histórias abaixo e relacione-as com possíveis diagnósticos psiquiátricos.

- I - Uma mulher de 45 anos relata que nos últimos 3 meses tem ouvido vozes que a acusam de ser prostituta e má. Trabalha como doméstica e, neste período, parou de trabalhar, pois acha que a patroa também ouve estas vozes e está contra ela. Ao exame, apresenta-se com roupas amassadas e despenteada, apresenta um conteúdo pobre de fala, além de pensamento e afeto embotados.
- II - Uma mulher se apresenta à consulta relatando humor triste, choro fácil, sensação de culpa e desesperança, insônia, emagrecimento de 8 kg desde o início dos sintomas há 4 meses, quando o esposo saiu de casa. Relata que, nos últimos dias, tem a impressão de ouvir a voz do esposo e nestes momentos pensa em morrer.
- III- Uma mulher acusa os vizinhos de vigiá-la constantemente para surpreendê-la despida. Acredita que os vizinhos tenham telescópios para observá-la e também a filmem com câmeras. Apresenta-se adequadamente vestida e penteada, o afeto está de acordo com o conteúdo do pensamento (desconfiança, raiva e hostilidade).

Assinale a alternativa que contém apenas hipóteses diagnósticas apropriadas a cada história relatada.

- (A) I- esquizofrenia; II- depressão maior; III- transtorno do pânico
- (B) I- transtorno esquizofreniforme; II- transtorno psicótico breve; III- transtorno do pânico
- (C) I- transtorno esquizofreniforme; II- depressão maior com manifestação psicótica; III- transtorno delirante
- (D) I- transtorno esquizofreniforme; II- transtorno psicótico breve; III- transtorno factício
- (E) I- esquizofrenia; II- depressão maior com manifestação psicótica; III- transtorno delirante



**14.** As alternativas abaixo contêm casos de pacientes que têm indicação de quimioprofilaxia para tuberculose, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Menina de 7 anos, cuja mãe está tratando tuberculose pulmonar (moram na mesma casa). É reatora ao teste tuberculínico sem sintomatologia clínica ou achados radiológicos compatíveis com tuberculose.
- (B) Homem de 37 anos, portador de HIV, sem sinais de tuberculose ativa e com teste tuberculínico de 15 mm.
- (C) Mulher de 50 anos com artrite reumatoide em uso de metotrexate 20 mg/semana, sem sinais de tuberculose ativa e teste tuberculínico de 12 mm.
- (D) Mulher de 45 anos, portadora de doença de Crohn, em uso crônico de prednisona na dose de 5 mg/dia, teste tuberculínico de 10 mm e sem sinais clínicos de tuberculose ativa.
- (E) Homem de 52 anos, receptor de transplante de rim cuja esposa apresenta-se com tuberculose pulmonar bacilífera. O teste tuberculínico, negativo na ocasião do transplante, agora apresenta 10 mm. Não há sinais de tuberculose ativa e o paciente faz uso crônico de prednisona, ciclosporina e tacrolimos.

**15.** O eritema nodoso ou contusiforme é uma síndrome de hipersensibilidade responsável por inflamação da gordura subcutânea. É associado com diferentes fatores causais, **EXCETO**

- (A) Infecções estreptocócicas.
- (B) Tuberculose e Hanseníase.
- (C) Anticoncepcionais orais.
- (D) Sulfonamidas.
- (E) Hipotireoidismo.

**16.** Uma mulher de 45 anos relata que há 6 meses iniciou com dor nas articulações metacarpo-falangeanas da mão direita e após algumas semanas também as articulações da mão esquerda estavam doendo. Hoje, refere dor em 4 articulações metacarpo-falangeanas da mão direita e 3 da mão esquerda e 3 articulações interfalangeanas proximais de cada mão. Refere piora da dor e rigidez após períodos de inatividade, que, pela manhã, pode durar 60 minutos. Após a investigação deste caso, que confirmou a hipótese diagnóstica inicial, o tratamento inicial deve incluir:

- (A) metotrexato de 7,5 mg a 25 mg/semana e monitoramento mensal do hemograma completo, provas de função hepática e creatinina nos primeiros 6 meses e, a seguir, a cada 2 meses.
- (B) metotrexato de 20 mg a 40 mg/semana e monitoramento semanal do hemograma completo, provas de função hepática e creatinina no primeiro mês e, a seguir, a cada 2 meses.
- (C) metotrexato de 30 mg a 60 mg/semana e monitoramento mensal do hemograma completo, provas de função hepática e creatinina nos primeiros 6 meses e, a seguir, a cada 2 meses.
- (D) metotrexato de 7,5 mg a 25 mg/semana e monitoramento mensal do hemograma completo, provas de função hepática e creatinina nos primeiros 6 meses e, a seguir, a cada 2 meses, além de exame oftalmológico a cada 6 meses.
- (E) metotrexato de 30 mg a 60 mg/semana e monitoramento mensal do hemograma completo, provas de função hepática e creatinina nos primeiros 6 meses e, a seguir, a cada 2 meses, além de exame oftalmológico a cada 6 meses.

**17.** Sobre a saúde do idoso, considere as afirmações abaixo.

- I - A avaliação deve incluir várias dimensões, tais como avaliação dos sentidos, das funções motoras, do humor entre outras.
- II - A presença de extra-sístoles complexas é contraindicação absoluta ao exercício aeróbico ou de resistência.
- III- Se o teste de Whisper for negativo, deve-se encaminhar ao neurologista.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**18.** Sobre o controle do diabetes, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) as sulfonilureias reduzem a hemoglobina glicosilada em 1,5% e provocam aumento de peso e hipoglicemia.
- (B) as biguanidas reduzem a hemoglobina glicosilada em 1 a 2% e não provocam aumento de peso ou hipoglicemia.
- (C) o uso de metformina é contraindicado em mulheres com creatinina superior a 1,4.
- (D) o uso de sulfonilureias está associado à hipercalcemia em portadores de transtornos da tireoide.
- (E) o uso de insulina, embora desejável, não é mandatório em indivíduos com glicemia acima de 300 sem perda ponderal.

**19.** Sobre a prevenção do diabetes, considere as afirmações abaixo.

- I - Mudanças de estilo de vida reduzem 58% da incidência de diabetes em 3 anos.
- II - Alguns medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, como a metformina, são eficazes, reduzindo em 31% a incidência de diabetes em 3 anos.
- III- Possibilidade de prevenção é maior em indivíduos com IMC entre 30-35.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

**20.** Um homem de 30 anos, em bom estado geral, queixa-se de tosse produtiva iniciada há 3 dias, sem história de doença cardíaca ou doença respiratória crônica. Encontra-se febril (38,9 °C), com frequência cardíaca de 108 bpm, frequência respiratória de 20 mpm. Na ausculta respiratória, nota-se a presença de estertores crepitantes e diminuição do murmúrio vesicular à direita. Sobre este quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Considerando os achados clínicos, a probabilidade de pneumonia é de aproximadamente 50%, e o tratamento deve ser ambulatorial.
- (B) O quadro clínico deve ser investigado com um raio X de tórax, hemograma e exame cultural de escarro.
- (C) Considerando o algoritmo de gravidade da pneumonia, o paciente apresenta risco I, recomendando-se tratamento hospitalar.
- (D) Considerando os achados clínicos, a probabilidade de pneumonia é de 85%, e o tratamento deve ser ambulatorial.
- (E) Trata-se de um quadro de natureza viral e que deve ser manejado com tratamento sintomático.

**21.** Mulher de 53 anos vem à consulta com queixa de dor de cabeça. Esse quadro já a acompanha há muitos anos, o que a leva a fazer uso de medicamentos a base de ergotamina diariamente nos últimos meses.

Qual, dentre as alternativas abaixo, constitui a melhor conduta frente a essa situação?

- (A) Manter o uso de ergotamina associando-a à codeína até que tenha melhora completa do sintoma.
- (B) Manter a mesma dose de ergotamina associando-a ao paracetamol e iniciar tratamento profilático com propranolol.
- (C) Aumentar a dose de ergotamina até que tenha melhora completa da dor.
- (D) Associar sumatriptano à ergotamina nas crises e iniciar tratamento profilático com fluoxetina.
- (E) Suspender o uso de ergotamina, tratar as crises com paracetamol e iniciar tratamento profilático com amitriptilina.

**22.** Homem de 65 anos com diagnóstico de DPOC estágio II busca atendimento médico por piora da falta de ar e da tosse, presença de catarro amarelado e em maior quantidade nos últimos dias.  
A partir dessa situação, são feitas as afirmações abaixo.

- I - A presença de escarro purulento contraindica o uso de corticoide via oral.
- II - Os antibióticos devem ser prescritos apenas se o raio-X de tórax evidenciar focos de consolidação.
- III- Em até um terço das vezes, não é possível atribuir uma causa à exacerbação da DPOC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

**23.** Homem de 32 anos é atendido na Unidade Básica de Saúde por apresentar vermelhidão e dor ocular intensa, visão borrada e fotofobia há 24 horas e com piora progressiva nesse período. Além dos achados descritos acima, o exame físico revelou pupilas mióticas.

A melhor conduta frente esse caso é

- (A) prescrição de colírio de cloranfenicol.
- (B) prescrição de colírio de pilocarpina.
- (C) prescrição de colírio anestésico.
- (D) prescrição de compressas frias de soro fisiológico sobre os olhos.
- (E) prescrição de colírio de corticoide.

**24.** Paciente vem à Unidade Básica de Saúde para mostrar os resultados de exames sorológicos para investigação de hepatite B. Entre os exames, constam os seguintes resultados:

HBsAg	Negativo
HBeAg	Negativo
Anti-Hbe	Negativo
Anti-HBc IgM	Negativo
Anti-HBc IgG	Positivo
Anti-HBs	Positivo
Anti-HBe	Negativo

Qual a interpretação correta desses resultados em termos de diagnóstico de hepatite B?

- (A) Paciente suscetível.
- (B) Paciente com imunidade, resposta vacinal.
- (C) Paciente na fase aguda.
- (D) Paciente na fase de incubação.
- (E) Paciente com imunidade, infecção passada.

**25.** Com relação à unha encravada, são feitas as seguintes afirmações.

- I - A presença de secreção purulenta não contraindica a realização de cantoplastia.
- II - A presença de granuloma no canto da unha indica cauterização do mesmo com fenol a 80%.
- III- A técnica cirúrgica mais eficaz é aquela que preserva a matriz ungueal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

**26.** Mulher de 23 anos é trazida à Unidade Básica de Saúde com ferimentos múltiplos, profundos e sangrantes nas mãos e antebraços, causados por mordedura, ocorrida há poucos instantes, de cão desconhecido.  
Em relação a esse caso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser iniciado imediatamente esquema de vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- (B) Não deve ser realizado nenhum tipo de sutura das lesões.
- (C) Os ferimentos devem ser lavados com água e sabão.
- (D) Deve ser iniciado imediatamente o tratamento com soro antirrábico.
- (E) Deve-se evitar a aplicação de soro e vacina na mesma região anatômica.

**27.** Paciente de 48 anos com diagnóstico de depressão iniciou tratamento há duas semanas com amitriptilina 75mg ao dia. No seu retorno para revisão, ele informa que não tem conseguido ter uma ereção suficiente para manter uma relação sexual.  
Em relação ao manejo dessa situação, nesse momento, assinale a alternativa correta.

- (A) Substituir amitriptilina por fluoxetina.
- (B) O uso de sildenafil antes das relações sexuais é contraindicado nesse caso.
- (C) Reduzir temporariamente a dose de amitriptilina.
- (D) Entre os antidepressivos, a nortriptilina tem um dos menores índices de impotência como efeito adverso.
- (E) Suspender todas as medicações e reavaliar o paciente em 30 dias.

**28.** Abaixo são listados critérios para o encaminhamento de pacientes portadores de Doença Renal Crônica ao nefrologista.

- I - Hiper ou hipopotassemia, hematúria sem causa aparente.
- II - Hipertensão arterial de difícil controle, litíase renal ou infecção urinária de repetição, *clearance* da creatinina abaixo de 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup>.
- III- Proteinúria de qualquer nível na ausência de retinopatia diabética ou hipertensiva, redução acelerada do *clearance* da creatinina acima de 4 ml/min/ano.

De acordo com os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, quais desses são critérios para encaminhamento ao nefrologista?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**29.** Considere as afirmativas abaixo.

- I - Os estudos de Coorte e controlados servem para verificar a incidência de uma doença e seus fatores de risco.
- II - Os estudos transversais servem para verificar a prevalência de uma doença.
- III- O delineamento do tipo ecológico pode ser usado em estudos transversais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**30.** Correlacione os termos epidemiológicos da primeira coluna com as suas definições na segunda coluna.

- (1) Acurácia
- (2) Efetividade
- (3) Eficácia
- (4) Eficiência
- (5) Valor preditivo positivo

- ( ) A demonstração, em condições rigorosas e experimentais, de que um tratamento funciona.
- ( ) A ausência relativa de erro na estimativa de um parâmetro.
- ( ) A demonstração de que um tratamento funciona melhor do que suas alternativas, com base no balanço de benefícios, riscos e custos.
- ( ) A demonstração, em condições existentes na comunidade, de que um tratamento funciona.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 4 – 2.
- (B) 1 – 3 – 2 – 5.
- (C) 2 – 1 – 3 – 5.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 1 – 5 – 3 – 4.

**31.** Qual dos riscos relativos (RR) abaixo listados, com seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC), pode ser considerado como fator de risco para determinada doença?

- (A) RR = 3,0; IC [ 0,8 – 5,2 ]
- (B) RR = 0,6; IC [ 0,4 – 0,8 ]
- (C) RR = 1,5; IC [ 1,2 – 1,8 ]
- (D) RR = 1,0; IC [ 0,8 – 1,2 ]
- (E) RR = 0,9; IC [ 0,5 – 1,3 ]

**32.** Considere as afirmativas abaixo.

- I - A magnitude e a vulnerabilidade estão entre os critérios utilizados para o estabelecimento de prioridades em saúde pública.
- II - A incidência jamais poderá ser maior que a prevalência em uma população sem migrações, em determinado local e no mesmo período.
- III- É possível uma doença ter uma altíssima letalidade e uma baixíssima mortalidade em determinado local e no mesmo período.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**33.** Pela Portaria nº. 648 do Ministério da Saúde, a Atenção Básica tem como fundamentos todos os itens abaixo, **EXCETO**:

- (A) ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito, de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- (B) firmar, monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica, divulgando anualmente os resultados alcançados.
- (C) valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- (D) realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
- (E) estimular a participação popular e o controle social.

**34.** Conforme a Portaria nº. 648 do Ministério da Saúde, além dos princípios gerais da Atenção Básica, só **NÃO** compete à estratégia Saúde da Família:

- (A) ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- (B) desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
- (C) buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- (D) celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde no âmbito de seu território adscrito, bem como controlar e avaliar sua execução.
- (E) ser um espaço de construção de cidadania.

**35.** Das alternativas abaixo, uma delas **NÃO** está completamente correta. Assinale-a.

- (A) A Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde ocorreu em 1976, na cidade de Alma Ata, no Cazaquistão, e foi promovida pela OMS e UNICEF.
- (B) O Informe Dawson (*Dawson Report*) foi apresentado ao Ministério da Saúde da Grã-Bretanha em 1920 e formulava recomendações para os serviços médicos e afins que devessem estar à disposição dos habitantes de uma determinada região, propondo uma rede organizada de centros de saúde primários e secundários, e hospitais.
- (C) A Lei nº. 8.142, de 1990, é denominada de Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (D) A Oitava Conferência Nacional de Saúde ocorreu em Brasília, em 1986, e seu relatório final incluiu um conceito de saúde e propostas para a reorganização do sistema de saúde no país e para o capítulo de saúde da Constituição Brasileira que foi promulgada em 1988.
- (E) Pela Definição Europeia de Medicina de Família e Comunidade (ou Medicina Geral e Familiar, como denominada em Portugal), as competências deste especialista incluem orientação comunitária, aptidões específicas para a resolução de problemas, abordagem abrangente, abordagem holística, gestão de cuidados primários e cuidados centrados na pessoa.

**36.** Em 1995, as mulheres americanas morreram mais de câncer de pulmão do que de câncer de mama. Durante este ano, a incidência registrada de câncer de mama foi de 100.000 casos e de 40.000 casos de câncer de pulmão nesta população. Baseado exclusivamente nesta informação, pode-se dizer que

- (A) a prevalência do câncer de pulmão foi menor do que a de câncer de mama, pois teve menos do que a metade do número de casos.
- (B) provavelmente a incidência de câncer de pulmão aumentou depois de 1995 porque as mulheres começaram a fumar mais nos anos e décadas imediatamente anteriores.
- (C) apesar de o câncer de pulmão ter sido responsável por mais óbitos em 1995, ele tem menor letalidade do que o de câncer de mama porque tem menor número de casos.
- (D) o câncer de pulmão teve maior mortalidade em 1995 por ser mais letal do que o câncer de mama.
- (E) o câncer de mama apresentou menor coeficiente de mortalidade proporcional do que o câncer de pulmão, mas não se pode afirmar que tenha também apresentado menor coeficiente de letalidade.

- 37.** Em uma revisão sistemática de 2580 dosagens de um teste laboratorial, utilizado para diagnóstico de uma determinada doença, foram obtidos os resultados apresentados na tabela abaixo.

		Doença	
		Presente	Ausente
Teste Laboratorial	Positivo	731	270
	Negativo	79	1500

Baseado nestes dados, conclui-se que a prevalência da doença, a sensibilidade e a especificidade do teste são, respectivamente:

- (A) 31.4% ; 90.2% e 84.7%.  
 (B) 28.3% ; 90.2% e 73.0%.  
 (C) 28.3% ; 90.2% e 84.7%.  
 (D) 31.4% ; 73.0% e 95.0%.  
 (E) 28.3% ; 73.0% e 95.0%.
- 38.** Em se tratando de crianças, qual das alternativas abaixo **NÃO** está correta?

- (A) A medida da temperatura axilar pode ser usada para crianças de qualquer idade; é considerada como febre quando estiver acima de 37,2°C e é menos precisa que as medidas retal e oral.  
 (B) A medida da temperatura oral é indicada para todas as crianças com cinco anos ou mais e é considerada como febre quando estiver acima de 37,8°C.  
 (C) Em crianças entre 6 meses e 6 anos que moram no nível do mar, a OMS considera anêmicas as que tiverem concentração de hemoglobina abaixo de 11 g/dL.  
 (D) O déficit no índice de altura/idade indica um processo de desnutrição infantil de longa duração relacionado a problemas nutricionais ou de saúde.  
 (E) É recomendado que a pressão arterial seja medida e registrada durante o exame preventivo de rotina em crianças a partir dos três anos.

- 39.** Sobre a Triagem Metabólica Neonatal, considere as afirmações abaixo.

- I - O teste realizado antes de 24 horas deve ser repetido até a terceira semana de vida.  
 II - A pesquisa de anemia falciforme foi recentemente retirada da triagem devido à baixa prevalência em nosso meio e à falta de evidência de benefícios com o diagnóstico.  
 III- Das doenças pesquisadas, o hipotireoidismo congênito é a de maior prevalência em nosso meio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

- 40.** Considere as afirmações abaixo sobre conduta apropriada no atendimento de uma mulher vítima de estupro.

- I - Indica-se anticoncepção de emergência com levonorgestrel 1,5 mg em dose única ou dividida em duas doses, com intervalo de 24 horas.  
 II - Indica-se anticoncepção de emergência com pílulas contendo 0,03 mg de etinilestradiol e 0,15 mg de levonorgestrel por comprimido, quatro comprimidos a cada 12 horas, em duas doses.  
 III- No caso de anticoncepção de emergência, se ocorrer vômito em até 2 horas após a ingestão do comprimido, administrar metade da dose usada anteriormente.  
 IV - No caso de gravidez decorrente de estupro, é direito da vítima a realização de aborto legal, bastando apresentar o boletim de ocorrência policial.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e IV.  
 (E) Apenas III e IV.