



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL


Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES
EDITAL 03/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 20 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
Internação Adulto e Centro de
Material e Esterilização

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 03/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 20

TÉCNICO DE ENFERMAGEM I – Internação Adulto e Centro de Material e Esterilização

01.	A	11.	D	21.	E	31.	D
02.	B	12.	B	22.	E	32.	E
03.	B	13.	A	23.	C	33.	E
04.	A	14.	D	24.	E	34.	B
05.	B	15.	C	25.	E	35.	C
06.	A	16.	D	26.	C	36.	D
07.	B	17.	E	27.	A	37.	C
08.	E	18.	B	28.	C	38.	B
09.	D	19.	D	29.	C	39.	C
10.	B	20.	E	30.	C	40.	D




HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. A drenagem torácica é uma intervenção crucial para melhorar a troca gasosa e a respiração no período pós-operatório. Em relação aos cuidados de enfermagem com o Dreno de Tórax, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O borbulhamento intermitente indica que o sistema está funcionando de maneira adequada.
- () Um dos tipos de sistema de drenagem que pode ser utilizado é o selo d'água em aspiração úmida.
- () Quando o paciente for transportado para outra área, de maca, o sistema de drenagem deve ficar acima do nível do tórax.
- () É recomendado desconectar o sistema de drenagem a cada seis horas para permitir a entrada de ar no espaço pleural.
- () Deve-se incentivar o paciente a mudar de decúbito, tossir e empreender respirações profundas, assistindo-o.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) F – V – V – F – F.

02. O edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido no tecido pulmonar. Nesse caso, o cuidado de enfermagem que compete ao Técnico de Enfermagem adotar é

- (A) posicionar o paciente em litotomia.
- (B) acomodar o paciente em posição ereta, preferencialmente com as pernas pendendo sobre a lateral do leito.
- (C) estimular a ingestão hídrica e posicionar o paciente em *trendelenburg*.
- (D) realizar drenagem postural, com massagem de vibração e percussão.
- (E) instalar medidas de precaução respiratória e posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo.

03. O paciente que se submete a uma cirurgia de artroplastia de quadril tem como complicação grave a luxação da prótese. Assinale a alternativa que constitui medida preventiva a essa complicação.

- (A) O quadril do paciente deve sempre ser flexionado a mais de 90°.
- (B) O paciente deverá usar um travesseiro de abdução entre as pernas.
- (C) É permitida a flexão aguda do quadril.
- (D) A perna afetada deve ser elevada quando o paciente sentar.
- (E) O paciente não pode flexionar o joelho.

04. Considerando-se o plano de cuidados de enfermagem para o paciente com comprometimento da função hepática, assinale a afirmação correta.

- (A) Deve-se avaliar o grau de desconforto relacionado com o prurido e o edema.
- (B) A integridade da pele deverá ser avaliada a cada 24 horas.
- (C) O perímetro abdominal e o peso devem ser medidos e registrados a cada 48 horas.
- (D) As atividades que aumentam a pressão intra-abdominal devem ser estimuladas.
- (E) A detecção do sangramento gastrointestinal é irrelevante.

05. Quanto aos cuidados de enfermagem para com paciente com fístula arteriovenosa, pode-se afirmar que

- (A) a pressão arterial deve ser aferida no membro da fístula.
- (B) o frêmito sobre o sítio do acesso venoso deve ser avaliado, pelo menos, a cada oito horas.
- (C) é comum o sangramento da fístula arteriovenosa por 24 horas após a punção.
- (D) o membro da fístula arteriovenosa poderá ser utilizado para coleta de exames laboratoriais na unidade de internação.
- (E) a presença de sopro audível indica bloqueio ou coagulação do acesso vascular.

06. Ao realizar o curativo de uma ferida, o técnico de enfermagem deve

- (A) retirar o curativo sujo com cuidado.
- (B) utilizar soro fisiológico 20% para limpeza da área contaminada.
- (C) realizar a limpeza da área mais contaminada em direção à menos contaminada.
- (D) sempre utilizar óleos minerais ao retirar o curativo sujo.
- (E) realizar o curativo o mais rapidamente possível, evitando exposição da ferida ao ar ambiente.



07. Como medida preventiva da úlcera de pressão, deve-se

- (A) usar agentes limpadores abrasivos ao limpar a pele.
- (B) evitar massagear as proeminências ósseas.
- (C) manter o paciente imobilizado.
- (D) administrar antibioticoterapia.
- (E) avaliar semanalmente os pacientes de risco.

08. Considere as afirmações abaixo sobre a trombose venosa profunda (TVP).

- I - A TVP é uma das complicações potenciais graves de uma cirurgia.
- II - O primeiro sintoma da TVP pode ser uma câibra na panturrilha.
- III- O repouso no leito aumenta o risco de formação de TVP.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

09. Qual das alternativas abaixo constitui um cuidado de enfermagem que reduz a incidência de complicações circulatórias em pacientes que realizam uma cirurgia?

- (A) Manter repouso no leito.
- (B) Oferecer dieta precoce.
- (C) Administrar antibióticos conforme prescrição médica.
- (D) Estimular a saída do leito.
- (E) Controlar drenagens de sondas.

10. Sabe-se que a cefalexina suspensão apresenta-se em frasco de 100ml, com 250mg/5ml. Foram prescritos 600mg via oral a um paciente. Quantos mililitros (ml) de cefalexina devem ser administrados?

- (A) 15 ml.
- (B) 12 ml.
- (C) 10 ml.
- (D) 08 ml.
- (E) 05 ml.

11. Os cateteres venosos centrais (CVC) são dispositivos que exigem da equipe de enfermagem a adoção de técnicas adequadas de manipulação. Qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde a um cuidado do técnico de enfermagem quando do preparo e da administração de medicamentos?

- (A) Observar e controlar infusões, comunicando alterações ao enfermeiro.
- (B) Diluir antibióticos conforme padronização da instituição e orientação dos fabricantes.
- (C) Desinfetar os frascos-ampola com algodão embebido em álcool a 70%.
- (D) Administrar os medicamentos no menor tempo possível, evitando interações medicamentosas.
- (E) Irrigar o equipo com 20ml de água destilada ou de soro fisiológico após infusão de medicamentos.

12. Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico e o desenvolvimento das técnicas e dos procedimentos cirúrgicos, os produtos para saúde e os equipamentos necessários para a realização do ato anestésico-cirúrgico tornaram-se cada vez mais complexos e sofisticados. Visando à garantia da qualidade do processo de esterilização, faz-se necessário que o fluxo de um Centro de Material seja

- (A) unidirecional, sem necessidade de barreira física entre as áreas básicas: área contaminada, área limpa e área estéril.
- (B) unidirecional, com barreira física entre as áreas básicas: área contaminada, área limpa e área estéril.
- (C) contínuo, com barreira física somente entre a área limpa e a estéril.
- (D) contínuo, podendo haver cruzamento de artigos sujos com artigos limpos e esterilizados.
- (E) unidirecional e contínuo, mas sem necessidade de restringir acesso de pessoas externas do setor.

13. O processamento de produtos para a saúde tem se tornado mais difícil à medida que o *design* desses produtos torna-se mais complexo. Se um artigo não for adequadamente limpo, o processo de desinfecção e esterilização ficará comprometido. Assim sendo, dentre os objetivos da limpeza podemos citar a

- (A) redução da carga microbiana dos artigos, removendo contaminantes orgânicos e inorgânicos.
- (B) retirada dos contaminantes inorgânicos e orgânicos, visando à eliminação dos microorganismos por radiação.
- (C) remoção das sujidades dos artigos, visando aumentar a carga microbiana presente nos mesmos.
- (D) retirada dos contaminantes orgânicos, visando à eliminação dos microorganismos por difusão do plasma.
- (E) criação de uma barreira microbiológica, visando proteger os artigos da contaminação.



14. A limpeza automatizada é aquela desenvolvida por meio de equipamentos (lavadora ultrassônica, lavadora esterilizadora, lavadora termodesinfectora) que operam em diferentes condições de tempo e temperatura. Dentre as vantagens para o uso desses equipamentos, está o fato de

- (A) a limpeza poder ser realizada em pias com cubas com detergente enzimático e uso de escovas não abrasivas.
- (B) os instrumentos cirúrgicos não necessitarem ser desmontados antes de colocá-los na lavadora.
- (C) não haver necessidade do uso de equipamento de proteção individual (EPI), pois o profissional não entra em contato direto com o instrumental.
- (D) o risco de acidente com material biológico reduzir-se, ocorrendo uma melhor eficiência na remoção da sujidade dos canulados na ultrassônica.
- (E) a reprodutividade variar muito, podendo auxiliar na eficiência do resultado esperado.

15. A limpeza nas lavadoras termodesinfectoras é feita pela força do *spray* e dos _____, associada à ação do _____ para a remoção da sujidade. A termodesinfecção ocorre com _____, de acordo com as normas recomendadas, promovendo a morte dos microrganismos termo-sensíveis pela _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima.

- (A) locais de água – desinfetante – água fria – termoadição.
- (B) fluxos de gases – detergente – água ionizada – termoventilação.
- (C) jatos de água – detergente – água aquecida – termocoagulação.
- (D) locais de água – esterilizante – água fria – termocoagulação.
- (E) jatos de água – ozônio – água aquecida – termoadição.

16. Sabendo-se que o tecido de algodão é utilizado como embalagem ou empacotamento de artigos estéreis, embora possua algumas recomendações de uso, considere as afirmações abaixo.

- I - O tecido deve ser lavado antes do primeiro uso para retirada do amido.
- II - Os campos cirúrgicos não podem apresentar remendos nem cerzidos.
- III- A roupa cirúrgica e os campos devem sofrer processo de calandragem na lavanderia, devendo ser centrifugados e secos na secadora.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

17. Considere as afirmações abaixo sobre o armazenamento dos artigos esterilizados.

- I - A estocagem dos produtos para a saúde deve ser de modo a não comprimi-los, não torcê-los, não perfurá-los e não comprometer sua esterilidade, mantendo-os longe de umidade.
- II - É recomendado estabelecer frequência de limpeza da área de estoque e de carros ou caixas de transporte.
- III- Deve-se observar atentamente o prazo de validade dos artigos, evitando ultrapassar tal limite, uma vez que essa orientação significa garantia assegurada de sua utilização em perfeitas condições.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. De acordo com a *Association for Advancement of Medical Instrumentation* (AAMI), qual a finalidade, para a esterilização a vapor, de usar monitores físicos, químicos e biológicos de forma rotineira?

- (A) Proteger os produtos para a saúde, evitando sua contaminação durante o transporte.
- (B) Determinar a eficácia de uma falha no processo de esterilização.
- (C) Verificar se os produtos para a saúde continuam sob garantia de seus prazos de validade.
- (D) Identificar a data e a hora em que o operador realizou o teste e obteve o resultado.
- (E) Efetuar inspeção periódica para verificação de degradação visível do pacote.

19. A causa mais frequente de surtos de infecção nas instituições de saúde é a transmissão que se dá por meio das mãos dos profissionais de saúde. No que se refere à descontaminação das mãos com produto à base de álcool, considere as recomendações abaixo.

- I - Deve ser realizada após contato com a pele intacta de um paciente, depois de verificar o pulso ou a pressão arterial.
- II - Deve ser realizada quando as mãos estão visivelmente sujas ou contaminadas com material biológico do cuidado ao paciente.
- III - Deve ser realizada depois do contato com objetos inanimados nas proximidades imediatas ao paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. As coletas de amostras de fluidos corporais mais frequentes são as de sangue, urina, fezes e escarro. Essas amostras são coletadas para ajudar a examinar e diagnosticar problemas de saúde do paciente, bem como para direcionar e monitorar a eficácia do tratamento. Portanto, está **INCORRETO** afirmar que se deve:

- (A) garantir a etiquetagem adequada das amostras coletadas.
- (B) coletar uma quantidade adequada, usar recipiente e meio corretos.
- (C) guardar e transferir a amostra, atendendo os prazos específicos.
- (D) colocar todas as amostras laboratoriais em sacolas de plástico e lacrá-las, para evitar vazamento durante o transporte.
- (E) evitar explicar as razões da coleta da amostra e o processo de sua obtenção para o paciente.

21. A nutrição é uma necessidade humana básica. Às vezes não se consegue satisfazer as necessidades alimentares pela ingestão oral de alimento adequado, sendo necessária a utilização de uma sonda. Considere as afirmações abaixo sobre dieta por sonda.

- I - O posicionamento correto do paciente durante e após a administração da dieta é com cabeceira da cama elevada, no mínimo, entre 30° e 45°.
- II - A localização correta da sonda para receber a dieta é no estômago ou no intestino delgado.
- III - O paciente deverá ser avaliado durante e após a administração da dieta por sonda, para que se observe sua aceitação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

22. Qual das alternativas abaixo retrata uma diretriz específica para implementação da Política Nacional de Humanização na atenção hospitalar?

- (A) Coordenação técnico-política das portas de entrada do Sistema Único de Saúde, enfatizando as emergências.
- (B) Aumento da oferta de exames especializados e de procedimentos de média e alta complexidade.
- (C) Criação de consultores regionais para apoio e capacitação de profissionais, objetivando o aprendizado das normas para encaminhamentos especializados.
- (D) Pactuação entre Ministério da Saúde e Secretarias Municipais para melhoria do sistema de distribuição de medicamentos de uso contínuo para a população.
- (E) Existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (pronto-atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapia).

23. Sobre o acolhimento, aspecto essencial da Política Nacional de Humanização, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O acolhimento implica a recepção da pessoa desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas e permitindo que expresse suas preocupações.
- (B) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência, é uma diretriz específica de humanização na atenção em urgências, emergências e pronto-atendimentos.
- (C) Incorporar tecnologias avançadas nas unidades básicas, realizar os encaminhamentos especializados e aumentar o número de leitos nos hospitais de alta complexidade são objetivos importantes do acolhimento nos serviços de saúde.
- (D) O acolhimento é uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário, expressando-se em atitudes como: escutar e valorizar o que é dito pelas pessoas, garantir privacidade e incentivar a presença de acompanhante.
- (E) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema é uma diretriz para a humanização dos serviços de saúde no nível da atenção básica.

24. "Humanizar é ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais." (Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização, 2004).

Em relação à humanização nos serviços de saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - A humanização é um conjunto de estratégias para alcançar a qualidade da atenção e da gestão no SUS, enfatizando a qualificação dos vínculos entre profissionais e usuários e a corresponsabilização pelos cuidados de saúde.
- II - Para humanizar a assistência, é prioritário garantir que todo usuário do SUS saiba quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços que se responsabilizarão por sua referência territorial.
- III - Para a implementação da Política Nacional de Humanização, orienta-se, como estratégia, o financiamento de projetos que melhorem a ambiência dos serviços: salas de conversa, espaços de conforto, mobília adequada e comunicação visual.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III.

25. Sobre os cuidados com a mulher e a família na gestação e no parto, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A atenção deve ser integral, levando em conta as necessidades intelectuais, emocionais, sociais e culturais das mulheres e famílias, e não somente o cuidado biológico.
- (B) Deve-se enfatizar o cuidado centrado nas famílias e dirigido para as necessidades não só da mulher e do seu filho, mas, sim, para as necessidades do casal.
- (C) É importante acolher o (a) acompanhante de escolha da mulher, não oferecendo obstáculos à sua participação no pré-natal, parto e puerpério.
- (D) Realizar atividades educativas em grupo ou individualmente, com linguagem clara e acessível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família, é um parâmetro de cuidado que deve ser garantido na atenção pré-natal e puerperal.
- (E) Toda mulher tem direito à presença de um familiar que a acompanhe durante o pré-natal, sendo que, para permanecer com ela durante o trabalho de parto, essa pessoa deve ser o seu cônjuge ou a sua mãe.

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as dificuldades do aleitamento materno no período puerperal com suas respectivas características.

- (1) Pega incorreta do mamilo
 (2) Fissuras
 (3) Ingurgitamento
 (4) Mastite
- () Mamas dolorosas, edemaciadas (pele brilhante), às vezes, avermelhadas, podendo a mulher ter febre.
 () Posicionamento errado do bebê na mama da mulher, fazendo com que o mesmo não consiga retirar leite suficiente, podendo levar a agitação e choro.
 () Rachaduras ou pequenas lacerações nos mamilos, ocorrendo quando a amamentação é praticada com o bebê em posicionamento errado ou com pega incorreta.
 () Processo inflamatório ou infeccioso que ocorre habitualmente a partir da segunda semana após o parto, sendo geralmente unilateral e necessitando tratamento medicamentoso.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.
 (C) 3 – 1 – 2 – 4.
 (D) 3 – 4 – 2 – 1.
 (E) 3 – 1 – 4 – 2.

27. De acordo com o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, qual das alternativas abaixo melhor define um caso típico de pré-eclâmpsia?

- (A) Gestante, nulípara, com 21 semanas de gestação, apresentando uma pressão arterial acima de 140/90mmHg e com um resultado de proteinúria de 24 horas maior que 300mg.
 (B) Gestante, multípara, 15 semanas de gestação, apresentando pressão arterial acima de 140/90mmHg e com um resultado de proteinúria de 24 horas igual a 150mg.
 (C) Gestante, nulípara, 10 semanas de gestação, apresentando pressão arterial de 120/80mmHg e com presença de episódios convulsivos.
 (D) Puérpera, multípara, 24 horas pós-parto, apresentando crises de cefaleia e pressão arterial oscilante.
 (E) Gestante, multípara, 20 semanas de gestação, apresentando pressão arterial de 130/60mmHg e com episódios de cefaleia, tontura e desmaio.

28. Para a gestante que não possui nenhuma imunização antitetânica prévia, o esquema vacinal recomendado é:

- (A) duas doses de vacina dupla tipo adulto, iniciando-se o esquema no segundo trimestre e com intervalo mínimo de sessenta dias entre as doses.
 (B) uma dose de vacina dupla tipo adulto após as vinte semanas de gestação.
 (C) três doses de vacina dupla tipo adulto, iniciando-se o esquema em qualquer idade gestacional e com intervalo mínimo de trinta dias.
 (D) duas doses de vacina dupla tipo adulto a partir de trinta semanas de gestação, e uma dose trinta dias após o parto.
 (E) três doses de vacina dupla tipo adulto até o final da gestação, e uma dose da tríplice viral após trinta dias do parto.

29. Considere as afirmações abaixo sobre *Diabetes Mellitus Gestacional* (DMG).

- I - Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, que geralmente desaparece no período pós-parto, mas pode retornar anos depois.
 II - História prévia de diabetes gestacional, baixa estatura (<1,50m), idade superior a 25 anos, obesidade, polidrâmnio na gestação atual e síndrome do ovário policístico são fatores de risco para o diabetes gestacional.
 III- A hemoglobina glicada e o uso de tiras reagentes para glicemia são utilizados para o diagnóstico de diabetes e para o monitoramento individual do controle glicêmico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II, III.

30. Existe disponível uma variedade de dispositivos para administração de oxigênio. A escolha do método geralmente baseia-se nas condições do paciente e nas suas necessidades. Nesse sentido, comumente utilizamos _____ para distribuir uma quantidade de 1 a 6 litros/minuto de oxigênio. Quando um paciente necessita de uma concentração maior, podemos utilizar um dispositivo chamado _____. Além disso, deve-se considerar que, para pacientes com doenças pulmonares crônicas, não devemos administrar mais de _____ de oxigênio.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima.

- (A) o cateter nasal – CPAP – 4 a 5 litros/minuto
- (B) o óculo nasal – máscara de Venturi – 4 a 5 litros/minuto
- (C) o cateter nasal – máscara de Venturi – 2 a 3 litros/minuto
- (D) o óculo nasal – CPAP – 4 a 5 litros/minuto
- (E) a máscara de Venturi – CPAP – 2 a 3 litros/minuto

31. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos que se referem a sinais vitais com seus respectivos significados.

- (1) Ortopneia
 - (2) Pressão diastólica
 - (3) Pirexia
 - (4) Pressão sistólica
 - (5) Eupneia
 - (6) Febril
- () Ponto mais alto de pressão nas paredes arteriais; quando os ventrículos se contraem.
 - () Respiração normal.
 - () Condição em que a temperatura corporal está elevada.
 - () Menor pressão do sangue exercida sobre as paredes arteriais; ocorre entre as contrações ventriculares.
 - () Tipo de dispneia em que a respiração fica mais fácil quando o paciente senta ou fica de pé.
 - () Elevação acima do limite mais alto da temperatura corporal normal; sinônimo de febre.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 3 – 2 – 1 – 6.
- (B) 2 – 5 – 6 – 4 – 1 – 3.
- (C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5 – 6.
- (D) 4 – 5 – 6 – 2 – 1 – 3.
- (E) 4 – 1 – 6 – 2 – 5 – 3.

32. A prescrição médica de soroterapia solicita que seja instalada uma infusão de 250ml de soro glicosado 5% mais 20ml de cloreto de sódio 20% para correr em cinco horas. A instalação dessa solução deve ser feita em que velocidade de infusão?

- (A) 18 ml/hora.
- (B) 18 microgotas/minuto.
- (C) 17 gotas/minuto.
- (D) 54 gotas/minuto.
- (E) 54 microgotas/minuto.

33. Considere as afirmações abaixo sobre diabetes e o uso de insulina.

- I - A diabetes do tipo I é um distúrbio metabólico que se caracteriza pela deficiência de produção e secreção de insulina; já a diabetes do tipo 2 caracteriza-se pela ausência de produção e secreção de insulina.
- II - Considera-se hiperglicemia um nível glicêmico em jejum maior que 110mg/dl e nível pós-prandial com 2 horas maior que 140mg/dl; já a hipoglicemia é um nível glicêmico menor que 60mg/dl.
- III - Um exemplo de insulina de ação rápida é a insulina lispro, a qual tem seu pico de ação em uma hora, enquanto um exemplo de insulina de ação curta é a insulina regular, que tem início de seu efeito em, aproximadamente, 30 a 60 minutos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

34. Sobre os sinais e sintomas de Infarto do Miocárdio, é **INCORRETO** afirmar que ocorre

- (A) falta de ar.
- (B) febre.
- (C) náuseas.
- (D) pele fria e úmida.
- (E) ansiedade.

35. Considere os fatores abaixo:

- I - hipertensão e hiperlipidemia;
- II - hipotensão e desnutrição;
- III- consumo excessivo de álcool e obesidade.

Quais são riscos para Acidente Vascular Cerebral Isquêmico?

- (A) Apenas II .
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

36. A neutropenia (contagem de neutrófilos inferior a 2.000/mm³) resulta da produção diminuída de neutrófilos ou da destruição aumentada dessas células. Os neutrófilos são essenciais na prevenção e limitação de infecção bacteriana. Portanto, são consideradas intervenções importantes na precaução contra a neutropenia:

- (A) estimular a ingestão de saladas, frutas e vegetais frescos; realizar higiene corporal diária no paciente.
- (B) atender a todos os pacientes de sua escala e, por último, o paciente neutropênico; efetuar lavagem completa das mãos.
- (C) evitar higiene corporal diária; fornecer dieta à base de cozidos e fervidos.
- (D) sempre realizar a lavagem completa das mãos antes de entrar no quarto do paciente; inspecionar sítios de punção venosa a cada turno.
- (E) colocar flores frescas no quarto para melhorar a autoestima do paciente; realizar higiene corporal diária no paciente.

37. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de cima para baixo, associando enunciados.

- (1) Precaução padrão
 - (2) Precaução baseada na transmissão
 - (3) Teste *Western Blot*
 - (4) Teste *Mantoux*
 - (5) Infecção hospitalar
 - (6) Infecção oportunista
- () Usado para determinar se uma pessoa foi infectada pelo bacilo da tuberculose.
 - () Cuidados prestados a todos os pacientes no hospital, para evitar as infecções associadas aos cuidados de saúde.
 - () Infecção adquirida no hospital, a qual não existia ou estava latente no momento da admissão.
 - () Cuidados a pacientes com doenças infecciosas supostas ou comprovadamente disseminadas pelo ar, por gotículas, ou por contato.
 - () Teste de sangue que identifica os anticorpos para o HIV.
 - () Infecção causada por vários organismos, alguns dos quais comumente não provocam doença em pessoas com o sistema imunológico normal.

A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 6 – 2 – 4 – 5.
- (B) 3 – 1 – 5 – 2 – 4 – 6.
- (C) 4 – 1 – 5 – 2 – 3 – 6.
- (D) 4 – 2 – 6 – 1 – 3 – 5.
- (E) 3 – 2 – 6 – 1 – 4 – 5.

38. Com relação ao equilíbrio hidroeletrólítico, considere as seguintes afirmações.

- I - Uma pessoa saudável ganha líquido ao beber e ao se alimentar.
- II - No balanço hídrico, todas as vias de ganho e perda devem ser registradas e todos os volumes são comparados.
- III- Os órgãos de perda de líquidos incluem rins, pele, pulmões e trato gastrointestinal.
- IV - No paciente com febre, ocorre o aumento da retenção de líquidos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

39. De acordo com Resolução COFEN n.º 311/2007, a qual aprova e reformula o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é direito do profissional de enfermagem

- (A) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (B) negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (C) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- (D) prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito de direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.
- (E) manter seus dados cadastrais atualizados e as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem regularizadas.

40. Considere as afirmações abaixo sobre as infrações éticas e disciplinares presentes na Resolução COFEN n.º 311/2007.

- I - Considera-se infração ética a ação, omissão ou convivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem.
- II - Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e dos acordos firmados pela categoria em assembleias dos sindicatos regionais.
- III- A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do código de processo ético das autarquias dos profissionais de enfermagem.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III.