



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES


EDITAL 05/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 33 - MÉDICO I

Psiquiatria: Medicina Ocupacional

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 33

MÉDICO I – Psiquiatria: Medicina Ocupacional

01.	B	11.	ANULADA	21.	C	31.	B
02.	C	12.	D	22.	C	32.	ANULADA
03.	D	13.	E	23.	A	33.	D
04.	E	14.	A	24.	B	34.	D
05.	B	15.	E	25.	E	35.	D
06.	E	16.	D	26.	D	36.	D
07.	A	17.	D	27.	A	37.	D
08.	B	18.	C	28.	E	38.	C
09.	D	19.	C	29.	D	39.	A
10.	E	20.	E	30.	D	40.	D




HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 **O candidato que se retirar da sala de Prova ao concluí-la não poderá utilizar os banheiros destinados a candidatos nas dependências do local de Prova.** (conforme item 6.15.6 do Edital de Abertura).
- 11 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Sobre a síndrome de esgotamento profissional, também chamada de *Burn Out*, está **INCORRETO** afirmar que produz

- (A) perda do controle emocional.
- (B) manifestações maníacas.
- (C) aumento da irritação.
- (D) manifestações de agressividade.
- (E) perturbações do sono.

02. No atendimento médico individual, para o diagnóstico em psicopatologia relacionada ao trabalho, convém considerar alguns pontos especiais com respeito à anamnese, tais como

- (A) família de origem do paciente, reconhecimento e confiança nas relações de trabalho, presença de doença somática prévia.
- (B) história ocupacional familiar, presença de doença somática prévia e família de origem do paciente.
- (C) família de origem do paciente, reconhecimento e confiança e conhecimento do processo de trabalho.
- (D) presença de doença somática prévia, família de origem do paciente e conhecimento do processo de trabalho.
- (E) história migratória do paciente, presença de doença somática prévia e família de origem do paciente.

03. No quadro clínico de neurose traumática relacionada ao trabalho, está **INCORRETO** afirmar que encontramos

- (A) distúrbios de sono.
- (B) irritabilidade.
- (C) distúrbios neurovegetativos diversos.
- (D) esquecimento da situação que levou ao trauma.
- (E) pesadelos.

04. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao exame do estado mental.

- I - Constitui parte da avaliação clínica.
- II - Mesmo quando o paciente está mudo, é incoerente, ou se recusa a responder às questões, o clínico pode obter uma variedade de informações por meio de uma observação cuidadosa.
- III- Descreve a aparência, o discurso, as ações e os pensamentos do paciente durante a entrevista.
- IV- O humor e o afeto são itens a serem avaliados nesse exame.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV
- (E) I, II, III e IV.

05. Em qual dos transtornos abaixo a avaliação da função tireoidiana pode ser particularmente útil no diagnóstico e no tratamento do transtorno?

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Depressão maior.
- (C) Fobia social.
- (D) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
- (E) Apneia do sono.

06. Qual das alternativas abaixo **NÃO** constitui causa de transtorno de humor secundário?

- (A) Deficiência de vitamina B12.
- (B) Coreia de Huntington.
- (C) Esclerose múltipla.
- (D) Uso de clonidina.
- (E) Apendicite.

07. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta critério de diagnóstico de alteração da personalidade devido a uma condição médica geral.

- (A) A perturbação ocorre exclusivamente durante o curso de *delirium*.
- (B) A perturbação causa sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo para o funcionamento social ou ocupacional.
- (C) A perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental.
- (D) Existem evidências de que a perturbação é consequência fisiológica direta de uma condição médica geral.
- (E) É uma perturbação persistente da personalidade.

08. Deve-se interromper imediatamente o uso de clozapina quando:

- I - o número total de neutrófilos estiver acima de 2.000.
- II - o número total de leucócitos estiver abaixo de 3.000.
- III- o número total de eosinófilos estiver abaixo de 100.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

09. Podem ser sinais de violência iminente em avaliação de paciente com história de comportamento violento:

- I - ameaças verbais ou físicas.
- II - puerpério.
- III- intoxicação com álcool ou outra substância.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

10. No que se refere ao risco de suicídio entre grupos vulneráveis, considere as variáveis abaixo.

- I - Ser do sexo masculino.
- II - Ter histórico de perda ou separação precoce dos pais.
- III- Apresentar insônia.
- IV- Apresentar delírios.

Quais aumentam o risco de suicídio nesses grupos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

11. As alternativas abaixo constituem efeitos colaterais das drogas antipsicóticas, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Aumento do apetite e ganho de peso.
- (B) Ejaculação retrógrada.
- (C) Priapismo.
- (D) Galactorreia.
- (E) Amenorreia.

12. As alternativas abaixo referem-se a efeitos anticolinérgicos **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Antidepressivos tricíclicos.
- (B) Antipsicóticos.
- (C) Anti-histamínicos.
- (D) Agentes antiparkinsonianos.
- (E) Drogas anticolinesterásicas.

13. Considere os exames abaixo.

- I - Ureia e creatinina.
- II - Eletrocardiograma.
- III- Teste de gravidez.

Quais devem ser realizados antes que se inicie o uso de lítio?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

14. Na depressão maior o funcionamento cognitivo do indivíduo é frequentemente caracterizado por todas as seguintes manifestações, **EXCETO**:

- (A) alucinações auditivas.
- (B) prejuízo na concentração.
- (C) ruminação obsessiva.
- (D) prejuízo da memória.
- (E) ideação suicida.

15. No que se refere a pacientes acometidos por transtorno de humor bipolar, considere as afirmações abaixo.

- I - Podem apresentar episódio atual de mania e uma história de um episódio depressivo.
- II - Podem apresentar depressões recorrentes e uma história de mania.
- III- Podem apresentar uma história de vários episódios maníacos sem depressão.
- IV - Podem apresentar mania atual sem uma história de episódios depressivos anteriores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

16. Dentre os critérios diagnósticos para depressão atípica, pode-se apontar:

- (A) sentimento de grandiosidade.
- (B) excessivo envolvimento em atividades prazerosas.
- (C) fuga de ideias.
- (D) ganho de peso significativo.
- (E) diminuição do apetite.

17. Sobre a esquizofrenia, pode-se dizer que

- (A) não existe diferença no índice de sua prevalência entre áreas urbanas e rurais.
- (B) a deterioração cognitiva não interfere no funcionamento psicossocial.
- (C) a idade de início de sua manifestação em homens e mulheres é semelhante.
- (D) homens e mulheres são igualmente afetados.
- (E) a chance de um filho de esquizofrênico ter a doença é igual a da população geral.

18. A esquizofrenia simples, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) 10ª edição, caracteriza-se por

- (A) ser o tipo mais comum de esquizofrenia.
- (B) ter início insidioso, com delírios e alucinações proeminentes.
- (C) apresentar desenvolvimento lento e progressivo de sintomas negativos, sem manifestações prévias de alucinações e delírios.
- (D) não apresentar prejuízos na adaptação psicossocial.
- (E) apresentar desenvolvimento lento e progressivo de sintomas negativos, com delírios e alucinações proeminentes.

19. São características de *delirium* todas as seguintes manifestações, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Desatenção.
- (B) Desorientação.
- (C) Afeto deprimido.
- (D) Confusão mental.
- (E) Alterações cognitivas globais.

20. No que se refere ao manejo da síndrome neuroléptica maligna, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve-se adotar medidas de suporte.
- II - Deve-se usar dantrolene.
- III - Deve-se usar bromocriptina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Segundo Zimerman (2008), como se denomina o fenômeno típico do campo grupal que se caracteriza como num jogo de bilhar, onde a comunicação expressa por um dos componentes do grupo vai ecoar em um outro componente que irá transmitir um significado afetivo equivalente, ainda que possa parecer bem diferente, e assim por diante entre outros componentes?

- (A) Associação livre.
- (B) Transferência.
- (C) Ressonância.
- (D) Cooperação.
- (E) Pertinência.

22. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a modalidade grupal ao seu respectivo conceito.

- (1) Sua finalidade primordial é de servir como instrumento na área do ensino-aprendizagem, aliando o propósito de informação com o da formação, principalmente quanto à aquisição de atitudes internas.
- (2) São frequentemente utilizados na prestação de cuidados primários (prevenção), assim como na prestação de cuidados secundários (tratamento) e terciários (reabilitação).
- (3) São grupos compostos por pessoas portadoras de uma mesma categoria de necessidades, especialmente empregados na área da medicina, como, por exemplo, trabalhar aspectos de doenças crônicas.
- (4) Pode ter a finalidade de *insight*, destinado a mudanças caracterológicas, ou se limitar à remoção de sintomas.

- () Grupos de autoajuda
- () Grupos de reflexão
- () Grupos psicoterápicos psicanalíticos
- () Grupos comunitários

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 2 – 3 – 4 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2 – 4.

23. No Modelo Estrutural da Mente, desenvolvido por Freud, uma das importantes diferenças da Teoria Topográfica desenvolvida anteriormente ao referido Modelo consiste em:

- (A) considerar que nem todos os processos inconscientes podem ser relegados à vida instintiva da pessoa. Elementos da consciência, bem como funções do ego, também são inconscientes.
- (B) compreender que mecanismos de defesa utilizados pelos pacientes para evitar desejos, sentimentos ou pensamentos angustiantes são sempre acessíveis à consciência.
- (C) reconsiderar a técnica da hipnose, a partir da observação de que os pacientes mostravam com frequência uma necessidade inconsciente de punição.
- (D) desconsiderar, de modo especial, a interação entre os processos de pensamento primário e secundário para a consolidação do conceito de ego.
- (E) compreender que, embora o sistema inconsciente seja um componente dinâmico da mente, ele não sofre modificação como efeito do mundo externo sobre o id.

24. As relações de objeto, o controle e regulação dos impulsos instintivos, bem como a relação com a realidade são algumas das funções importantes, especificamente,

- (A) do superego.
- (B) do ego.
- (C) do id.
- (D) do id e do superego.
- (E) do ego e do superego.

25. Do ponto de vista do Código de Ética Médica, sabendo-se que há normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, considere as condutas abaixo.

- I - Empenhar-se pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais.
- II - Esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicá-las aos empregadores responsáveis.
- III- Esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

Quais constituem normas que estão de acordo com o Código de Ética Médica?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

26. Em relação à ética na psiquiatria, considere as afirmações abaixo.

- I - O simples fato de o médico revelar ao seu cônjuge a identidade de um paciente viola os princípios de ética.
- II - O profissional psiquiatra que trata de um médico incapacitado não deve fazer a monitorização do seu progresso ou de sua aptidão para retornar ao trabalho.
- III- O psiquiatra pode oferecer uma opinião profissional sobre um indivíduo específico que tenha revelado informação pessoal na mídia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

27. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as intervenções psicoterapêuticas às suas respectivas explicações.

- (1) Interpretação
- (2) Confrontação
- (3) Esclarecimento
- (4) Validação empática
- (5) Afirmação

- () Envolve comentários sucintos em apoio aos comentários ou comportamentos do paciente.
- () Trata-se de declaração explanatória que liga sentimento, pensamento, comportamento ou sintoma a seu significado ou a sua origem inconsciente.
- () Trata-se de abordar algo que o paciente não quer aceitar ou sobre o que se identifique a sua evitação ou minimização.
- () Ajuda o paciente a articular alguma coisa considerada difícil de ser colocada em palavras.
- () Trata-se da demonstração da sintonia empática do terapeuta com o estado interior do paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.
- (D) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.
- (E) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.

28. Considere as afirmações abaixo sobre indicações para ênfase expressiva ou de apoio na psicoterapia.

- I - Bom controle de impulsos é indicação para psicoterapia expressiva.
- II - Boa capacidade de pensar em termos de analogia e metáfora é indicação para psicoterapia expressiva.
- III- Disfunção cognitiva de base orgânica é indicação para psicoterapia de apoio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. As alternativas abaixo referem-se aos critérios diagnósticos para transtorno de somatização, segundo o DSM-IV-TR, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) História de muitas queixas físicas, com início antes dos trinta anos e que ocorrem por um período de vários anos.
- (B) História de dor relacionada a, pelo menos, quatro locais ou funções diferentes.
- (C) História de pelo menos dois sintomas gastrointestinais outros, que não dor.
- (D) História de pelo menos dois sintomas sexuais ou reprodutivos, que não dor.
- (E) História de pelo menos um sintoma ou déficit sugerindo um problema neurológico não limitado à dor.

30. Quais são os sintomas mais comuns do transtorno conversivo?

- (A) Lombalgia, cefaleia e palpitações.
- (B) Torcicolo, polaciúria e dispneia.
- (C) Fraqueza, palpitações e dispneia.
- (D) Paralisias, cegueira e mutismo.
- (E) Afonia, visão em túnel e palpitações.

31. Considere as afirmações abaixo sobre os transtornos de ansiedade.

- I - A agorafobia não chega a interferir de modo significativo na capacidade de desempenho do indivíduo no trabalho.
- II - A fobia social generalizada tende a ser uma condição crônica incapacitante, com evitação fóbica da maioria das situações sociais.
- III- Transtorno do pânico raramente ocorre em associação com outro transtorno psiquiátrico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

32. Sobre as características clínicas e diagnósticas do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) em adultos, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) o sintoma mais comum é uma obsessão de contaminação, seguida pelo lavar ou pela evitação do objeto tido como contaminado.
- (B) obsessões religiosas são o segundo padrão de sintoma mais comum.
- (C) pensamentos obsessivos intrusivos são o terceiro padrão de sintoma mais comum.
- (D) há necessidade de sofrimento pessoal e comprometimento do desempenho para que se dê o diagnóstico.
- (E) pode haver, no exame do estado mental, sinais de transtorno depressivo associado.

33. O transtorno de ansiedade generalizada é uma condição _____. Sua prevalência em um ano varia de 3 a 8%. A razão de mulheres para homens é de _____. Em clínicas de transtorno de ansiedade, cerca de _____ dos casos são de transtorno de ansiedade generalizada. É possível que entre _____ dos pacientes com este diagnóstico tenham outra condição mental associada.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima.

- (A) rara – 2 para 1 – 25% – 50 a 90%
- (B) rara – 10 para 1 – 75% – 10 a 20%
- (C) comum – 10 para 1 – 25% – 50 a 90%
- (D) comum – 2 para 1 – 25% – 50 a 90%
- (E) comum – 2 para 1 – 75% – 10 a 20%

34. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os mecanismos de defesa às suas explicações.

- (1) Isolamento
- (2) Projeção
- (3) Cisão
- (4) Atuação
- (5) Identificação projetiva

- () Paciente expressa, por meio de ações, conflito ou desejo inconsciente de evitar ficar consciente tanto da ideia como do afeto que o acompanham.
- () Paciente projeta aspecto do *self* em outra pessoa, fazendo coerção sobre esta para se identificar com o que foi projetado, formando uma unidade.
- () Paciente dirige seus sentimentos ambivalentes às pessoas que são divididas em boas ou más, conforme o momento.
- () Paciente atribui seus próprios sentimentos inaceitáveis aos outros.
- () Paciente lembra-se da verdade da situação com detalhes, porém sem o afeto atribuído ao momento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (B) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- (C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (E) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.

35. A psicoterapia para pacientes com transtorno de personalidade *borderline* é área de intensa investigação, sendo seu tratamento de escolha frequentemente associado à farmacoterapia.

No que se refere à psicoterapia desses pacientes, assinale a afirmação correta.

- (A) O ideal é a realização de uma psicoterapia breve.
- (B) O estabelecimento de papéis não é essencial.
- (C) O terapeuta não transmite validação empática.
- (D) É essencial o estabelecimento de limites entre paciente e terapeuta.
- (E) O terapeuta é diretivo e ouvinte passivo.

36. Considere as afirmações abaixo sobre os transtornos relacionados ao álcool.

- I - As causas de morte comumente encontrados entre pessoas com transtornos relacionados ao álcool são suicídio, doenças cardíacas e hepáticas.
- II - Os diagnósticos psiquiátricos que costumam estar relacionados ao álcool são os transtornos relacionados a outras substâncias, os de personalidade antissocial, os de humor e os de ansiedade.
- III- O uso do álcool está associado à redução no sono REM, aumento no sono profundo e à fragmentação do tempo de sono total.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

37. Segundo o DSM-IV-TR, para o diagnóstico de abstinência de cocaína, temos a cessação ou redução do uso pesado e prolongado de cocaína, humor disfórico e, no mínimo, duas alterações fisiológicas, desenvolvidas de horas a dias após a cessação do uso.

Assinale a alternativa que apresenta as alterações fisiológicas associadas à abstinência de cocaína.

- (A) Aumento do apetite e dispneia.
- (B) Sonhos vívidos e palpitações.
- (C) Fadiga e dispneia.
- (D) Aumento do apetite e sonhos vívidos.
- (E) Sonhos vívidos e dispneia.

38. Sobre o tratamento dos transtornos relacionados à nicotina, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Todas as terapias de reposição de nicotina duplicam as taxas de cessação, talvez porque reduzam a abstinência.
- (B) As terapias de reposição usam período curto de manutenção (seis a doze semanas), seguido por período de redução gradual.
- (C) Doses diárias de 150 mg de bupropiona duplicam as taxas de cessação em fumantes com e sem história de depressão.
- (D) A abordagem psicológica mais aceita e comprovada é a terapia comportamental.
- (E) O treinamento em habilidades e a prevenção de recaídas identificam situações de risco que preparam o paciente para desenvolver habilidades de enfrentamento cognitivo e comportamental.

39. Em relação às disfunções sexuais, assinale a afirmação correta.

- (A) Ao fazer o diagnóstico dos transtornos do desejo sexual, deve-se tentar estabelecer uma linha de base de interesse sexual antes do início do transtorno.
- (B) A causa do transtorno erétil entre homens jovens é, na grande maioria das vezes, orgânica.
- (C) A prevalência geral de transtorno do orgasmo feminino, independentemente de sua causa, é estimada em cerca de 70%.
- (D) Na definição de ejaculação precoce não há necessidade atualmente de levar-se em consideração fatores que possam afetar a fase de excitação, tais como idade, novidade da parceria e frequência da atividade sexual recente.
- (E) A dispareunia deve ser diagnosticada quando há dor genital recorrente antes, durante ou após o ato sexual, independentemente da causa ser de base orgânica.

40. Considere as afirmações abaixo sobre os transtornos de identidade de gênero.

- I - A característica essencial desse transtorno é o sofrimento persistente e intenso de uma pessoa em relação ao seu sexo, bem como ao desejo de ser, ou a insistência de que é, do sexo oposto.
- II - O tratamento hormonal está indicado para ambos os sexos, após avaliação criteriosa.
- III- O tratamento cirúrgico deve ser indicado tão logo o paciente opte pela mudança de sexo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.