

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 48 - MÉDICO I (Clínico: Medicina Ocupacional)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 48

MÉDICO I (Clínico: Medicina Ocupacional)

01.	B	11.	C	21.	A	31.	B
02.	E	12.	A	22.	A	32.	B
03.	C	13.	E	23.	D	33.	D
04.	D	14.	C	24.	E	34.	C
05.	A	15.	B	25.	C	35.	A
06.	B	16.	C	26.	D	36.	D
07.	B	17.	D	27.	E	37.	ANULADA
08.	D	18.	A	28.	B	38.	A
09.	E	19.	E	29.	E	39.	E
10.	C	20.	D	30.	A	40.	D



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um Fiscal.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Homem, 38 anos de idade, procura atendimento médico queixando-se de dor de garganta intensa, tosse seca e prostração há 48 horas. Ao exame físico, apresenta temperatura axilar de 37,6 C°, hiperemia de orofaringe e linfadenomegalia cervical anterior dolorosa. Utilizando o Escore *CENTOR*, validado para o auxílio na conduta de situações como essa, como seria classificado o caso e a necessidade da prescrição de antibioticoterapia?

- (A) Escore = 0 / Sem indicação de antibioticoterapia.
- (B) Escore = 1 / Sem indicação de antibioticoterapia.
- (C) Escore = 2 / Sem indicação de antibioticoterapia.
- (D) Escore = 3 / A antibioticoterapia está indicada.
- (E) Escore = 4 / A antibioticoterapia está indicada.

02. Com relação ao diagnóstico e tratamento da rinossinusite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O aspecto da secreção nasal não diferencia os quadros virais dos bacterianos, não devendo ser levado em conta no momento de instituir-se o tratamento.
- (B) A presença de gota pós-nasal é de pouco valor para o diagnóstico, quando o tempo de duração dos sintomas é inferior a sete dias.
- (C) A escolha do antimicrobiano, quando necessária, é realizada de maneira empírica. Entretanto deve estar condicionada à presença de exposição recente a tal classe de drogas.
- (D) A prescrição de descongestionantes nasais produz alívio sintomático e pode ser indicada, desde que observadas as recomendações pertinentes.
- (E) O uso de corticosteroides de ação sistêmica não é recomendado nos casos suspeitos de etiologia bacteriana.

03. Mulher, 49 anos de idade, chega à consulta bastante apreensiva após ter percebido o surgimento súbito de vermelhidão ocular, unilateral, sem qualquer outro sintoma associado. Diz-se portadora dos diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e asma brônquica. Ao exame físico, apresenta coleção sanguínea, de margens bem delimitadas, no campo nasal direito. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Pterígio.
- (B) Conjuntivite alérgica.
- (C) Hemorragia subconjuntival.
- (D) Glaucoma agudo.
- (E) Iridociclite.

04. Examine as afirmações abaixo, a respeito das principais interações farmacológicas a que estão sujeitos os usuários de anticoagulantes orais cumarínicos.

- I - Amoxicilina, azitromicina, norfloxacino e propranolol fazem parte do grupo de drogas que aumentam o risco de hemorragias nesses pacientes.
- II - Carbamazepina, ribavirina e rifampicina fazem parte do grupo de drogas que aumentam o risco de trombose nesses pacientes.
- III - Omeprazol e paracetamol são alguns dos fármacos que são isentos de influência sobre o efeito dos anticoagulantes orais cumarínicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

05. Qual dos procedimentos abaixo listados **NÃO** faz parte do grupo de cuidados técnicos que devem ser observados para a correta aferição da pressão arterial, procedimento fundamental para o estabelecimento do diagnóstico e do prognóstico da hipertensão arterial sistêmica?

- (A) Sentar o paciente com o braço apoiado e na altura do precórdio. Alternativamente medir a pressão arterial na posição ortostática, mantendo o membro superior do paciente apoiado em superfície firme.
- (B) Proporcionar repouso prévio de cinco minutos e orientar o paciente para que se abstenha de cigarro e de bebidas cafeinadas nos 30 minutos precedentes ao exame.
- (C) Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 mm Hg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Proceder à deflação na velocidade de 2 – 4 mm Hg/segundo.
- (D) Considerar, na ocasião do exame, o valor da pressão arterial como a média de duas aferições. Havendo diferença superior a 5 mm Hg entre ambas, realizar nova medida.
- (E) A pressão arterial deve ser aferida nos dois braços na primeira consulta. Se discrepantes, considerar o valor mais alto.

06. O principal objetivo do tratamento de pacientes portadores de fibrilação atrial é a prevenção de eventos tromboembólicos. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os contextos clínicos com as opções antitrombóticas adequadas.

- (1) Aspirina
 (2) Aspirina + Clopidogrel
 (3) Varfarina
- () Mulher, 32 anos, portadora de estenose mitral de etiologia reumática.
 () Homem, 74 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica.
 () Mulher, 65 anos, portadora de sequelas motoras de acidente vascular cerebral, além de apresentar insuficiência renal crônica e retardo mental.
 () Homem, 47 anos, portador de diabetes melito tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 1.
 (B) 3 – 1 – 2 – 3.
 (C) 2 – 3 – 1 – 2.
 (D) 1 – 2 – 3 – 2.
 (E) 2 – 1 – 2 – 3.

07. A suplementação periconcepcional de _____ é indicada por, pelo menos, 1 mês antes da concepção e mantida, por até 12 semanas, pois isso diminui em até 70% a ocorrência de defeitos do tubo neural, como anencefalia e espinha bífida.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do parágrafo acima.

- (A) cálcio
 (B) ácido fólico
 (C) vitamina D
 (D) vitamina B 12
 (E) magnésio

08. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre infecções genitourinárias em mulheres.

- () A infecção por clamídia está associada a elevadas taxas de infecção do trato genital como salpingite, endometrite e abscesso tubo ovariano, resultando muitas vezes em infertilidade e gestações ectópicas.
 () São fatores de risco para infecção por clamídia: início precoce da atividade sexual, idade inferior a 25 anos, múltiplos parceiros sexuais, ectopia cervical, não uso de preservativos, história de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) e baixo nível socioeconômico.
 () A solicitação de exame comum de urina (EQU) e urocultura na primeira consulta e o tratamento das gestantes com cultura positiva reduzem o risco de pielonefrite aguda na gestação.
 () Todas as gestantes que apresentarem fatores de risco devem obrigatoriamente ser submetidas ao teste de anti-HIV.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V.
 (B) V – V – V – V.
 (C) V – V – F – F.
 (D) V – V – V – F.
 (E) F – F – F – F.

09. Considerando o uso de anti-hipertensivos na gestação, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os medicamentos às suas respectivas características.

- (1) Metildopa
 (2) Nifedipina
 (3) Propranolol
 (4) Furosemida
- () Aumenta o risco de RCIU (Retardo de Crescimento Intrauterino).
 () É a droga de 1.^a escolha na gestação.
 () Pode causar cefaleia.
 () Diminui a expansão do volume plasmático.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
 (B) 1 – 2 – 4 – 3.
 (C) 2 – 1 – 3 – 4.
 (D) 4 – 2 – 1 – 3.
 (E) 3 – 1 – 2 – 4.

10. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo referentes ao cuidado pré-natal.

- () O tratamento dietético pode ser suficiente para alcançar o controle glicêmico adequado na maior parte dos casos de gestantes com diabetes gestacional.
- () As gestantes com IgG e IgM negativos para toxoplasmose são suscetíveis à infecção e devem ser orientadas a evitar a ingestão de carne malcozida, proteger as mãos ao lidar no jardim, lavar bem frutas e verduras, beber água limpa e evitar contato com animais.
- () A vacinação contra rubéola é a melhor forma de prevenção de malformação fetal, devendo ser realizada nos 3 primeiros meses de gestação.
- () A contaminação por varicela, no período periparto, está associada a um risco maior de transmissão fetal, em torno de 25%.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – F.

11. A NR-32, do Ministério do Trabalho e Emprego, é uma norma regulamentadora que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. De acordo com essa norma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É vedado fumar, usar adornos e manusear lentes de contato nos postos de trabalho.
- (B) É vedado o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (C) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos.
- (D) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
- (E) O profissional da saúde deverá usar sapato fechado no seu posto de trabalho.

12. Em relação a um acidente perfurocortante com lâmina suja de sangue, de fonte desconhecida, é correto afirmar que

- (A) o risco de adquirir HIV é estimado em 0,3%.
- (B) mesmo apresentando um anti-HBS > 10mUI/mL, o acidentado tem um risco de contaminação em torno de 50%.
- (C) o risco de adquirir hepatite C é desprezível.
- (D) a melhor forma de proteção contra hepatite C é a vacinação.
- (E) não há necessidade de acompanhamento.

13. Profissional da saúde se acidenta após realizar coleta de sangue. O acidente é caracterizado como grave, envolvendo penetração profunda de uma agulha com pertuito e grande quantidade de sangue na mão direita, a qual estava sem luvas. Em relação ao manejo desse acidente, considere as afirmativas abaixo.

- I - Lavar o local do acidente com água e sabão e procurar atendimento imediato.
- II - Realizar os exames da fonte do acidente e no acidentado no momento zero.
- III- Se a fonte for HIV positiva, o início da terapia antirretroviral em esquema expandido deve ser iniciada o mais breve possível.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

14. Em relação à doença renal crônica, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) as principais causas são o diabetes melito, a hipertensão arterial sistêmica e as glomerulopatias.
- (B) os fármacos inibidores da enzima conversora da angiotensina estão indicados no paciente com doença renal terminal e diabetes com macroalbuminúria.
- (C) as estatinas estão contraindicadas em pacientes com filtração glomerular reduzida, mesmo que apresentem dislipidemia.
- (D) a doença cardiovascular e as doenças infecciosas são as principais causas de óbito nos pacientes com doença renal crônica.
- (E) uma taxa de filtração glomerular menor de 30 mL/min/1,73m² e/ou hematuria glomerular com macroalbuminúria são indicações para acompanhamento conjunto com nefrologista.

15. Mulher, 38 anos, casada, iniciou com polaciúria, disúria, urgência miccional e urina fétida há 48 horas. Ao exame físico, apresenta dor à palpação suprapúbica. A punhoperussão lombar é negativa. Refere episódios esporádicos semelhantes no passado. Nega gestação atual. Sem outros antecedentes dignos de nota.

Assinale a alternativa que descreve a melhor conduta nesse caso.

- (A) Coletar EQU e urocultura com teste e aguardar os resultados.
- (B) Iniciar tratamento com sulfametoxazol-trimetropina, via oral, por 3 a 7 dias.
- (C) Coletar EQU, urocultura com teste e realizar ecografia das vias urinárias.
- (D) Proceder internação hospitalar para investigação de possível causa anatômica.
- (E) Solicitar avaliação ginecológica para afastar vulvovaginite.

16. Fármacos inibidores seletivos da recaptção da serotonina, em função do baixo perfil de efeitos adversos, da segurança em altas dosagens e da eficácia são considerados de _____ no tratamento dos transtornos de ansiedade. Seu início de ação pode demorar _____ para ocorrer e o tratamento deve ser iniciado em _____, para que não ocorra _____ da ansiedade.

Assinale a alternativa que completa, adequadamente, as lacunas da frase citada acima.

- (A) 1.^a escolha – uma semana – baixas doses – aumento
- (B) 2.^a escolha – uma semana – altas doses – aumento
- (C) 1.^a escolha – de 2 a 6 semanas – baixas doses – aumento
- (D) 2.^a escolha – de 2 a 6 semanas – baixas doses – diminuição
- (E) 1.^a escolha – uma semana – altas doses – diminuição

17. Considere as afirmações abaixo sobre transtorno depressivo.

- I - Predisposição genética, ambiente estressor, temperamento e personalidade podem estar envolvidos na gênese dos transtornos depressivos.
- II - Dados brasileiros constataam que 85% dos pacientes que apresentam um primeiro episódio depressivo, apresentarão um segundo episódio.
- III- São sintomas da síndrome serotoninérgica: agitação, insônia, confusão, diarreia, febre, hiper-hidroze, midríase, tremores e hiper-reflexia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. Os sintomas físicos, sem qualquer evidência de doença orgânica que os justifique, podem ser um desafio para o trabalho médico. Em relação às queixas somáticas, sem explicação médica, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Os quadros dissociativos sempre se caracterizam pela presença de sintomas físicos.
- (B) As síndromes funcionais geralmente incluem um grupo comum de sintomas como dor muscular difusa, fadiga, alterações gastrointestinais, cefaleia e insônia.
- (C) A hipocondria envolve uma preocupação permanente e desproporcional com a própria saúde por meio de sensações somáticas.
- (D) A presença de transtornos mentais comuns e história de adoecimento físico e de abuso, principalmente na infância, são fatores de risco.
- (E) A dor é a queixa mais frequente que leva os pacientes com síndrome disfuncional aos consultórios médicos.

19. Considere as afirmações abaixo em relação ao tratamento do tabagismo.

- I - O tratamento da dependência ao tabaco reduz significativamente o risco de doenças relacionadas com o tabagismo a curto e médio prazo.
- II - O tratamento medicamentoso pode ser considerado para pacientes que fumam 20 ou mais cigarros por dia; que fumam o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar; que apresentam escore do teste de Fagerström igual ou maior do que 5.
- III- Os métodos de tratamento medicamentoso de primeira linha são a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona e a vareniclina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

20. Considere as situações abaixo quanto à necessidade de investigação para um possível diagnóstico de transtorno de humor bipolar.

- I - Pacientes com sintomas depressivos ou ansiosos, histórico de impulsividade, abuso de substâncias, irritabilidade ou humor elevado.
- II - Pacientes com depressão ou ansiedade e que tenham pobre resposta ao tratamento.
- III- Pacientes apresentando apneia do sono.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando possíveis fatores de risco com os respectivos sítios primários das neoplasias.

- (1) Bexiga
 (2) Cólon
 (3) Pulmão
 (4) Cérvix uterina
 (5) Mama
- () tabagismo – asbesto
 () atividade sexual precoce – infecção por subtipos de papilomavirus humano
 () tabagismo – corantes
 () história familiar – primeiro filho após 30 anos
 () história familiar – polipose familiar

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
 (B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
 (C) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
 (D) 1 – 4 – 3 – 5 – 2.
 (E) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.

22. No que se refere à dor lombar, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Artrite do quadril não está presente no diagnóstico diferencial da lombalgia.
 (B) A história ocupacional e recreacional do paciente fornece informações sobre fatores predisponentes.
 (C) A maioria dos pacientes queixa-se de dor predominante no dorso, na região glútea e nas coxas.
 (D) Os distúrbios da coluna vertebral são a maior causa de limitação funcional e ausência ao trabalho.
 (E) A maioria das hérnias discais localizam-se em L4-L5 e L5-S1.

23. Em relação às patologias do ombro, a síndrome do manguito rotador (impacto) é uma das mais frequentes na clínica de saúde ocupacional. Considere as afirmativas abaixo.

- I - O manguito rotador é formado pelos músculos supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo maior.
- II - A dor ocorre nos movimentos de elevação do braço, especialmente acima do nível do ombro.
- III- O tabagismo está associado a um risco aumentado de patologia tendinosa ao nível do ombro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. A capsulite adesiva (ombro congelado) é um processo inflamatório de toda a cápsula articular, que se torna espessada e retraída, com limitação da mobilidade do ombro afetado. Em relação a essa patologia, considere as afirmações abaixo.

- I - É mais frequente no sexo feminino.
- II - A fase de descongelamento pode durar muitos meses, mas evolui para a cura na maioria dos pacientes.
- III- Sua maior incidência é em pacientes diabéticos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. No que se refere à Tenossinovite de Quervain, que se manifesta com dor na face radial do punho, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os tendões acometidos são o extensor curto e abductor longo do polegar.
- (B) O Teste de Finkelstein é específico para essa patologia.
- (C) A infiltração local com corticoide apresenta resultados insatisfatórios.
- (D) O tratamento conservador é realizado com o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINE), repouso com tala e fisioterapia.
- (E) Variações anatômicas podem ocorrer no primeiro túnel extensor do punho.

26. No que se refere à saúde ocupacional, considere as afirmações abaixo, em relação à síndrome do túnel do carpo.

- I - Acomete o nervo radial.
- II - As queixas intensificam-se com o repouso, em geral à noite.
- III- Talas e órtese de punho trazem benefícios ao manejo dessa patologia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: Responda às questões **27** e **28** de acordo com o manual "O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios" (Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3.^a ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009).

27. Sobre doenças ou agravos à saúde de notificação compulsória, considere as afirmações abaixo.

- I - Hepatites virais, tuberculose e coqueluche são doenças de notificação compulsória.
- II - Para a maior parte dessas doenças ou agravos, a notificação deve ser feita quando existe suspeita da doença, sem necessidade de aguardar sua confirmação.
- III- Efeitos adversos pós-vacinação são agravos à saúde de notificação compulsória.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

28. Considere o texto abaixo:

"É um princípio fundamental do SUS. Garante ao usuário uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema de Saúde (...) também pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade (inserção social) e não num recorte de ações ou enfermidades."

O texto acima se refere a qual princípio fundamental do SUS?

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Intersetorialidade.
- (D) Acolhimento.
- (E) Descentralização.

29. Com relação ao que é vedado ao médico, segundo o Novo Código de Ética Médica, em vigor desde 13/04/2010, considere os itens abaixo.

- I - Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- II - Participar de anúncios de empresa comercial qualquer que seja a sua natureza, valendo-se da profissão.
- III- Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. A história natural do diabetes tipo 1 e 2 é caracterizada pelo aparecimento de complicações crônicas. Dessa forma, fica evidente a necessidade de planos de prevenção e controle de doenças micro e macrovasculares. Com relação ao diabetes, considere as afirmações abaixo.

- I - Todos os pacientes com diabetes e evidência clínica de doença aterosclerótica devem receber estatina, independentemente do valor inicial do LDL.
- II - A metformina traz maior benefício aos pacientes diabéticos com sobrepeso. Apesar de não reduzir mortalidade e incidência de infarto agudo do miocárdio, há melhora dos sintomas e diminuição do número de hospitalizações.
- III- O ácido acetilsalicílico (AAS) deve ser prescrito para todos os pacientes diabéticos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

31. No que se refere aos medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca, que tem o objetivo de reduzir os sintomas, melhorar a capacidade funcional e diminuir a mortalidade, associe a classe desses medicamentos às suas respectivas características.

- (1) Bloqueadores da aldosterona
 - (2) Betabloqueadores
 - (3) Diuréticos
 - (4) Inibidores da enzima conversora da angiotensina
- () Classe de medicações com efeito mais rápido sobre sintomas de congestão pulmonar (dispneia, edema, turgência jugular e ganho de peso).
 - () Devem ser iniciados somente quando o paciente estiver clinicamente compensado e sem sinais de congestão.
 - () Indicados para pacientes classe funcional III e IV; fundamental monitorar função renal e potássio séricos.
 - () Reduzem mortalidade, reinfarto e internações hospitalares; indicados para pacientes classe I a IV. Monitorar ureia, creatinina e potássio séricos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 3 – 2 – 1 – 4.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 4 – 3 – 2 – 1.

32. Sobre a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) pode apresentar sintomas abdominais inespecíficos e desconforto em hipocôndrio direito.
- (B) é autolimitada e não tem relação com o desenvolvimento de cirrose hepática.
- (C) é considerada a manifestação hepática da síndrome metabólica.
- (D) é caracterizada pelo acúmulo de triglicerídeos no citoplasma dos hepatócitos.
- (E) idade avançada e hipertensão arterial sistêmica são variáveis associadas à maior gravidade da DHGNA.

33. No que se refere à promoção da atividade física, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A recomendação geral para adultos saudáveis é praticar 150 minutos de atividade física, de intensidade moderada ou vigorosa, por semana.
- () Continuar com um estilo de vida inativo ou sedentário representa risco maior do que aumentar gradualmente os níveis de atividade física.
- () Em programas de reabilitação cardíaca, a atividade física é contraindicada a pacientes com doença cardíaca coronariana conhecida, pois, nesses casos, os riscos de parada cardíaca e infarto não fatal superam os benefícios da atividade física para a qualidade de vida desses pacientes.

A sequência que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – F.

34. O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) abrange componentes que devem estar presentes em todas as consultas, independentemente da razão do atendimento. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Compreender como o problema afeta a vida diária da pessoa.
- (B) Construir um entendimento acerca do problema e do que precisa ser feito.
- (C) Tomar a decisão visando ao bem do seu paciente, sendo a doença o foco da consulta.
- (D) Explorar aspectos subjetivos do problema.
- (E) Conhecer o contexto do paciente.

35. Homem de 46 anos procura atendimento médico por apresentar um quadro de febre, tosse, obstrução nasal, dor na face e presença de secreção nasal purulenta com evolução de cinco dias.

Com relação à conduta correta nessa situação, considere os itens abaixo.

- I - Higiene nasal com solução salina, várias vezes ao dia.
- II - Uso de amoxicilina, por 10 a 14 dias.
- III- Uso de prednisona 40 mg ao dia, por 7 dias.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

36. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca materializar, entre outros aspectos, uma proposta de qualificação do SUS, no sentido de melhorar a integração entre gestores, trabalhadores de saúde e usuários. Com relação aos princípios e diretrizes da PNH, considere os itens abaixo.

- I - Alteração dos modos de cuidar é inseparável da alteração nos modos de gerir e se apropriar do trabalho.
- II - Estabelecimento de mecanismos para escuta, responsabilização e resolutividade da assistência, através do acolhimento.
- III- Os Conselhos Locais de Saúde são os responsáveis pela Ouvidoria dos serviços.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

37. Mulher de 56 anos, auxiliar de higienização, busca atendimento médico com queixa de tonturas. Informa que tem apresentado episódios recorrentes de tonturas nas últimas semanas, com duração de poucos segundos, associados a movimentos da cabeça e que são acompanhados por náusea e desequilíbrio ao deambular. Nega outros sintomas ou o uso de medicamentos no momento.

Analise o quadro descrito e assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável e o medicamento correto para uso nesse caso.

- (A) Síndrome de Ménière – cinarizina.
- (B) Cinetose – metoclopramida.
- (C) Vertigem posicional paroxística benigna – dimenidrinato.
- (D) Insuficiência vertebrobasilar – prometazina.
- (E) Neurite vestibular – diazepam.

38. Homem de 31 anos inicia tratamento para tuberculose pulmonar. Nas consultas anteriores, informou que mora com a esposa e um enteado de 12 anos, ambos assintomáticos.

Com relação ao manejo desses familiares, assinale a alternativa correta.

- (A) Solicitar prova tuberculínica. Se o resultado for igual a 5 mm e o Raio-X de tórax estiver normal, tratar ILTB.
- (B) Solicitar prova tuberculínica. Se o resultado for igual a 5 mm, repetir em seis meses.
- (C) Solicitar pesquisa de BAAR (2 amostras). Se o resultado for negativo, tratar ILTB.
- (D) Solicitar Raio-X de tórax. Se o resultado for normal, repetir o exame em três meses.
- (E) Solicitar Raio-X de tórax. Se o resultado for suspeito, tratar ILTB.

39. Com relação ao uso de antivirais no tratamento das infecções por herpes simples, em pacientes adultos imunocompetentes, considere as afirmações abaixo.

I - A primoinfecção benigna pode ser tratada com Aciclovir 200 mg, via oral, cinco vezes por dia, por 10 dias.

II - A infecção labial recorrente pode ser tratada com Fanciclovir 1,5 g, via oral, em dose única.

III- Valaciclovir, na dose de 500 mg ao dia, pode ser utilizado na terapia continuada de supressão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

40. Mulher de 47 anos, auxiliar de cozinha, relata “chiado no peito”, há duas semanas, iniciado após um quadro de resfriado comum. A paciente não é fumante, mas informa que teve dois episódios semelhantes no último ano, com duração de várias semanas. Buscando confirmar o diagnóstico de asma, o médico solicita uma espirometria.

Assinale a afirmativa correta em relação a esse exame.

- (A) Aumento de até 100 mL no VEF₁, após o broncodilatador, é bastante sugestivo de asma.
- (B) Na asma, há presença de distúrbio ventilatório obstrutivo, demonstrado pelo aumento do coeficiente expiratório forçado.
- (C) A função pulmonar é anormal mesmo entre as crises de asma.
- (D) Pode haver uma resposta tardia ao broncodilatador associado ao corticoide, com aumento de, pelo menos, 15% no VEF₁.
- (E) O teste de broncoprovocação não deve ser feito em pacientes com espirometria normal.