

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 54 - MÉDICO DO TRABALHO I

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 54

MÉDICO DO TRABALHO I

01.	A	11.	C	21.	C
02.	C	12.	E	22.	A
03.	B	13.	A	23.	B
04.	E	14.	B	24.	A
05.	D	15.	C	25.	E
06.	A	16.	E		
07.	B	17.	B		
08.	D	18.	D		
09.	A	19.	E		
10.	D	20.	D		



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **duas horas e meia (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um Fiscal.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Mulher de 34 anos chega no ambulatório com dor torácica persistente na projeção do *ictus cordi*, que dura uma hora, piorando com crises de dor aguda inframamária esquerda que se mantém por um a dois segundos. A paciente apresenta-se agitada, referindo parestesias em extremidades e região perioral e sensação de sufocação e morte iminente. Não tem histórico de doenças prévias e não faz uso de medicação de uso contínuo. O exame físico foi normal, com níveis pressóricos normais. Qual a hipótese diagnóstica e melhor conduta diante do quadro clínico descrito?

- (A) Dor psicogênica. Iniciar com benzodiazepínico e liberar a paciente.
- (B) Dor de origem pulmonar (infecção respiratória). Iniciar com antibiótico e liberar a paciente.
- (C) Dissecção de aorta. Encaminhar a paciente para Emergência Hospitalar.
- (D) Dor cardíaca (angina). Encaminhar a paciente para a Emergência Hospitalar.
- (E) Dor de origem gastroesofágica. Iniciar com inibidor de bomba de prótons e liberar a paciente.

02. Em relação à NR-18, que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os itens às suas respectivas descrições e/ou características.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Andaime geral (2) Andaime em balanço (3) Balancim (4) Anteparo (5) Ancoragem | <ul style="list-style-type: none"> () Equipamento que permite a utilização por apenas uma pessoa. () Plataforma para trabalhos em alturas, elevadas por estrutura provisória ou dispositivo de sustentação. () Designação das peças que servem para proteger ou resguardar alguém ou alguma coisa. () Sistema de fixação entre a estrutura da torre da grua e a edificação. () Andaime fixo, suportado por vigamento em balanço. |
|--|--|

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- (B) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- (D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (E) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.

03. O que significa o princípio da equidade no Sistema Único de Saúde?

- (A) Cada cidadão deve ser percebido como um todo indivisível e integrante de uma comunidade, em um município.
- (B) Todo cidadão é igual perante o SUS e deve ser atendido conforme suas necessidades.
- (C) Garantia de atenção à saúde a todo cidadão, sem qualquer tipo de discriminação.
- (D) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
- (E) Direito à informação sobre a própria saúde, bem como conhecimento de todo tratamento proposto.

04. Em relação ao tabagismo, marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as afirmações abaixo.

- () No Brasil, os percentuais de tabagistas caíram, sendo que negros e pardos são mais suscetíveis ao consumo do tabaco.
- () A maioria dos fumantes começa antes dos 15 anos, tendo como consequência diminuição da expectativa de vida.
- () Uma intervenção breve do profissional de saúde produz taxas de cessação importantes, constata-se que o conselho do médico aumenta em 66% a probabilidade de o paciente parar de fumar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

05. Qual das alternativas abaixo **NÃO** é considerada uma ação para evitar a transmissão de uma doença respiratória como a tuberculose pulmonar?

- (A) Isolamento do paciente.
- (B) Tratamento adequado.
- (C) Identificação rápida da patologia.
- (D) Restrição de visitas ao paciente.
- (E) Utilização de máscara cirúrgica no paciente.

06. O Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, implantado em uma rede de hospitais-sentinelas, para prevenção de danos na assistência à saúde, monitorando os medicamentos associados a um percentual de riscos elevados para danos graves. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre dispõe de uma lista de medicamentos/classes terapêuticas de alta vigilância. No que se refere aos itens incluídos nessa lista, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Antibióticos de última geração
- (B) Nutrição parenteral
- (C) Warfarina
- (D) Insulina
- (E) Eletrólitos concentrados

07. Com relação ao manejo do trabalhador exposto a doenças transmissíveis, considere as condutas indicadas abaixo.

- I - O trabalhador com tuberculose ativa deve ser afastado do trabalho até não ser mais infectante. No caso de viragem do teste de Mantoux não há necessidade de afastamento.
- II - O trabalhador suscetível exposto a paciente com caxumba deve afastar-se do trabalho do décimo segundo dia após a primeira exposição até o vigésimo sexto dia após a última exposição.
- III - O trabalhador suscetível exposto a paciente com rubéola deve afastar-se do trabalho do décimo segundo dia após a primeira exposição até o vigésimo sexto dia após a última exposição.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

08. No que se refere a Lesões de Esforço Repetitivo (LER/DORT), numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os diagnósticos com seus respectivos fatores de risco.

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Epicondilite lateral | () prensão prolongada de objetos com o punho na posição estabilizado em flexão dorsal |
| (2) Tenossinovite de Quervain | () flexão cervical acentuada por períodos prolongados |
| (3) Epicondilite medial | () abdução dos membros superiores acima dos ombros associada à força |
| (4) Dor em ombro | () carregamento de peso acima de 20 quilos |
| (5) Cervicalgia | () movimentos repetitivos com desvio ulnar do punho |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- (B) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- (D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (E) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.

09. São consideradas insalubres atividades desenvolvidas por trabalhadores que se expõem a fatores de risco acima dos limites de tolerância previstos em lei. Com relação a isso, considere as afirmações abaixo.

- I - Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante sua atividade laboral.
- II - No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, para efeito salarial, a percepção é cumulativa.
- III - O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário do trabalhador.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. Sobre a NR-09, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), considere as afirmações abaixo.

- I - É obrigatória a elaboração e implementação do PPRA por parte de todos empregadores e instituições que admitem trabalhadores.
- II - A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA somente devem ser feitos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
- III- O PPRA deverá conter, no mínimo, planejamento anual com metas, prioridades e cronograma; estratégia, metodologia de ação; registro, manutenção e divulgação de dados; periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

11. Dados estatísticos de países industrializados apontam as dermatoses ocupacionais como o grupo mais frequente entre as doenças profissionais (Adams, 1981; Emmett, 1983). Sobre as dermatoses ocupacionais, assinale a alternativa correta.

- (A) Em alguns casos, dermatoses ocupacionais podem ocasionar incapacidade laboral temporária, exigindo muitos meses de afastamento da exposição ao agente causal, mas o retorno às atividades laborativas sempre é possível.
- (B) Dermatose ocupacional é toda alteração da pele, mucosas e anexos direta ou indiretamente causada por aquilo que for utilizado na atividade profissional ou exista no ambiente de trabalho. Dermatoses preexistentes, mantidas ou agravadas no ambiente de trabalho, não são consideradas ocupacionais.
- (C) No ambiente hospitalar, são importantes causadores de dermatite de contato por EPI, fatores como: uso de luvas quando as mãos já se acham irritadas; luvas de tamanho inadequado, furadas ou rasgadas; sudorese excessiva dos trabalhadores de saúde.
- (D) As disidroses, grupo bastante comum de dermatoses ocupacionais, são erupções vesiculares agudas, recorrentes ou crônicas, que podem atingir as faces laterais dos dedos das mãos e dos pés, palmas e plantas, de etiologia variada como disidrose de contato, por atopia, sensibilização ao níquel e outras.
- (E) Miliária, eritema *abigne*, intertrigo e urticária pelo calor, embora sejam doenças dermatológicas bastante prevalentes em trabalhadores de ambientes muito quentes, não são enquadradas no grupo das dermatoses ocupacionais.

12. O médico do trabalho, como em qualquer outra especialidade, enfrenta frequentemente dilemas éticos durante o exercício de sua atividade. Considere as afirmações abaixo.

- I - O Médico do Trabalho pode divergir de opinião sobre atestado fornecido por colega sobre afastamento do trabalho e período de tempo, estabelecendo sua própria opinião clínica, mas isto só pode ser feito após o exame do paciente.
- II - Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não, por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal.
- III- Se o paciente solicitar a colocação do código da Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestado médico, deverá expressar essa concordância no atestado.
- IV - Não é necessário título de especialista em Medicina do Trabalho para fornecimento de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), mas essa exigência existe, no que se refere à elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- V - Médico que presta assistência ao trabalhador, quando solicitado pelo paciente, por dever ético, é obrigado a fornecer atestado médico para perícia do INSS, inclusive em Urgências, Emergências e Pronto Atendimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

13. Baseando-se nas recomendações de vacinação em profissionais de saúde do *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as associações abaixo.

- () Sarampo, caxumba, rubéola: todos os trabalhadores da saúde nascidos durante ou após 1957 precisam de evidência presuntiva de imunidade ou documentação de, pelo menos, uma dose de MMR, ou de presença da doença no passado. Confirmação laboratorial de imunidade não é evidência presuntiva.
- () Hepatite B: se a série vacinal é interrompida após a primeira dose, a segunda dose deve ser administrada logo que possível, devendo a terceira dose ser distanciada da segunda por um intervalo de, pelo menos, 8 semanas.
- () Influenza: administrada a vacina, a imunidade protetora surge 24 a 72 horas após. Embora muito raramente, por se tratar de vírus vivo atenuado, algumas pessoas podem desenvolver influenza vacinal.
- () Varicela: documentação de duas doses da vacina com, pelo menos, 28 dias de intervalo, história de varicela ou *herpes zoster* com base no diagnóstico médico, evidência laboratorial de imunidade ou a confirmação laboratorial da doença, constituem-se evidências suficientes de imunidade à varicela em profissionais de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – V – F – V.

14. A NR-33 estabelece os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. De acordo com a NR-33, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as atribuições aos respectivos responsáveis.

- (1) Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento.
- (2) Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para segurança e saúde de terceiros que sejam do seu conhecimento.
- (3) Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário.
- (4) Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente ou outra situação não prevista.
- (5) Avaliar aptidão para espaço confinado, conforme disposto na NR-07 e NR-31.

- () empregador
- () trabalhador
- () médico
- () supervisor de entrada
- () vigia

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- (B) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (C) 2 – 1 – 3 – 5 – 4
- (D) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
- (E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.

15. No que se refere à avaliação da Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), assinale a alternativa **INCORRETA**, de acordo com a NR-15.

- (A) Além dos sintomas auditivos, dificuldade de compreensão da fala, zumbido e intolerância a sons intensos, o trabalhador portador de PAIR também pode apresentar queixas como cefaleia, tontura, irritabilidade e problemas digestivos.
- (B) O limite de tolerância para ruído do tipo impacto será de 130dB(A).
- (C) A principal característica da PAIR é não produzir perda maior que 40dB(NA) nas frequências altas e 75dB(NA) nas baixas.
- (D) A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos limiares.
- (E) O primeiro sinal de PAIR é um rebaixamento no limiar audiométrico de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. No início da perda, a média dos limiares de 500, 1.000 e 2.000 Hz é melhor do que a média de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. O limiar de 8.000 Hz tem que ser melhor do que o pior limiar.

16. Homem de 25 anos, negro, solteiro, instrução fundamental, ajudante em uma pequena empresa de cerâmicas, queixa-se de dores abdominais em cólica, falta de apetite, náuseas e obstipação intestinal há 3 dias. Ao exame físico, tem-se: peso 70Kg, altura 1,75m, afebril, bom aspecto geral, fâscies atípica, mucosas hipocoradas. Na oroscopia apresentava dentes em mau estado de conservação e presença de linha escura em gengiva da arcada dentária de canino inferior. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. Pulso 76bpm, P.A. 125/70 mmHg. Abdome doloroso à palpação no mesogástrico.

Diante deste caso, assinale a melhor hipótese diagnóstica.

- (A) Hidrargirismo
- (B) Intoxicação por arsênio
- (C) Benzenismo
- (D) Intoxicação por cádmio
- (E) Saturnismo

17. Sobre a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) usada na redução da transmissão do HIV, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É direito do profissional se recusar a realizar a quimioprofilaxia ou outros procedimentos necessários pós-exposição.
- (B) O prazo máximo para início de PEP é de até 24h após o acidente.
- (C) A duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.
- (D) A nevirapina é contraindicada como profilaxia antirretroviral.
- (E) O esquema padrão de AZT (zidovudina) associado a 3TC (lamivudina) está indicado para a maioria das exposições.

18. No que se refere aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, considere as afirmações abaixo, de acordo com a NR-04.

- I - Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Neste caso, os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho poderão ficar centralizados.
- II - A empresa que contratar outras firmas para prestarem serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMT comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
- III- Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um enfermeiro em tempo integral.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

19. No que se refere aos requisitos mínimos de conforto dos assentos utilizados nos postos de trabalho, assinale a alternativa **INCORRETA**, de acordo com a NR-17.

- (A) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida.
- (B) Pouca ou nenhuma conformação na base do assento.
- (C) Base frontal arredondada.
- (D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
- (E) Mecanismo ajustável à região cervical.

20. Considere as afirmações abaixo sobre a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho.

- I - A inserção de PCD em empregos públicos, mediante concurso, é apoiada por uma equipe multiprofissional.
- II - A comprovação da condição de PCD pode ser feita por laudo médico, emitido pelo médico do trabalho da empresa.
- III- A condição de PCD pode ser comprovada por certificado de reabilitação profissional, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

21. No processo de constituição de diferentes agravos mentais identificados em Psicopatologia do Trabalho, a fadiga é especialmente central em três síndromes. Quais são elas?

- (A) Transtorno cognitivo leve, neurastenia e transtorno de adaptação.
- (B) Transtorno de adaptação, neurastenia, esgotamento profissional (*burnout*).
- (C) Neurastenia, transtorno do ciclo vigília-sono não orgânico e esgotamento profissional (*burnout*).
- (D) Transtorno cognitivo leve, neurastenia e esgotamento profissional (*burnout*).
- (E) Transtorno de adaptação, transtorno cognitivo leve e transtorno do ciclo vigília-sono não orgânico.

22. Considere as afirmações sobre avaliação da infecção tuberculosa em profissionais da saúde através da Prova Tuberculínica (PT).

- I - Quando a PT for < 10 mm, repetir em uma a três semanas para avaliação do efeito *booster*.
- II - Quando o efeito *booster* for positivo, não é necessário repetir a PT.
- III- Nos profissionais da saúde infectados pelo HIV é contraindicado fazer a PT.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

23. De acordo com a NR-32, com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, **NÃO** deve constar no PCMSO

- (A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroc conversão e das doenças.
- (B) a transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente.
- (C) as medidas para descontaminação do local de trabalho.
- (D) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores.
- (E) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores.

24. Das patologias abaixo citadas, qual **NÃO** é contraindicação para o trabalho noturno?

- (A) Anemia falciforme.
- (B) Epilepsia em uso de medicação.
- (C) Hipertensão arterial em uso de múltiplas medicações.
- (D) Tumores malignos.
- (E) Diabetes dependente de insulina.

25. A partir de 31 de março de 2007, além da CAT, a caracterização de um benefício acidentário pode ser feita pelo(s) nexo(s)

- I - profissional ou do trabalho, que está fundamentado nas associações entre as patologias e exposições constantes das listas A e B, do anexo II, do Decreto 3.048/99.
- II - técnico epidemiológico, aplicável quando houver significância estatística da associação entre o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) e o de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
- III- individual, por doença equiparada a acidente de trabalho, decorrente de acidentes de trabalho típico ou de trajeto, bem como de condições especiais do trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.