



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

### **MISSÃO INSTITUCIONAL**

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## **EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS**

# **PS 17 – ENFERMEIRO (Centro Obstétrico)**

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.**

**Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.**

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 04/2007 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 17

##### ENFERMEIRO (Centro Obstétrico)

01.	<b>E</b>	11.	<b>E</b>	21.	<b>C</b>
02.	<b>D</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>E</b>
03.	<b>B</b>	13.	<b>C</b>	23.	<b>B</b>
04.	<b>D</b>	14.	<b>A</b>	24.	<b>C</b>
05.	<b>C</b>	15.	<b>A</b>	25.	<b>D</b>
06.	<b>C</b>	16.	<b>A</b>		
07.	<b>E</b>	17.	<b>D</b>		
08.	<b>ANULADA</b>	18.	<b>A</b>		
09.	<b>B</b>	19.	<b>D</b>		
10.	<b>ANULADA</b>	20.	<b>B</b>		

# INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA contém **25** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa Prova!**

**01.** A importância do aleitamento materno tem sido exaustivamente documentada em diversas publicações, porém a ênfase na amamentação exclusiva é um fato relativamente recente.

Dentre as alternativas abaixo, indique a que corresponde ao período de amamentação exclusiva recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

- (A) 1 a 2 meses
- (B) 2 a 3 meses
- (C) 3 a 4 meses
- (D) 4 a 6 meses
- (E) 6 meses

**02.** Com relação à amamentação, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Na técnica de amamentação adequada, é importante que o corpo do bebê esteja voltado para o corpo da mãe e próximo a ela, permitindo que sua boca permaneça na altura do mamilo e da aréola.
- ( ) A pega e ordenha inadequadas podem acarretar uma mamada ineficiente, tornando-se difícil para o bebê retirar o leite posterior (do final da mamada), mais rico em calorias.
- ( ) As práticas hospitalares, incluindo o tipo de parto, a amamentação precoce, o alojamento conjunto e a orientação e auxílio dos profissionais de saúde na prática de amamentação, não são fatores que interferem na continuidade do aleitamento materno.
- ( ) Para a mulher, do ponto de vista biológico, a amamentação contribui para a retração do útero no pós-parto, diminuindo a perda sangüínea e protegendo, portanto, as reservas maternas de ferro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – F.

**03.** Considere as recomendações abaixo, dadas por um enfermeiro, ao orientar uma gestante diabética quanto à auto-aplicação de insulina, no caso de utilização de insulinas de ações diferentes em uma única seringa, para injeção simultânea.

I - Nunca se deve aspirar primeiramente a insulina regular, e a aplicação deve ser de cinco (5) a dez (10) minutos após o preparo.

II - A insulina de ação intermediária deve ser aplicada até cinco (5) minutos após o preparo, pois pode "contaminar" a insulina regular, retardando seu tempo de ação.

III- Deve-se aspirar primeiramente a insulina Lispro e, após, a regular, aplicando conforme rodízio dos locais de injeção subcutânea.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**04.** É fator de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional a ocorrência de

- (A) convulsões antes da gestação.
- (B) emagrecimento durante a gestação.
- (C) infecção urinária durante a gestação.
- (D) obesidade ou ganho excessivo de peso durante a gestação.
- (E) idade da gestante menor do que 25 anos.

**05.** Indique a alternativa que menciona manifestações ocorridas durante o puerpério que **NÃO** são consideradas alterações anatômicas e fisiológicas.

- (A) Ocorre o aumento da temperatura axilar (36,8° C a 37,9° C) nas primeiras 24 horas.
- (B) Ocorrem calafrios, mais freqüentes nas primeiras horas após o parto.
- (C) Ocorre leucopenia durante o puerpério.
- (D) O útero atinge a cicatriz umbilical após o parto e, posteriormente, regride em torno de 1 cm ao dia.
- (E) Aumenta o volume circulante, devido à presença de sopro sistólico de hiperfluxo.

**06.** Indique a alternativa que **NÃO** apresenta um cuidado de enfermagem durante o quarto período do parto.

- (A) Verificar sinais vitais a cada 15 minutos.
- (B) Avaliar o fundo uterino e massagear o útero até que seja constatado um aumento do tônus (globo de segurança de Pinard).
- (C) Observar o intervalo e a duração das contrações uterinas.
- (D) Manter uma bolsa de gelo no períneo.
- (E) Avaliar o aspecto dos lóquios.

**07.** Com relação aos cuidados de enfermagem com o recém-nascido, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Ao nascer, o vérnix caseoso não deve ser totalmente removido.
- ( ) A higiene do coto umbilical é feita com álcool a 70%, quatro vezes ao dia.
- ( ) A remoção do *cord clamp* deve ocorrer após 48 horas de vida.
- ( ) A área retal das meninas deve ser limpa de frente para trás, evitando levar germes para a uretra.
- ( ) No banho diário, quando ainda houver coto umbilical, a higiene corporal deve ser feita com pano úmido em movimentos de massagem sobre a pele.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – V – F – V – V.

**08.** Considere as afirmações abaixo, relativas ao puerpério.

- I - As transformações que se iniciam no puerpério ocorrem não somente nos aspectos endócrino e genital, mas no organismo da mulher como um todo.
- II - Didaticamente, divide-se puerpério em imediato (1º ao 10º dia), remoto (11º ao 42º dia) e tardio (a partir do 43º dia).
- III- Puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu término imprevisto, devido a modificações que ocorrem durante a lactância (amamentação).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**09.** O nascimento pré-termo continua sendo uma importante causa de mortalidade perinatal. Considerando as ocorrências abaixo, indique as que são fatores de risco para o parto pré-termo, assinalando **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) gestação múltipla
- ( ) ruptura prematura de membranas
- ( ) corioamnionite
- ( ) idade materna inferior a 35 anos
- ( ) tabagismo

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) F – F – V – V – F.

**10.** Indique, dentre as manifestações abaixo, as que são sinais e sintomas de trabalho de parto prematuro.

- I - dor em baixo ventre
- II - diminuição da frequência urinária
- III- ruptura prematura de membranas

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**11.** Considere as afirmações abaixo, relativas aos aspectos bioéticos da confidencialidade e privacidade.

- I - A garantia da preservação do segredo das informações é um dever *prima facie* de todos os profissionais e também das instituições.
- II - A preservação das informações é um compromisso de todos, sendo a confidencialidade um valor que deve ser transmitido aos alunos dos hospitais universitários.
- III- Pode existir exceção à preservação de informações, desde que por justa causa e com amparo na legislação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**12.** A atenção obstétrica e neonatal humanizada, baseada em evidências científicas e preconizada pelo Ministério da Saúde como política nacional, está fundamentada em vários princípios e diretrizes. Assinale a alternativa que **NÃO** constitui um desses princípios ou diretrizes.

- (A) Respeito às características fisiológicas da gestação, do parto, do nascimento e do puerpério, ao fortalecimento da autonomia da mulher e à preservação da sua privacidade.
- (B) Adoção de práticas e rotinas cujos benefícios estejam comprovados por evidências científicas, evitando-se manobras e intervenções desnecessárias.
- (C) Estímulo ao parto normal e ao aleitamento materno, com alojamento conjunto.
- (D) Resgate dos processos da gestação, do parto, do puerpério e do nascimento como experiências humanas mais significativas, que envolvem não só a mulher, mas seu parceiro e sua família.
- (E) Forte ênfase na utilização de tecnologia e intervenções segundo níveis crescentes de complexidade.

**13.** O Processo de Enfermagem é a metodologia utilizada para sistematizar a assistência de enfermagem, organizando as informações sobre os pacientes e determinando as intervenções que atendam as suas necessidades. Assinale a alternativa correta quanto à ordem dos cinco passos do Processo de Enfermagem.

- (A) identificação do problema – investigação – coleta de dados – planejamento do cuidado – implementação do cuidado – avaliação dos resultados
- (B) investigação – planejamento do cuidado – implementação do cuidado – identificação do problema – diagnóstico – avaliação do resultado
- (C) investigação – identificação do problema – planejamento do cuidado – interpretação do problema (implementação do cuidado) – avaliação do resultado
- (D) avaliação do resultado – identificação do problema – planejamento do cuidado – coleta de dados – implementação do cuidado
- (E) diagnóstico – planejamento do cuidado – coleta de dados – implementação do cuidado – avaliação do resultado

**14.** Julgamentos clínicos sobre as respostas do paciente, de sua família ou da comunidade, com relação aos problemas de saúde ou os processos de vida, vigentes ou potenciais.

A definição acima refere-se a

- (A) Diagnóstico de Enfermagem.
- (B) Coleta de Dados.
- (C) Planejamento do Cuidado.
- (D) Investigação.
- (E) Implementação do Cuidado.

**15.** A gestação é um fenômeno cuja evolução se dá, na maior parte das vezes, sem intercorrências. Contudo, existem gestações com maior probabilidade de ter uma evolução desfavorável, tanto para o feto quanto para a mãe – as chamadas Gestações de Alto Risco.

Com relação à gestação de alto risco, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Para a mãe, o risco se estende até 30 dias após o nascimento, pois as complicações maternas costumam se resolver durante o mês posterior ao parto.
- ( ) É maior a incidência em mulheres com menos de 17 anos ou mais de 35 anos.
- ( ) Considerando que uma gestação se dá diferentemente de outra, a história reprodutiva anterior não é fator de risco na gestação.
- ( ) O desvio quanto ao crescimento uterino, ao número de fetos e ao volume de líquido amniótico e o ganho ponderal inadequado materno são considerados fatores de risco reprodutivos.
- ( ) O peso inferior a 45 kg ou superior a 75 kg e a estatura inferior a 1,45 m são fatores predisponentes de risco na gestação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – F – F – V – F.

**16.** No início da gravidez, ocorrem várias alterações fisiológicas (sinais e sintomas), que o profissional da saúde deve avaliar antes de considerar um diagnóstico investigativo de gestação.

Relacione os sinais abaixo apresentados à sua classificação.

- (1) sinais de presunção
  - (2) sinais de certeza
  - (3) sinais de probabilidade
- ( ) presença de batimentos cardíacos fetais – movimentação fetal – presença de feto (confirmada por ecografia obstétrica)
  - ( ) aumento uterino – contrações de Braxton Hicks – gravidez (confirmada por teste de gravidez)
  - ( ) amenorréia – náuseas com ou sem vômitos – modificações nas mamas – aumento de frequência urinária – movimentação fetal

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

**17.** A Incompatibilidade Sangüínea Materno-Fetal ocorre quando o organismo de uma mulher grávida é estimulado a produzir anticorpos contra as células vermelhas do fator Rh ou do sistema ABO do feto.

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta cuidados de enfermagem com gestante ou parturiente isoimunizada.

- (A) Avaliar os batimentos cardíacos fetais cuidadosamente, investigando sinais de sofrimento fetal.
- (B) Coletar sangue da mãe e do cordão do recém-nascido logo após o parto, para realização de teste de Coombs direto e indireto e de tipagem sangüínea e de fator Rh do bebê.
- (C) Orientar sobre os riscos para as gestações futuras.
- (D) Aplicar imunoglobulina anti-D até 72 horas posteriores ao parto, após amniocentese, gestação ectópica e abortamento.
- (E) Orientar a gestante quanto ao controle diário dos movimentos fetais.

**18.** Considere as afirmações abaixo, relativas a intercorrências e complicações do período gestacional.

- I - A ruptura uterina é caracterizada por dor repentina e aguda no baixo ventre e sinais de sofrimento fetal, podendo levar a gestante a choque hipovolêmico.
- II - O descolamento prematuro de placenta geralmente ocorre a partir da 28<sup>a</sup> semana de gestação e é caracterizado por sangramento vermelho vivo, indolor, recorrente, progressivo, sem causa aparente e com início e cessar súbitos.
- III - A placenta prévia é caracterizada por dor abdominal de intensidade variável, hipertonia uterina e perda sangüínea de cor vermelho-escura, podendo ser interna ou externa e em quantidade variável, discordante com o quadro de choque materno.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**19.** Com relação à gestante parturiente ou puérpera portadora do vírus HIV é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o uso de AZT deve ser iniciado a partir da 14<sup>a</sup> semana, até o parto.
- (B) a ruptura das membranas amnióticas aumenta o risco de transmissão vertical.
- (C) se deve proceder ao clampeamento do cordão umbilical imediatamente após a expulsão do neonato.
- (D) se deve estimular a amamentação em livre demanda.
- (E) a via de parto a ser adotada dependerá da situação imunológica (CD4+) e virológica (Carga Viral) da gestante.

**20.** Com relação aos aspectos emocionais durante a gestação, o parto e o puerpério, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O medo do parto, o medo de não ser capaz de parir, o sentimento de solidão e o medo da morte podem ser responsáveis por reações desesperadas da gestante em trabalho de parto.
- ( ) As manifestações emocionais na gestação são decorrentes apenas das intensas alterações hormonais.
- ( ) A ambivalência afetiva é a vivência básica da gestação e só se manifesta no terceiro trimestre da gravidez.
- ( ) No segundo trimestre, a percepção dos movimentos fetais é a característica mais marcante, quando há a confirmação de gestação e a comunicação entre a mãe e o bebê se intensifica.
- ( ) A puérpera precisa adaptar-se aos novos papéis de mãe e nutriz, sendo essas mudanças tão intensas que a tornam sensível, confusa e ansiosa, especialmente nos primeiros dias do puerpério.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.



**21.** Na área obstétrica, as doenças infectocontagiosas podem causar vários comprometimentos ao binômio mãe-bebê, como, por exemplo, abortamento, morte fetal, malformação congênita, trabalho de parto prematuro e gestação ectópica. Considerando-se isso, pode-se afirmar que

- I - se deve vacinar a gestante contra rubéola.
- II - na toxoplasmose, deve-se orientar, como medida de prevenção, a ingestão de verduras bem lavadas ou cozidas e de carnes bem cozidas. As gestantes que possuírem gato em casa devem ser alertadas para que lavem as mãos após contato com o animal, não o alimentem com carnes cruas e não limpem pessoalmente o local em que ele dorme.
- III - a transmissão transplacentária da sífilis ocorre somente no 1º trimestre da gestação, e o grau de risco está relacionado com a quantidade de espiroquetas na corrente sanguínea materna.
- IV - se deve evitar o parto vaginal em parturiente que apresente herpes genital ativo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**22.** Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2000), a ruptura prematura de membranas é responsável por 1/3 dos partos pré-termos, contribuindo assim para a mortalidade perinatal. Quanto aos cuidados de enfermagem na ruptura prematura de membranas, **NÃO** é correto

- (A) verificar a temperatura corporal da mãe a cada 4 horas, enquanto está acordada.
- (B) avaliar o odor e a alteração de cor do líquido amniótico.
- (C) realizar higiene perineal após micção ou evacuação e manter forro perineal para melhor avaliação das perdas.
- (D) orientar sobre as vantagens do repouso no leito.
- (E) realizar o exame de toque quando a gestante estiver em fase latente de trabalho de parto.

**23.** Na gestação de risco, a enfermeira deve estar atenta aos sinais e sintomas das patologias, a fim de realizar as intervenções adequadas. Relacione os sinais e sintomas abaixo com o problema provável, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Hipertensão, edema e proteinúria de 24 horas maior ou igual 300 mg.
- (2) Irritabilidade, sudorese e visão turva.
- (3) Perda de líquido amniótico antes do trabalho de parto, independente da idade gestacional.
- (4) Hipertensão, proteinúria significativa e convulsão.
- (5) Pele seca, sede, pulso fraco e odor de frutas no hálito.

- ( ) hipoglicemia
- ( ) eclâmpsia
- ( ) hiperglicemia
- ( ) ruptura prematura de membranas
- ( ) pré-eclâmpsia

A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
- (B) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- (C) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.
- (E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

**24.** Logo após o nascimento do bebê, são cuidados prioritários

- (A) aquecer, pesar e identificar o bebê.
- (B) secar o bebê, realizar lavado gástrico e banhar o bebê.
- (C) desobstruir vias aéreas, secar e aquecer o bebê.
- (D) secar o bebê, desobstruir vias aéreas e aplicar vitamina K.
- (E) pesar e identificar o bebê, aplicar vitamina K.

**25.** Há cuidados de enfermagem que devem ser realizados nas primeiras horas pós-parto. Dentre os cuidados mencionados abaixo, qual **NÃO** pertence a essa categoria?

- (A) Avaliar perdas vaginais.
- (B) Avaliar o fundo uterino e a formação do globo de segurança de Pinard.
- (C) Avaliar as condições das mamas.
- (D) Avaliar as contrações de Braxton-Hicks.
- (E) Satisfazer as necessidades de alimentação e hidratação.