



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL Nº 11/2006 DE PROCESSO SELETIVO

PS 77 – ENFERMEIRO (Neonatologia)

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS e do HCPA.



FAURGS *Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 11/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 77

ENFERMEIRO (Neonatologia)

01.	E	11.	ANULADA	21.	C
02.	B	12.	ANULADA	22.	A
03.	D	13.	B	23.	D
04.	D	14.	B	24.	B
05.	C	15.	C	25.	A
06.	C	16.	A		
07.	E	17.	A		
08.	E	18.	A		
09.	E	19.	D		
10.	E	20.	ANULADA		



INSTRUÇÕES

- 01.** Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Processo Seletivo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 02.** Esta PROVA consta de **25** questões objetivas.
- 03.** Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 04.** Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul ou preta, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 05.** Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 26 serão desconsideradas.
- 06.** Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 07.** Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 08.** A duração da prova é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 09.** O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
- 10.** A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. A gastrosquise é um defeito da parede abdominal, onde intestino, estômago e cólon podem estar exteriorizados por uma abertura lateral normalmente à direita do cordão umbilical, não possuindo revestimento. No que se refere a cuidados dessa afecção cirúrgica para com o recém-nascido, considere as afirmações abaixo.

- I - Logo após o nascimento, o conteúdo que estiver exteriorizado deve ser protegido por uma bolsa de plástico transparente estéril até o momento em que o recém-nascido esteja em condições clínicas de cirurgia.
- II - É necessário manter sonda gástrica para decompressão e evitar a distensão das alças intestinais.
- III- É necessário manter o recém-nascido aquecido, pois é muito comum haver hipotermia devido à exposição do conteúdo abdominal, ocorrendo maior perda de calor por evaporação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

02. O enfermeiro precisa atualizar-se constantemente, objetivando sempre qualificar a si mesmo e a sua equipe e fundamentar-se para um cuidado diferenciado. Nos últimos anos tem sido muito utilizado o cateter venoso inserido periféricamente em neonatologia. Com relação a esse procedimento, assinale as seguintes afirmações com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O acesso venoso central por punção percutânea periférica é um procedimento simples e não leva à amputação venosa.
- () O acesso venoso central por punção percutânea periférica nos permite administrar soluções hidro-eletrolíticas e nutrição parenteral com concentração de glicose maior que 12,5%.
- () É importante a escolha do material adequado e também o treinamento da equipe quanto à execução do procedimento e à técnica de manutenção do cateter, diminuindo possíveis complicações.
- () De preferência, as vias de acesso mais utilizadas são as veias antecubitais, veia basílica e cefálica.
- () Devemos restringir os movimentos do paciente durante o procedimento a fim de facilitar a punção, sendo contra-indicada a sedação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F – F.
- (E) F – V – V – F – F.

03. A fototerapia é a terapêutica específica mais utilizada em relação à Hiperbilirrubinemia Indireta. A eficácia da fototerapia depende principalmente dos seguintes fatores: comprimento de onda da luz, irradiância e superfície corpórea do neonato exposta à luz. Considere as afirmações abaixo a respeito desse fato.

- I - O comprimento de onda da luz ideal para a absorção da bilirrubina compreende de 425 a 475 nanômetros emitidos pelas lâmpadas azuis especiais.
- II - Quanto menor a superfície corpórea exposta à luz, maior é a eficácia da fototerapia.
- III- A irradiância é inversamente proporcional à distância entre a lâmpada e o recém-nascido; portanto, quanto menor a distância entre a luz e o paciente, maior é a irradiância e a eficácia da fototerapia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

04. A crise do nascimento de uma criança prematura, necessitando de cuidados intensivos, assim como aquelas doentes e malformadas, causa um impacto emocional muito intenso e um estresse nos pais e na família. Como medidas que visam a assegurar a formação do vínculo, apego e apoio à família, podemos citar as seguintes, **EXCETO**

- (A) visita dos pais ao recém-nascido sem restrição de horário.
- (B) grupo de pais com reuniões semanais com a equipe multiprofissional.
- (C) atendimento psicológico individual e em grupo.
- (D) participação dos pais nos cuidados invasivos para com o recém-nascido.
- (E) preparação da família para a alta da unidade neonatal.

05. A oxigenoterapia é a administração de oxigênio com finalidade terapêutica. A administração suplementar de oxigênio é indicada quando houver hipoxemia e cianose.

No que se refere a esse procedimento, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A administração de oxigênio através de um capacete ou halo com o qual o paciente recebe o oxigênio umidificado e aquecido possibilita a mistura de diferentes proporções de oxigênio e ar comprimido, fornecendo concentrações de 21 a 100% de oxigênio.
- (B) Deve ser monitorada a concentração de oxigênio por meio de oxímetro, colocando o sensor próximo do paciente na altura das narinas quando este estiver com halo ou capacete.
- (C) A aspiração endotraqueal deverá ser feita de rotina, pois a sua finalidade é somente remoção de secreções.
- (D) A avaliação dos ruídos respiratórios serve como indicador da necessidade de aspiração endotraqueal e atesta a eficiência da ventilação quanto à expansibilidade e simetria pulmonar.
- (E) Manter sonda gástrica aberta em recém-nascidos sob ventilação é um cuidado primordial para descompressão gástrica.

06. A Hipertensão Pulmonar Persistente Neonatal (HPPN) é caracterizada por aumento da resistência vascular pulmonar, associada com *shunt* da direita para a esquerda através do forame oval ou canal arterial, o que causa profunda hipoxemia e insuficiência respiratória. Considere as condutas abaixo.

- I - Instalar dois aparelhos de oximetria, colocando os sensores nas regiões pré (membros inferiores) e pós-ductal (membro superior direito).
- II - Minimizar a estimulação ambiental, em razão da natureza crítica da doença e da labilidade do quadro respiratório.
- III- Administrar NO₂ e fazer análise das concentrações de NO e NO₂, através do ramo inspiratório do circuito do respirador, próximo ao conector da cânula traqueal.
- IV- Administrar analgesia e sedação, para evitar que múltiplos procedimentos dolorosos possam liberar mediadores vasoconstritores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

07. A dor sentida pelo recém-nascido (RN) significa desconforto e sofrimento, podendo ter repercussões a longo prazo, em termos de interação com a família e em termos de cognição e aprendizado. Dessa maneira, do ponto de vista médico, ético e humanitário, a dor do RN deve ser tratada; para isso, existem alternativas seguras e eficazes.

Considere as afirmações abaixo.

- I - Os opióides inibem a aferência da dor na medula espinhal e, simultaneamente, ativam as vias corticais descendentes inibitórias da dor, levando assim a analgesia.
- II - Dentre os efeitos colaterais que acompanham a analgesia e a sedação, proporcionados pelos opióides, devem-se destacar a depressão respiratória, a tolerância e a dependência física.
- III- Dentre os efeitos colaterais da morfina destacam-se a depressão respiratória, o íleo intestinal, as náuseas, os vômitos e a retenção urinária, comuns a todos os opióides.
- IV - Na UTI Neonatal, antes da prescrição do sedativo, todas as possíveis causas de agitação devem ser pesquisadas e tratadas adequadamente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

08. O processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção em crianças sofre profundas mudanças com a utilização das drogas. Considere as afirmações abaixo.

- I - A absorção da droga pela criança depende de propriedade física, uso de outras drogas e substâncias, mudanças fisiológicas e outras doenças.
- II - A capacidade de um recém-nascido (RN) metabolizar uma droga depende de seu sistema hepático. Certos mecanismos de metabolização em RN não estão desenvolvidos.
- III- O pH gástrico de um RN é neutro ou levemente ácido, tornando-se mais ácido no RN mais maduro; este fato altera a absorção da droga.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. "Estranho não é o fato de respirarmos regularmente, mas sim o fato de não respirarmos periodicamente a maioria do tempo". Esta afirmação de Haldade (1908) reflete o quão complexo é o controle respiratório. Em recém-nascido pré-termo (RNPT) esta complexidade se acentua, uma vez que diversos mecanismos de controle de respiração ainda não estão completamente desenvolvidos, o que o torna suscetível à respiração periódica e à apnéia da prematuridade.

Com relação à apnéia, considere as afirmações abaixo.

- I - As metilxantinas são até hoje os medicamentos de escolha para tratamento e prevenção da apnéia.
- II - Distúrbios metabólicos como hipoglicemia, hipotermia, hipertemia, hipomagnesemia podem ser causas de apnéia.
- III- Uso de oxímetro de pulso não detecta episódios de apnéia mas sim suas conseqüências.
- IV - Na presença de secreção em vias aéreas superiores, estas devem ser aspiradas cuidadosamente, para evitar episódios de apnéia por reflexo laríngeo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

10. A Retinopatia da Prematuridade (ROP) é uma doença ocular secundária à vascularização inadequada da retina, que ocorre em recém-nascidos pré-termo (RNPT), de muito baixo peso ao nascer.

Considere as afirmações abaixo sobre a ROP.

- I - Recomenda-se a realização de fundo de olho através de oftalmoscopia indireta, em todos os RNPTs com idade inferior a 32 semanas e/ou peso inferior a 1500g.
- II - ROP é atualmente considerada uma doença tratável e uma causa de cegueira infantil.
- III- A terapêutica com crioterapia e ablação da retina periférica por *laser* diodo proporciona boa evolução quanto à acuidade visual e aspecto do fundo de olho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. O recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP) é extremamente suscetível a eventos hipóxicos associados a doenças maternas, fetais e placentárias, exigindo, na maioria das vezes, a necessidade de reanimação imediata após o parto. Por esse motivo, essa assistência deve ser realizada por uma equipe altamente treinada nos procedimentos de reanimação.

No que se refere a assistência ao RNMBP, considere os procedimentos abaixo.

- I - A (*airways*) – manter as vias aéreas prévias através do posicionamento adequado da cabeça e do pescoço, aspiração da boca e do nariz, e, se necessário, da traquéia.
- II - B (*breathing*) – iniciar a respiração por meio de estimulação tátil e de ventilação com pressão positiva através de balão e máscara, ou balão e cânula traqueal.
- III- C (*circulation*) – manter a circulação por meio de massagem cardíaca e administração de medicamentos ou fluidos.
- IV - Secar o RNMBP e envolvê-lo em um saco de polietileno, expondo-o a calor radiante, para diminuir a perda de calor.
- V - Iniciar massagem cardíaca somente se após 30 segundos e ventilação e oxigênio a 100%, o RNMBP apresentar frequência cardíaca inferior a 60bpm ou persistir com esta frequência.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas IV e V.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

12. O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma nova visão sobre as questões que envolvem crianças e adolescentes, considerando-os prioridade absoluta.

No que se refere a direitos da criança e/ou do adolescente hospitalizados, considere os itens abaixo.

- I - Direito a não ser separada da mãe ao nascer.
- II - Direito a não sentir dor, quando existirem meios para evitá-la.
- III- Direito a receber apoio espiritual/religioso, conforme prática da instituição.
- IV - Direito ao respeito de sua integridade física, psíquica e moral.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

13. Algumas práticas de profissionais da saúde podem influenciar no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno exclusivo.

Com relação ao aleitamento materno, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A suplementação com água e/ou chás é desnecessária a crianças com menos de 6 meses que estejam sendo amamentadas.
- () Quando um bebê solicita o seio com frequência, está mostrando que sua mãe certamente está tendo pouco leite.
- () Mamadas pouco frequentes, com horários pré-estabelecidos, bem como a ausência de mamadas noturnas são indicadores de que o bebê está bem alimentado.
- () O atraso no início da amamentação, o mau posicionamento e/ou a má-pegas podem fazer com que a mama produza menos leite.
- () O efeito protetor do leite materno contra diarreia e doenças respiratórias pode diminuir substancialmente quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer outro alimento, incluindo água e chás.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V – V.

14. No que se refere a profilaxia de infecção em UTI Neonatal, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A lavagem das mãos deve ser realizada antes e após manusear o neonato, por um período de 60 segundos, com sabonete anti-séptico contendo clorexidina.
- () Deve ser utilizado material individual para cada neonato, como termômetro e estetoscópio.
- () O filtro da incubadora deve ser trocado a cada seis meses.
- () Os circuitos do respirador e dos umidificadores devem ser trocados a cada 72 horas.
- () As fraldas descartáveis sujas devem ser desprezadas em lixeira com tampa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

15. Considere as afirmações abaixo no que se refere a aspectos bioéticos da confidencialidade e privacidade.

- I - As informações fornecidas aos pacientes, quando do seu atendimento em um hospital, são de propriedade do hospital.
- II - Os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que entram em contato com as informações sobre o paciente têm autorização para acessá-las e o direito de usá-las livremente.
- III- Confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada.
- IV - A confidencialidade é uma prerrogativa dos pacientes adultos e não se aplica a todas as faixas etárias.
- V - As crianças e os adolescentes têm o direito de ter a sua imagem e identidade preservadas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas III e V.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas III, IV e V.

16. A terapia indicada para controlar Hiperbilirrubinemia Sérica Neonatal em recém-nascidos é a fototerapia. Em relação à fototerapia, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A radiância é diretamente proporcional à distância entre a luz e o recém-nascido.
- (B) A eficácia da fototerapia depende do comprimento de onda da luz, da radiância e superfície corpórea do recém-nascido exposto à luz.
- (C) A radiância deve ser medida diariamente.
- (D) A lâmpada halógena deve ser posicionada à distância de 50 cm do refletor ao colchonete.
- (E) A indicação de fototerapia depende do nível sérico da bilirrubina total, do peso ao nascer, da idade gestacional e dos fatores facilitadores da impregnação bilirrubínica.

17. A hipoglicemia neonatal é definida pela presença de glicose plasmática inferior a 40 mg/dl.

A esse respeito considere as afirmações abaixo.

- I - A administração de drogas betamiméticas na parturiente, para sedar o trabalho de parto, causa hiperinsulinismo.
- II - O hiperinsulinismo causa hipoglicemia neonatal precoce e transitória.
- III - A hipoglicemia neonatal sempre se manifesta por tremores.
- IV - O tratamento da hipoglicemia é feito por uma mini-infusão endovenosa de glicose na dose de 2mg/kg de glicose a 5%, seguida de infusão endovenosa contínua.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

18. A classificação da idade gestacional junto com a classificação através do peso são de grande importância para o atendimento adequado do recém-nascido na previsão e antecipação de problemas. Considere as afirmações abaixo no que se refere a essas classificações.

- I - Os métodos mais utilizados para avaliação da idade gestacional são *Capurro* e *New Ballard*.
- II - No método do *Capurro* utilizam-se cinco caracteres físicos (textura da pele, forma da orelha, glândula mamária, pregas plantares e formação do mamilo).
- III - Os recém-nascidos prematuros sempre são classificados como Pequeno para Idade Gestacional (PIG).
- IV - O método *Capurro* só é válido para recém-nascidos abaixo de 30 semanas e/ou peso inferior a 1500g, enquanto o *New Ballard* é válido para recém-nascidos acima de 30 semanas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

19. A passagem da vida intra-uterina para a vida extra-uterina é um dos eventos de maior risco na vida. Os ajustes fisiológicos necessários para essa transição devem ser rápidos, completando-se quase que totalmente logo após o nascimento.

Assinale a alternativa que apresenta um recurso necessário para a avaliação desta transição.

- (A) Verificação das medidas antropométricas.
- (B) Utilização de campos estéreis para envolver o recém-nascido.
- (C) Utilização de óxido nítrico para a reanimação do recém-nascido.
- (D) Utilização do Escore de Apgar.
- (E) Administração de oxigênio a 50% quando da presença de icterícia.

20. O trabalho em equipe é fundamental na admissão do recém-nascido enfermo. Priorizar os cuidados e as intervenções de enfermagem é fundamental para não colocar em risco a estabilidade do recém-nascido. Considere as condutas abaixo a respeito desse fato.

- I - Os sangramentos espontâneos devem ser prevenidos através da administração de vitamina k na dosagem de 0,1 mg intramuscular.
- II - Na profilaxia da conjuntivite gonocócica é feita a instilação de 1 gt de nitrato de prata a 1% na bolsa conjuntival nas duas primeiras horas de vida.
- III - Quando houver necessidade de reanimação do recém-nascido, a administração de oxigênio através de balão (AMBU) ligado à rede de oxigênio a 1 litro por minuto é de extrema importância.
- IV - O primeiro exame físico deve ser feito, inicialmente, em sala de parto. A avaliação do bem-estar do recém-nascido pode ser realizada através da observação da cor, atividade, postura e dificuldade respiratória.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

21. Considere as seguintes afirmações relativas ao papel do(a) enfermeiro(a) sobre a promoção do processo de formação do apego entre pais e seus recém-nascidos internados em UTI Neonatal.

- I - Incentivar a presença dos pais, flexibilizando horários de visita.
- II - Envolver os pais nos cuidados com o recém-nascido.
- III- Desestimular a visita dos avós/irmãos do recém-nascido.
- IV - Desencorajar os pais a verbalizar suas preocupações e seus sentimentos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

22. O Cuidado Canguru é um método em que o recém-nascido, após o nascimento, é colocado em contato pele-a-pele com a mãe, em posição vertical, na região torácica, entre os seios. Sobre esse método, é correto afirmar que

- (A) mantém a temperatura corporal do recém-nascido estável.
- (B) não interfere na oxigenação do recém-nascido.
- (C) diminui o período de amamentação.
- (D) impossibilita ciclos regulares de sono profundo.
- (E) possibilita que o recém-nascido adquira a flora nosocomial.

23. Com relação à Síndrome do Desconforto Respiratório Neonatal ou Doença de Membrana Hialina, assinale a afirmação correta.

- (A) Constitui doença pulmonar aguda que acomete tanto neonatos a termo quanto pré-termo, nascidos em geral de cesárea eletiva.
- (B) Constitui doença que ocorre em neonatos prematuros que foram submetidos a ventilação mecânica nos primeiros dias de vida.
- (C) É definida como desconforto respiratório presente em neonatos com líquido amniótico meconial quando do nascimento.
- (D) É causada pela deficiência de surfactante pulmonar e tem como principais sinais e sintomas taquipnéia, retrações torácicas, batimentos de asa de nariz e cianose de início precoce.
- (E) Caracteriza-se por hipoxemia grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar e *shunt* direito-esquerdo pelo forame oval e/ou canal arterial.

24. Com relação ao exame físico do recém-nascido internado em UTI, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O exame deve ser iniciado quando o recém-nascido estiver estabilizado.
- () Inicia-se o exame pela ausculta cardiopulmonar, seguida da observação do estado comportamental do recém-nascido.
- () Ainda que o recém-nascido demonstre sinais de estresse, o exame físico não deve ser interrompido.
- () O coto umbilical deve conter dois vasos (uma artéria e uma veia).
- () A avaliação do tórax e dos pulmões deve buscar verificar simetria, presença de retrações subcostais ou esternais e gemidos expiratórios.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) F – F – V – V – V.
- (E) V – V – F – V – F.

25. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, associando o tema com a respectiva definição.

- (1) diagnósticos de enfermagem
- (2) problemas colaborativos
- (3) intervenções de enfermagem
- (4) diagnósticos de enfermagem de risco

- () Constituem determinadas complicações fisiológicas que o enfermeiro monitora para detectar o surgimento dessas ou as modificações das mesmas no estado do indivíduo.
- () Constituem julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo ou de sua família aos problemas de saúde.
- () Descrevem um julgamento clínico em que um indivíduo está mais vulnerável ao desenvolvimento de um problema do que outros em situação idêntica ou similar.
- () Tratam, previnem e monitoram os diagnósticos de enfermagem; controlam e monitoram problemas colaborativos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4.
- (C) 4 – 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.