

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

ENFERMEIRO DO PSF

Nº de Inscrição

Nome do Candidato

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem a prévia autorização da FAURGS.

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2006 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

ENFERMEIRO DO PSF

01.	E	16.	A	31.	B	46.	D
02.	A	17.	C	32.	D	47.	ANULADA
03.	C	18.	A	33.	D	48.	E
04.	A	19.	D	34.	E	49.	E
05.	D	20.	B	35.	A	50.	B
06.	B	21.	E	36.	C	51.	E
07.	D	22.	B	37.	B	52.	D
08.	C	23.	B	38.	C	53.	A
09.	A	24.	E	39.	B	54.	D
10.	A	25.	D	40.	A	55.	C
11.	C	26.	D	41.	B	56.	E
12.	E	27.	A	42.	A	57.	D
13.	E	28.	C	43.	C	58.	B
14.	D	29.	D	44.	C	59.	C
15.	C	30.	E	45.	D	60.	A

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PORTO ALEGRE

INSTRUÇÕES

01. Verifique se este CADERNO DE PROVA corresponde ao **Cargo** para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
02. Esta PROVA consta de **60** questões objetivas assim distribuídas: **Saúde Coletiva** – 15 questões e **Conhecimentos Específicos** – 45 questões.
03. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
04. Para cada questão objetiva existe apenas **uma** alternativa correta, a qual deverá ser assinalada, com caneta esferográfica, de cor azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
05. Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número 61 serão desconsideradas.
06. Durante a prova, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
07. Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
08. A duração da prova é de **4 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
09. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
10. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil que, juntamente com outros países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais da doença. Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere a esta doença:

- (A) Calcula-se que, durante um ano, em uma comunidade, um indivíduo bacilífero poderá infectar, em média, de dez a quinze pessoas.
- (B) A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pelo ar, através da fala, do espirro e, principalmente, da tosse. O doente de tuberculose pulmonar bacilífero lança no ar gotículas, de tamanhos variados, contendo, no seu interior, o bacilo.
- (C) A transmissão é plena enquanto o doente com a forma clínica de tuberculose pulmonar bacilífero eliminar bacilos e não tiver iniciado o tratamento. Com o esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida, gradativamente, a níveis insignificantes ao fim de poucos dias ou semanas. As crianças com tuberculose pulmonar geralmente não são infectantes.
- (D) A Baciloscopia direta do escarro é o método prioritário, porque permite descobrir a fonte mais importante de infecção: o doente bacilífero.
- (E) O tratamento supervisionado deve ser somente para os casos de tuberculose extrapulmonar. A supervisão da ingestão dos medicamentos deve ser realizada em local de escolha do paciente (unidade de saúde, ou residência), devendo ser administrada por um profissional de saúde.

02. A leptospirose é uma zoonose de grande importância social e econômica por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perda de dias de trabalho, bem como por sua letalidade, que pode chegar a até 40% dos casos mais graves. Assinale a afirmação correta no que se refere à leptospirose:

- (A) Os animais sinantrópicos, domésticos e selvagens, são os reservatórios essenciais para a persistência dos focos da infecção. Os seres humanos são apenas hospedeiros acidentais e terminais dentro da cadeia de transmissão.
- (B) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. A penetração do microrganismo dá-se somente através da pele lesada, ou das mucosas da boca, das narinas e dos olhos.
- (C) Os animais infectados podem eliminar a leptospira através da urina somente durante algumas semanas.
- (D) O resultado negativo (não-reagente) de qualquer exame sorológico específico para a leptospirose (macroaglutinação, microaglutinação, Elisa-IgM, ou outros), com amostra sanguínea coletada antes do sétimo dia do início dos sintomas, já descarta o caso como suspeito.
- (E) A leptospirose não é uma doença de notificação compulsória no Brasil.

03. O Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) foi desenvolvido pelo DATASUS com objetivo de auxiliar no gerenciamento das informações obtidas junto às comunidades atendidas pelo Programa Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde e propiciar às equipes e aos gestores municipais o acompanhamento do trabalho e melhor planejamento das ações com base nas informações emitidas pelos relatórios produzidos. Assim, considere as afirmações abaixo sobre o SIAB:

- I - O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e são analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados.
- II - A "Ficha A" é o instrumento utilizado para o cadastramento das famílias e deve ser preenchida nas primeiras visitas que o Agente Comunitário de Saúde fizer às famílias de sua microárea, utilizando-se uma ficha por família. Todos os dados desta ficha devem ser atualizados sempre que houver alteração.
- III- É responsabilidade do município transmitir mensalmente as informações do SIAB para a Secretaria Estadual de Saúde, sendo que esta última repassa os dados para o Ministério da Saúde (MS). A não realização desta ação pelo município, durante quatro meses consecutivos, implica na suspensão do repasse do Piso da Atenção Básica Variável.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

04. A Portaria Ministerial 648, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), estabelece, dentre outras coisas, as responsabilidades de cada esfera de governo na organização e execução das ações. No que se refere a responsabilidades do gestor municipal, assinale a afirmação **INCORRETA**:

- (A) programar as ações da Atenção Básica levando em consideração as diretrizes e orientações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, independentemente das características epidemiológicas da sua população.
- (B) organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
- (C) organizar, executar e gerenciar os serviços e as ações de Atenção Básica de forma universal dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- (D) garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.
- (E) inserir, preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde.

05. Conforme a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, das afirmativas abaixo, são consideradas atividades e requisitos para o desempenho da função de Agente Comunitário de Saúde na sua área de atuação, **EXCETO**:

- (A) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade.
- (B) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
- (C) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.
- (D) residir na área da comunidade em que atuar e ter concluído obrigatoriamente o ensino médio.
- (E) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.

06. Associe a coluna que contém os atributos e as características da Atenção Primária em Saúde (APS), segundo Starfield, com sua respectiva definição conceitual:

- (1) Acesso.
- (2) Longitudinalidade.
- (3) Integralidade.
- (4) Coordenação.
- (5) Orientação Familiar.
- (6) Orientação Comunitária.

- () As equipes de atenção primária devem organizar-se de tal forma que o paciente tenha todos os serviços de saúde necessários, incluindo aqui os realizados pela própria equipe, bem como os oriundos da atenção em nível secundário ou terciário.
- () Pressupõe, por parte dos profissionais de saúde, o conhecimento dos fatores familiares relacionados à origem e ao cuidado das enfermidades.
- () Refere-se ao conhecimento, por parte dos profissionais de saúde, das necessidades da comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto com a comunidade, assim como o planejamento e a avaliação participativa nos serviços prestados.
- () Prevê que o serviço de APS esteja ciente de todos os problemas de saúde identificados nos indivíduos; para isso é necessária a disponibilidade de informações a respeito das ações realizadas entre os diferentes níveis de atenção; os profissionais de atenção primária devem ser capazes de englobar todo o cuidado que o paciente recebe.
- () é a existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua utilização ao longo do tempo; pode estar relacionada ao mesmo profissional de saúde ou ao mesmo serviço (grupo de profissionais).
- () Primeiro contato do paciente com o serviço de saúde; implica utilização dos serviços pelos pacientes, para cada problema novo ou para cada novo episódio de um mesmo problema.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 4 – 5 – 6 – 3 – 2 – 1.
- (B) 3 – 5 – 6 – 4 – 2 – 1.
- (C) 4 – 3 – 6 – 5 – 1 – 2.
- (D) 3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1.
- (E) 3 – 6 – 5 – 4 – 1 – 2.

07. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) divulgou recentemente documento de posicionamento em que difunde a idéia de que basear sistemas de saúde na Atenção Primária em Saúde (APS) é a melhor abordagem para produzir melhoras sustentáveis e equitativas na saúde das populações das Américas. Abaixo são feitas afirmações sobre os benefícios de um Sistema de Saúde baseado na APS.

- I - Países com sistemas de saúde organizados com base em forte orientação para APS têm resultados de saúde melhores e mais equitativos, são mais eficientes e alcançam melhor satisfação do usuário; porém apresentam um custo mais elevado do que aqueles cujos sistemas de saúde têm apenas uma pequena orientação à APS.
- II - Estudos de hospitalizações para "condições sensíveis de cuidados ambulatoriais" – condições tratadas em hospitais que poderiam ter sido resolvidas na atenção primária – e o uso de pronto-socorros para os cuidados de rotina mostram como os sistemas de APS, que garantem o acesso e o primeiro atendimento, podem melhorar os resultados de saúde e beneficiar outros níveis do sistema de saúde.
- III- Pessoas que têm uma fonte regular de atenção primária para a maior parte de suas necessidades de cuidados de saúde, com o tempo, ficam mais satisfeitas, aceitam melhor as orientações dos profissionais de saúde, sofrem menos hospitalizações e usam menos o pronto-socorro do que aquelas que não têm essa fonte.

Que alternativa pode ser apontada como benefício desse sistema de saúde?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

08. Com relação à composição das equipes, organização e financiamento do Programa Saúde da Família (PSF), e com base nas Portarias 648 e 650 do Ministério da Saúde, considere as afirmações abaixo:

- I - As equipes do PSF devem ser formadas por profissionais com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e compostas, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- II - O valor repassado pelo Ministério da Saúde para os municípios por cada equipe do PSF, para composição do Piso da Atenção Básica (PAB) variável, é diretamente proporcional à cobertura da Estratégia Saúde da Família no município.
- III- O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada em uma unidade de saúde, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. As alternativas abaixo referem-se a atribuições comuns a todos os profissionais que formam a equipe do Programa Saúde da Família, **EXCETO**:

- (A) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais.
- (B) realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, bem como de outros agravos e situações de importância local.
- (C) realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.
- (D) responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando esta necessitar de atenção em outros serviços do sistema de saúde.
- (E) realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e nos protocolos da gestão local.

10. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) deverão obedecer a alguns princípios, **EXCETO** à:

- (A) incapacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- (B) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (D) participação da comunidade.
- (E) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

11. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à Direção Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.
- (C) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (D) o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
- (E) participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.

12. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, marcou mudanças fundamentais e profundas no sistema de saúde vigente no Brasil até aquele momento, trazendo preceitos de um novo modelo de atenção à saúde caracterizado por:

- I - assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II - identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III- execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- IV - formulação de políticas de saúde.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

13. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) os municípios deverão atender a certas exigência(s). Considere os elementos abaixo:

- I - Fundo Municipal de Saúde.
- II - Conselho Municipal de Saúde, com composição paritária.
- III- Plano Municipal de Saúde.
- IV - Relatórios de Gestão Municipal.

Qual alternativa contém os requisitos exigidos pelo Governo Federal para a realização do repasse dos recursos do FNS?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

14. Quanto às conferências de saúde, de acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estas deverão se reunir ordinariamente. Qual deve ser a periodicidade de suas reuniões ordinárias?

- (A) A cada ano.
- (B) A cada 2 anos.
- (C) A cada 3 anos.
- (D) A cada 4 anos.
- (E) A cada 5 anos.

15. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao Conselho de Saúde, definido na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990:

- (A) tem caráter permanente, porém não deliberativo.
- (B) é composto somente por representantes do Governo, prestadores de serviço e usuários.
- (C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Não tem possibilidade de se reunir extraordinariamente.
- (E) Prescinde de ter regimento interno.

16. Conforme o Decreto nº 94.406, que regulamenta o exercício da enfermagem, ao enfermeiro incumbe privativamente, **EXCETO**:

- (A) Consulta de Enfermagem e organização de grupos.
- (B) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
- (D) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- (E) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados, bem como capacidade de tomar decisões imediatas.

17. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Art. 88, parágrafo segundo), é considerada infração grave aquela que provoca:

- (A) deformidade permanente.
- (B) dano moral irremediável em qualquer pessoa.
- (C) debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa.
- (D) perda ou inutilização de membro.
- (E) morte.

18. Qual alternativa apresenta as penalidades impostas, pelos Conselhos de Enfermagem, aos infratores do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem?

- (A) Advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício profissional.
- (B) Advertência verbal; advertência escrita; multa; suspensão do exercício profissional.
- (C) Advertência escrita; censura; multa; suspensão do exercício profissional.
- (D) Advertência verbal; multa; censura privada; censura pública.
- (E) Censura pública; advertência verbal; multa; suspensão do exercício profissional.

19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada uma das doenças às suas respectivas características:

- (1) Dengue.
- (2) Rubéola.
- (3) Sarampo.
- (4) Poliomielite.
- (5) Influenza.

() Esta doença encontra-se erradicada no país desde o início dos anos 90, em virtude do êxito da política de prevenção, vigilância e controle desenvolvida pelos três níveis do Sistema Único de Saúde. A transmissão ocorre principalmente por contato direto pessoa a pessoa, fazendo-se a transmissão pelas vias fecal-oral ou oral-oral; esta última através de gotículas de muco da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar).

() Doença febril que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo sério problema de saúde pública.

() Doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Caracteriza-se por febre alta, acima de 38°C, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik.

() Esta doença, classicamente, apresenta-se com início abrupto de febre, mialgia e tosse seca. Em geral, tem evolução auto-limitada, de poucos dias. Sua importância deve-se ao seu caráter epidêmico, caracterizado por disseminação rápida e marcada morbidade nas populações atingidas. A vacina é a melhor estratégia disponível para a prevenção desta doença e suas conseqüências.

() É uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade, acometendo principalmente crianças. A infecção é produzida por disseminação de gotículas, ou contato direto com os pacientes. A transmissão indireta, mesmo pouco freqüente, ocorre mediante contato com objetos contaminados com secreções nasofaríngeas, sangue e urina.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é:

- (A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- (B) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.
- (D) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.
- (E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

20. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à vigilância epidemiológica:

- () Dentre as funções da vigilância epidemiológica está a coleta de dados, o processamento, a análise e a interpretação dos dados.
- () A informação para a vigilância epidemiológica destina-se à tomada de decisões. A notificação, ou seja, a comunicação da ocorrência de determinadas doenças, ou de agravos à saúde, somente pode ser feita por profissionais da saúde.
- () Para que se realize a notificação de doença compulsória, deve-se aguardar a confirmação do caso.
- () Os gestores municipais e estaduais do Sistema Único de Saúde poderão incluir outras doenças e agravos no elenco de doenças de notificação compulsória, em seu âmbito de competência, de acordo com o quadro epidemiológico local.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo:

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – V.

21. Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere às hepatites virais:

- (A) As hepatites virais têm grande importância para a saúde pública e para o indivíduo devido ao número de pessoas atingidas e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas.
- (B) Os vírus das hepatites B, C e D possuem também a via de transmissão vertical (isto é, da mãe para o bebê). Geralmente, a transmissão ocorre no momento do parto, sendo incomum pela via transplacentária.
- (C) A infecção confere imunidade permanente e específica para cada tipo de vírus. A imunidade conferida pelas vacinas contra a hepatite A e a hepatite B é duradoura e específica. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os primeiros nove meses de vida.
- (D) A pessoa infectada pelo vírus C apresenta sorologia anti-HCV reagente por um período indefinido; porém este padrão não distingue se houve a resolução da infecção e, conseqüentemente, a cura, ou se a pessoa continua portadora do vírus.
- (E) O marcador Anti-HAV IgG surge na fase aguda da doença, começa a declinar após a segunda semana e desaparece após três semanas.

22. As altas taxas de mortalidade materna ainda figuram no cenário brasileiro como importante problema de saúde pública. O atendimento adequado às urgências e emergências maternas é fundamental para garantir o acesso seguro ao evento da maternidade. Em relação a este tema, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A pielonefrite aguda caracteriza-se por um quadro de hipertermia, disúria, náuseas, dor à percussão lombar, entre outros, e requer quase sempre internação hospitalar para realizar antibioticoterapia endovenosa, bem como vigilância das complicações.
- (B) O manejo da asma aguda grave na gestante é ambulatorial, visto que geralmente responde ao tratamento de ataque administrado na crise.
- (C) A eclâmpsia é geralmente precedida por cefaléia, alterações visuais, agitação psicomotora e hiperreflexia, podendo levar a complicações como, por exemplo, edema pulmonar, hemorragia cerebral e amaurose.
- (D) Na trombose venosa profunda, durante a gravidez, a conduta adequada consiste em repouso no leito, mantendo o membro afetado elevado, e tratamento com anticoagulante. Neste último caso recomenda-se a administração de heparina por via endovenosa na fase aguda e de heparina via subcutânea na fase de manutenção.
- (E) O descolamento prematuro de placenta (DPP) é a separação abrupta da placenta (normalmente implantada) antes do parto do concepto, ocorrendo em gestações de 22 semanas ou mais.

23. Analise as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere ao aleitamento.

- () A produção de leite se dá por um estímulo neuroendócrino, de modo que três órgãos são importantes neste processo: placenta, hipófise e mama.
- () O colostro é produzido por até duas semanas pós-parto e é importante na prevenção de anemia ferropriva do recém-nascido.
- () A lubrificação da região mamilo-alveolar deve ser feita com leite materno, cremes e pomadas.
- () Para evitar fissuras o importante é o bebê mamar na posição correta e para tratá-las são indicados leite materno e sol.
- () A amamentação, hoje em dia, não está contraindicada em mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou que estão em tratamento.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V – F.
- (C) F – F – V – V – F.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – V – F – F – F.

24. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os achados clínicos na gestação com a respectiva conduta de enfermagem a ser adotada.

- (1) Prevenção do Tétano neonatal.
 - (2) HBsAg negativo.
 - (3) Sorologia para toxoplasmose: Anticorpos IgM negativos.
 - (4) Hemoglobina > ou = 11g/dl.
 - (5) Rastreamento positivo para Diabetes Gestacional.
 - (6) Glicemia de jejum < 85 mg/dl na primeira consulta de Pré-natal.
 - (7) VDRL positivo.
 - (8) Hemoglobina < 11g/dl e > 8g/dl.
- () Orientar a gestante quanto aos cuidados para com alimentos de origem animal crus ou mal cozidos, entre outros.
- () Recomendar que o parceiro seja sempre testado e tratado.
- () Vacinar gestante se esta estiver na faixa etária de até 19 anos.
- () Indicar a suplementação da gestante com 60 mg/dia de ferro elementar, a partir da 20ª semana de gestação.
- () Solicitar à gestante a realização do exame de glicemia de jejum após a 20ª semana de gestação.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é:

- (A) 3 – 2 – 1 – 8 – 5.
- (B) 3 – 7 – 1 – 4 – 5.
- (C) 1 – 3 – 2 – 4 – 6.
- (D) 1 – 3 – 7 – 8 – 5.
- (E) 3 – 7 – 2 – 4 – 6.

25. Assinale a afirmação correta com relação às recomendações feitas na revisão puerperal.

- (A) Deve-se evitar a deambulação precoce devido ao risco de trombose venosa profunda.
- (B) Nos casos de parto por cesariana, aconselha-se proteger o curativo, renovando-o diariamente e mantendo-o fechado até a retirada dos pontos.
- (C) Puérperas com mastite e abscessos mamários devem ser desencorajadas para o aleitamento materno.
- (D) O DIU pode ser inserido logo após a eliminação da placenta, tanto no parto normal como na cesárea. Caso contrário, recomenda-se inseri-lo apenas na sexta semana pós-parto, independentemente do retorno da menstruação.
- (E) A mini-pílula deve ser iniciada no puerpério imediato, pois tem sua eficácia aumentada quando associada à amamentação.

26. Considere as afirmações abaixo relativas às intercorrências clínicas mais freqüentes durante o Pré-natal.

- I - A hiperêmese é a condição clínica que pode ocasionar desde a desidratação e a oligúria até a perda de peso e transtornos metabólicos, como alcalose.
- II - O aborto é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas, ou quando o concepto pesa menos de 500g. O abortamento é dito precoce, quando ocorre até a 13ª semana, e tardio quando ocorre entre a 13ª e 22ª semanas.
- III- O trabalho de parto prematuro pode ser diagnosticado pelas contrações de *Braxton-Hicks*, porém sem modificação cervical. Não constituindo, portanto, uma situação de risco gestacional.

Qual das alternativas abaixo está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

27. Primigesta, 22 anos, comparece à terceira consulta de Pré-natal com os seguintes achados: idade gestacional de 28 semanas, ganho de peso de 2,7 kg em quatro semanas, 21 cm de altura uterina, pressão arterial de 150 x 90 mmHg, edema de membros inferiores, batimentos cardíacos fetais de 144 bat/min, VDRL negativo, glicemia de 70 mg/dl, hemoglobina de 12 g/dl e proteinúria moderada.

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde à conduta de enfermagem mais adequada frente a esse quadro.

- (A) Encaminha-la ao Pré-natal de alto risco devido à presença de hipertensão, edema com proteinúria e possível restrição de crescimento intra-uterino; orientá-la ao repouso em decúbito lateral esquerdo; investigar movimentos fetais e sinais/sintomas de pré-eclâmpsia grave.
- (B) Atentar para a possibilidade de erro no cálculo da idade gestacional; investigar as causas do edema, orientando-na ao repouso com membros inferiores elevados; solicitar retorno em 15 dias para reavaliação.
- (C) Fornecer orientações alimentares para diminuir o sobrepeso, prescrevendo dieta pobre em sal para diminuir o edema; recomendar repouso e uso de meias elásticas; seguir calendário de rotina.
- (D) Solicitar ultra-sonografia para confirmação de idade gestacional; tratar anemia; recomendar dieta pobre em carboidratos; orientar ao repouso em posição supina e solicitar retorno em 30 dias.
- (E) Confirmar a idade gestacional; orientar dieta pobre em sal, bem como aumentar o aporte de alimentos ricos em ferro; repouso com membros inferiores elevados e solicitar retorno em 15 dias.

28. Considere as afirmações abaixo no que se refere à Sífilis Congênita.

- I - A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante; ou seja, quanto mais recente a infecção materna, mais treponemas estão circulantes e, portanto, mais grave e freqüente será o comprometimento fetal. Nesse caso, o risco de acometimento fetal varia de 70 a 100%, e as manifestações clínicas podem variar do abortamento precoce ao natimorto, ou do nascimento de crianças assintomáticas (o mais comum), aos quadros sintomáticos extremamente graves e potencialmente fatais.
- II - A realização do teste (VDRL) no início do terceiro trimestre permite que o tratamento materno seja instituído e finalizado até 30 dias antes do parto, intervalo mínimo necessário para que o recém-nascido seja considerado tratado intra-útero.
- III - O diagnóstico clínico, na fase primária, é dado por erupções cutâneas generalizadas, queda de cabelo e placas na região vulvar e perineal; na fase secundária, é dado pela identificação do cancro duro; e na fase terciária, a lesão característica é a goma sífilítica, que pode ocorrer em pele, ossos, cérebro, entre outros.
- IV - As gestantes tratadas não requerem um seguimento sorológico, pois a ausência de sintomas é indicativa de cura.

Qual alternativa abaixo está **INCORRETA**?

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

29. Em um posto de atuação de uma equipe do Programa da Saúde da Família (PSF), a enfermeira solicita a uma técnica de enfermagem que, junto com a auxiliar da limpeza, realize a desinfecção de uma das salas de atendimento do posto. Entende-se por desinfecção o processo de destruição de microorganismos como bactérias na forma vegetativa (não esporulada), fungos, vírus e protozoários. Qual das alternativas abaixo indica o que as funcionárias devem saber quanto à divisão da tarefa de desinfecção para realizar a tarefa?

- (A) Baixa, Média e Alta Complexidade.
(B) Primária, Secundária e Terciária.
(C) Primeira, Segunda e Terceira Fase.
(D) Baixo, Médio e Alto Nível.
(E) Primeira, Segunda e Terceira Etapa.

30. Durante o turno de trabalho, o enfermeiro de uma unidade de PSF é comunicado por um dos técnicos de sua equipe que um dos funcionários feriu sua mão esquerda, ao realizar o procedimento de hemogluco-teste (HGT) em um paciente, durante a punção. Qual das alternativas abaixo está **INCORRETA** no que se refere às condutas a serem tomadas pelo enfermeiro do PSF frente ao fato ocorrido?

- (A) Orientar o funcionário para que lave abundantemente o ferimento ou mucosa, estimulando o sangramento.
(B) Procurar identificar o paciente-fonte (nome, US).
(C) Fazer a Notificação de Acidente do Trabalho (NAT) em duas vias.
(D) Encaminhar o funcionário ao setor de referência conforme a localização da unidade (HPS/Bom Jesus/PACS), levando a amostra do sangue do paciente-fonte rotulada, bem como a folha de consentimento do paciente-fonte e NAT.
(E) Orientar o funcionário que sofreu o acidente de trabalho a ir ao NAST/SMS entre 48 horas a 7 dias, levando consigo a NAT, o termo de consentimento do paciente-fonte, o termo de consentimento do acidentado e a 2ª via do boletim de atendimento.

31. De acordo com Duncan (2005), o Transtorno do Pânico é caracterizado pela ocorrência de ataques espontâneos e inesperados de ansiedade, medo ou terror intenso, associados à sensação de morte iminente ou perda de controle. Em suas atividades diárias, o enfermeiro de PSF deve estar atento aos pacientes que apresentem os referidos sintomas, para fazer os encaminhamentos necessários. Assinale a alternativa abaixo que corresponde à faixa da população a qual esse tipo de transtorno está mais associado:

- (A) homens idosos e diabéticos.
(B) mulheres entre a terceira e a quarta década de vida.
(C) crianças deprimidas.
(D) adolescentes hiperativos.
(E) adultos que trabalham em cargos de chefia.

32. A exposição ao ruído pode causar aos trabalhadores outras enfermidades além daquelas relacionadas aos transtornos auditivos. Nas consultas de enfermagem, a enfermeira de PSF precisa investigar, junto aos pacientes, a presença de alguns problemas comumente relacionados aos transtornos não-auditivos. Considere os itens abaixo:

- I - hipertensão arterial.
- II - estresse.
- III- efeito sobre o sistema vegetativo.
- IV- alteração do sistema hematopoiético.

Qual das alternativas corresponde à enfermidade não-auditiva que **NÃO** é provocada pela exposição ao ruído?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas IV.
- (E) I, II, III e IV.

33. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), no que se refere a cuidados para com a criança:

- () O acompanhamento da criança, ao longo do tempo, por meio de medições seriadas, que estabeleçam uma curva do ganho ponderal e de altura, é mais útil do que a comparação de uma única medida com a referência.
- () Segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendável a realização da antropometria, mensalmente, nos três primeiros meses de vida da criança e, a partir daí, de dois em dois meses.
- () A frequência das medições pode ser bimestral no segundo ano de vida e, a partir daí, semestral, coincidindo preferencialmente com o calendário vacinal.
- () Frente a uma criança em risco nutricional, deve-se identificar quais são os fatores a ele associados ou desencadeantes desse quadro.
- () Uma criança pode ser considerada em risco nutricional, quando não ganhar peso em três medidas sucessivas, ou quando a curva de crescimento for descendente, cruzando as linhas de percentis mais de uma vez.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) F – V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) V – F – F – F – V.

34. Os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar situações que coloquem a criança em maior risco para deficiências e incapacidades. Nessa perspectiva, considere as seguintes situações:

- I - Antecedentes gestacionais: desnutrição materna, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) grave, diabetes melito (DM), entre outras.
- II - Discriminação social: crianças indesejadas, consideradas feias, agressivas, tímidas ou, ainda, apresentando malformações ou doenças estigmatizadas socialmente.
- III- Situações do ambiente físico: renda familiar baixa, más condições de moradia ou desorganização do ambiente físico familiar, abuso ou negligência para com a criança, entre outros.
- IV- Condições perinatais: prematuridade, peso ao nascimento muito baixo para a idade gestacional, asfíxia neonatal, entre outras.

Assinale a alternativa correta no que se refere à(s) situação(ões) de risco que devem ser consideradas pelo profissional de saúde:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

35. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à vacinação:

- () A vacina contra pneumococos, aplicada no idoso, necessita de reforço cinco anos após a dose inicial.
- () Quando o adolescente apresentar vacinação incompleta, mas não tiver como comprová-la (através da carteira de vacinação), devemos completar o esquema já iniciado.
- () O primeiro reforço da vacina tríplice bacteriana deve ser feito aos 15 meses de vida.
- () Em caso de ferimentos graves, a adolescente gestante deve reiniciar o esquema da vacina contra a difteria e o tétano, mesmo que sua última dose tenha sido há mais de cinco anos.
- () A vacina dupla viral e/ou tríplice viral deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior, e em homens de até 39 anos.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

36. Assinale a afirmação **INCORRETA** com relação às normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI):

- (A) Para efeito de contratação trabalhista, as instituições públicas e privadas deverão exigir a apresentação do comprovante de vacinação atualizado de acordo com o calendário e a faixa etária estabelecidos.
- (B) O comprovante de vacinação é obrigatório para efeito de matrícula em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade.
- (C) As vacinas e os períodos de vacinação estabelecidos pelo PNI não são de caráter obrigatório no território nacional.
- (D) O atestado de vacinação poderá ser fornecido por clínicas privadas de vacinação que tenham estabelecimento licenciado.
- (E) Para efeito de pagamento do salário-família, será exigida do assegurado a apresentação dos atestados de vacinação.

37. Assinale a alternativa **INCORRETA** no que se refere às orientações mais adequadas quanto aos cuidados para com o recém-nascido:

- (A) Limpeza da cicatriz umbilical com água e sabão, por ocasião do banho, removendo crostas e secreções, o que diminuirá a população de bactérias no local.
- (B) No caso de refluxo gastroesofágico, recomenda-se manter a criança em posição vertical após alimentação, bem como interromper o aleitamento materno e, conforme orientação médica, substituí-lo por fórmulas lácteas mais espessas.
- (C) A monilíase oral pode ser prevenida com a limpeza de mameadeiras ou chupetas.
- (D) Em caso de dermatite de fraldas por irritação, deixar a criança sem fraldas por algumas horas, inclusive à noite. Lavar as fraldas com sabão neutro, enxaguá-las em abundância e não utilizar amaciantes.
- (E) Com relação às fezes da criança recém-nascida, deve-se acalmar a mãe, explicando-lhe que as fezes de cor verde-escura, quase negras e sem cheiro, tornam-se, mais tarde, amareladas ou esverdeadas e são normais nos primeiros dias de vida.

38. O Programa PRÁ-NENÊ tem como características essenciais a ação em territórios delimitados, a intersetorialidade e o planejamento de ações por problemas de saúde identificados. O programa visa a prestar atenção integral a todas as crianças no primeiro ano de vida e identificar os recém-nascidos de alto risco, dedicando-lhes atenção diferenciada.

Os critérios abaixo são utilizados para a caracterização do alto risco, **EXCETO**:

- (A) idade materna < 18 anos; pré-natal < 6 consultas; gestação múltipla; mãe analfabeta; apgar 5º minuto < 5.
- (B) mãe analfabeta; peso da criança < 2.500 g ao nascer; idade materna < 18 anos; pré-natal < 6 consultas; prematuridade < 37 semanas.
- (C) apgar 5º minuto > 5; gestação múltipla; pré-natal < 6 consultas; idade materna < 18 anos; mãe analfabeta.
- (D) presença de malformação congênita; mãe analfabeta; peso < 2.500 g ao nascer; pré-natal < 6 consultas; *apgar* 5º minuto < 5.
- (E) gestação múltipla; presença de malformação congênita; prematuridade < 37 semanas; mãe analfabeta.

39. A prevalência da obesidade em crianças vem crescendo nos países em desenvolvimento e tem sido atribuída a fatores ambientais e socioculturais, tais como o sedentarismo e o incentivo a uma dieta pouco saudável, com alta proporção de gorduras.

No que se refere a esse perfil, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () O risco de a obesidade na infância continuar na vida adulta é baixo, pois não é comum que a obesidade adquirida neste período de vida persista.
- () Aproximadamente dois terços dos adultos obesos foram crianças obesas e, quando a obesidade é grave, essa proporção aumenta para 85%.
- () Crianças com ou sem excesso de peso, filhas de pais obesos, têm risco duas vezes maior de apresentarem obesidade quando adultos.
- () A mudança de hábito alimentar deve englobar fundamentalmente, mudança de valores familiares e aquisição de conhecimentos através da educação, e o envolvimento da família.
- () A criança obesa apresenta risco maior de hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diminuição de hormônio do crescimento, distúrbios respiratórios e problemas ortopédicos.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – V – V.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – V – F – F – F.
- (E) V – V – V – F – F.

40. Considere as afirmações abaixo no que se refere aos anticoncepcionais disponíveis atualmente:

I - Nenhum deles é inócuo.

II - As pílulas combinadas atuam basicamente através da inibição da ovulação, além de provocarem alterações nas características físico-químicas do endométrio, porém não alteram o muco cervical.

III- Após a aplicação intramuscular profunda do Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml, o local deve ser massageado para aumentar a absorção da droga.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

41. Assinale a alternativa correta em relação à anticoncepção de emergência:

- (A) Quando corretamente usada, previne a gestação que, de outra forma, ocorreria em aproximadamente metade dos casos.
- (B) Caso ocorra gestação, a anticoncepção de emergência não provocará qualquer efeito adverso para o feto.
- (C) Pode interromper uma gestação em andamento.
- (D) A menstruação retorna normalmente dois meses após a ingestão do anticoncepcional.
- (E) Os efeitos secundários mais comuns, quando do seu uso, são: náuseas, vômitos, cefaléia e galactorréia.

42. Assinale nas afirmações abaixo, **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere aos resultados dos exames citopatológicos e à conduta a ser seguida:

- () Nas atipias escamosas de significado indeterminado que atingem de 3,5 a 5% do total de exames realizados, é aconselhável a repetição das citologias com intervalo de seis meses.
- () Nos casos de atrofia com inflamação, após a avaliação da sintomatologia e do exame ginecológico, podem ser usados cremes com estrogênio e seguir a rotina de rastreamento citológico.
- () Em citologias sugestivas de adenocarcinoma *in situ*/invasor, a paciente deverá ser encaminhada à unidade de referência secundária de média complexidade para realização de colposcopia imediata e acompanhamento.
- () Casos de lesão intra-epitelial de baixo grau devem ser encaminhados para a realização de colposcopia e acompanhamento na unidade secundária de média complexidade.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – F – F.

43. A periodicidade da realização do exame preventivo de rotina do colo do útero, estabelecida pelo Ministério da Saúde para mulheres na faixa etária de 25 a 60 anos, é:

- (A) anual.
- (B) a cada dois anos, após dois exames anuais consecutivos e negativos.
- (C) a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos e negativos.
- (D) semestral, após os 55 anos.
- (E) semestral, após os 60 anos.

44. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao câncer do colo do útero:

- I - A exposição às doenças sexualmente transmissíveis não tem qualquer relação com a ocorrência de câncer do colo uterino.
- II - A ocorrência de câncer do colo do útero em familiares de primeiro grau é o principal fator de risco para o surgimento da doença.
- III- O uso prolongado de anticoncepcionais orais aumenta o risco de surgimento da doença.

Qual é a alternativa correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

45. O Linfedema é a principal complicação decorrente do tratamento cirúrgico para o câncer de mama. As alternativas abaixo correspondem a orientações adequadas a pacientes após linfadenectomia axilar, **EXCETO**:

- (A) promover intervalos para descanso durante a execução de atividades.
- (B) evitar receber medicações por via subcutânea, intramuscular e endovenosa, além de evitar coleta de sangue no braço homolateral à cirurgia.
- (C) usar malha compressiva nas viagens aéreas.
- (D) utilizar calor local no braço afetado para melhorar a circulação.
- (E) utilizar creme depilatório para remover os pêlos da axila.

46. Considerando as orientações do Ministério da Saúde sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, assinale a afirmação **INCORRETA**:

- (A) pode ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente.
- (B) na população mundial, a sobrevivência média, cinco anos após o diagnóstico, é de 61%.
- (C) as metástases se desenvolvem mais comumente nos ossos, no pulmão e no fígado.
- (D) a idade da menarca e a idade da primeira gestação não têm qualquer relação com a ocorrência do câncer de mama.
- (E) a mamografia para rastreamento de câncer de mama em mulheres assintomáticas é indicada entre os 50 e 59 anos, com intervalo máximo de dois anos entre os exames.

47. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

- () Os tipos de Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico, quando associados a outros cofatores, têm relação com o desenvolvimento das neoplasias intra-epiteliais e do câncer invasor do colo do útero, da vulva, da vagina e da região anal.
- () Considerando as formas de transmissão sanguínea e sexual do HIV e de outras DSTs, foi definida uma política específica sobre insumos de prevenção: além do preservativo masculino e feminino, são considerados insumos de prevenção o gel lubrificante e o *kit* de redução de danos.
- () A tricomoníase e a candidíase são DSTs, enquanto a vaginose é uma infecção endógena.
- () A anamnese e o exame físico do(a) paciente constituem os principais elementos diagnósticos das DSTs, mesmo quando disponíveis os recursos de laboratório.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – V – V.

48. Considere as afirmações abaixo, referentes à transmissão da Hepatite B e Hepatite C.

- I - Pacientes com história prévia de infecção pelo vírus das Hepatites B e C podem experimentar reativação viral durante o curso da infecção crônica pelo HIV.
- II - Apesar do risco de transmissão por via sexual da Hepatite C ser bem menor do que o da Hepatite B, pessoas com múltiplos parceiros e com prática sexual de risco apresentam maior chance de infecção, por isso sempre devem ser pesquisadas no mesmo momento.
- III- A transmissão do vírus da Hepatite C, através do aleitamento materno, não está comprovada. Dessa forma, a amamentação não está contra indicada, quando a mãe é infectada pelo vírus da Hepatite C, desde que não existam fissuras no mamilo que propiciem a passagem do sangue.
- IV - Apesar do vírus da Hepatite B poder ser encontrado no leite materno, o aleitamento em crianças filhas de mães portadoras do vírus B está indicado logo após a aplicação da primeira dose do esquema vacinal e da imunoglobulina humana hiperimune.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

49. A transmissão sexual é a principal forma de contrair o vírus HIV no Brasil e no Mundo, sendo a transmissão heterossexual considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como a mais freqüente, do ponto de vista global.

Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere ao vírus HIV:

- (A) Alta viremia, relação anal receptiva, relação sexual durante a menstruação e presença de outra DST constituem fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV numa relação heterossexual.
- (B) Estudos demonstram que o uso do preservativo masculino pode reduzir o risco de transmissão do HIV e de outras DSTs em até 95%.
- (C) A transmissão por meio de transfusão de sangue e derivados tem apresentado importância decrescente nos países industrializados e naqueles que adotaram medidas de controle de qualidade do sangue utilizado, como é o caso do Brasil.
- (D) Embora o HIV tenha sido isolado de vários fluidos corporais que contenham células inflamatórias, somente o contato com sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno contaminados têm sido considerados fontes de infecção desse vírus.
- (E) O tempo decorrido para que a sorologia anti-HIV torne-se positiva é de quatro a dez semanas após a aquisição do vírus. Os testes utilizados apresentam, geralmente, níveis de até 95% de soroconversão nos primeiros seis meses após a transmissão.

50. São muito amplas as possibilidades de ação, no âmbito dos serviços de Atenção Básica, no que se refere ao manejo das DSTs, HIV/aids, Hepatites e HTLV.

Com base na afirmação acima, entende-se que as ações em Atenção Básica devem incluir, **EXCETO**:

- (A) aconselhamento para os testes diagnósticos e para a adesão à terapia instituída, e às recomendações de assistência.
- (B) encaminhamento dos casos que não competem a esse nível de atenção, evitando o acompanhamento conjunto a fim de disponibilizar maior tempo aos novos casos.
- (C) diagnóstico precoce das DSTs, infecção pelo HIV, Hepatites e HTLV.
- (D) tratamento adequado da grande maioria das DSTs.
- (E) manejo adequado dos indivíduos em uso indevido de drogas.

51. As alternativas abaixo apresentam atribuições do Enfermeiro em relação às atividades de controle da tuberculose na rede básica, e no Programa Saúde da Família, **EXCETO**:

- (A) solicitar baciloscopia dos sintomáticos respiratórios para diagnóstico.
- (B) realizar consulta de enfermagem mensal.
- (C) encaminhar o doente para uma unidade de referência quando necessário.
- (D) identificar os sintomáticos respiratórios entre as pessoas que procuram as unidades básicas de saúde, através das visitas domiciliares, ou mediante os relatos dos Agentes Comunitários da Saúde (ACSs).
- (E) solicitar raio X de tórax segundo critérios definidos no protocolo.

52. Considere as afirmações abaixo no que se refere à preservação das informações acerca do paciente:

- I - O prontuário é de propriedade do paciente. Ele tem direito de usar as informações nele contidas livremente, salvo se menor de idade, ou declarado como incapaz.
- II - Quando o paciente se negar a comunicar o seu diagnóstico aos seus parceiros sexuais, ou aos usuários de drogas injetáveis que com ele compartilhem seringas, o profissional não estará autorizado a revelar esta informação.
- III - Podem existir exceções quanto à preservação de informações que devem ser mantidas em segredo, tais como: ferimento por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver a suspeita de que esta lesão tenha sido resultante de um ato criminoso.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

53. O Diabetes melito (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. As conseqüências humanas, sociais e econômicas são devastadoras: são 4 milhões de mortes por ano relativas ao Diabetes e às suas complicações. O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de saúde, como conseqüência dos crescentes custos do tratamento da doença e, sobretudo, das complicações. Entretanto o maior custo recai sobre os portadores, suas famílias, amigos e sobre a comunidade: o impacto na redução de expectativa e qualidade de vida.

Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere ao DM:

- (A) O Diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira, surdez, neuropatias e doenças cardiovasculares.
- (B) É imperativo que os governos orientem seus sistemas de saúde para lidar com os problemas educativos, comportamentais, nutricionais e de assistência que estão impulsionando a epidemia do Diabetes, sobretudo no sentido de reduzir a iniquidade de acesso a serviços de qualidade.
- (C) Além dos custos financeiros, o Diabetes acarreta também outros custos associados à dor, ansiedade, inconveniência e a uma menor qualidade de vida que acaba afetando os doentes e suas famílias.
- (D) O Ministério da Saúde implementa diversas estratégias de saúde pública, economicamente eficazes, para prevenir o Diabetes e suas complicações por meio do cuidado integral a esse agravo de forma resolutiva e com qualidade.
- (E) É importante observar que já existem informações e evidências científicas suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento do Diabetes e de suas complicações, e que as pessoas e comunidades progressivamente têm acesso a esses cuidados.

54. Com relação à insulina, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () Deve-se evitar expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação.
- () Os frascos de insulina podem ser congelados a uma temperatura de até -3°C.
- () A cor da insulina pode apresentar-se levemente turva, devendo apenas ser levemente agitada antes de sua aplicação.
- () As insulinas devem ser armazenadas em geladeiras, seja na porta, ou na parte inferior.
- () O transporte dos frascos deve ser realizado com isolamento térmico e gelo seco.
- () A insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C) por até um mês.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F – V – F.
- (B) V – F – F – F – V – F.
- (C) V – F – F – V – V – V.
- (D) V – F – F – V – F – V.
- (E) F – V – V – F – F – F.

55. A equipe de Saúde da Família deve atuar, de forma integrada e com níveis de competência bem estabelecidos, na abordagem da avaliação de risco cardiovascular, na adoção de medidas preventivas primárias e no atendimento à Hipertensão arterial e à DM.

Considere as afirmações abaixo no que se refere a atribuições e competências do enfermeiro do PSF:

- I - Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários, bem como supervisionar, de forma permanente, suas atividades.
- II - Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão ao tratamento – grupos com dislipidemia, tabagistas, obesos, hipertensos e diabéticos.
- III- Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe.
- IV- Repetir medicações de indivíduos controlados e sem intercorrências.
- V - Encaminhar à unidade de referência secundária, uma vez ao ano, todos os diabéticos, para rastreamento de complicações crônicas quando da impossibilidade de realizá-lo na unidade básica.

Qual alternativa está correta?

- (A) Apenas I, II e V.
- (B) Apenas I, II, III e V.
- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas II, III e V.
- (E) Apenas III, IV e V.

56. Há consenso sobre a importância da adoção de estratégias de atenção integral, cada vez mais precoces, ao longo do ciclo de vida, focadas na prevenção do aparecimento de Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e DM e de suas complicações. Estão bem estabelecidas as ações de saúde que devem ser implementadas para um efetivo controle desses fatores de risco visando a prevenção da doença e de seus agravos.

Assinale a afirmação **INCORRETA** no que se refere a intervenções preventivas:

- (A) Em indivíduos acima do peso ideal, a redução de peso reduz o risco cardiovascular e a incidência de DM; além disso, o tratamento da obesidade a curto e médio prazo reduz os níveis de glicemia e pressão arterial e melhora o perfil lipídico.
- (B) A ingestão, de leve a moderada, de bebidas alcoólicas, equivalente a duas doses para homens e a uma dose para mulheres, pode estar associada com uma menor incidência de doença cardiovascular.
- (C) A recomendação da atividade física como ferramenta de promoção de saúde e prevenção de doenças baseia-se em parâmetros de frequência, duração, intensidade e modo de realização.
- (D) O simples aconselhamento para que o indivíduo pare de fumar possui benefício comprovado para efetivo abandono do tabagismo.
- (E) A dieta ideal para prevenção da Hipertensão caracteriza-se por ser pobre em sódio e potássio, com grande quantidade de frutas, legumes, verduras e produtos lácteos.

57. Considere os procedimentos abaixo no que se refere a orientações educativas básicas para cuidados do pé diabético:

- I - Examinar os pés diariamente e, se necessário, pedir ajuda à família ou usar espelhos.
- II - Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou tecido, sem meias.
- III- Andar descalço somente em casa.
- IV- Cortar as unhas de forma arredondada, para que não encravem.
- V - Lavar os pés diariamente com água morna e sabão neutro, secá-los bem e usar um creme hidratante a base de lanolina, vaselina líquida ou glicerina.

Qual a alternativa correta?

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas I e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

58. Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) no que se refere à Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso:

- () O idoso tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à diversão, a espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade.
- () Aos maiores de 60 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais.
- () Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.
- () Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

59. Parada cardiorrespiratória é a cessação da circulação sistêmica e/ou da respiração devido à falta de atividade mecânica cardíaca eficiente e/ou de comando do sistema nervoso central. Qualquer cidadão ou profissional de saúde diante de uma situação de possível parada cardiorrespiratória deve seguir certos procedimentos em determinada seqüência. Considere os procedimentos abaixo, distribuídos em uma seqüência aleatória:

- 1 - Verificar a ventilação: colocar o rosto próximo ao nariz e à boca da vítima para tentar sentir e ouvir a respiração, observando, ao mesmo tempo, se o tórax se move.
- 2 - Confirmar a inconsciência: o socorrista deve colocar-se ao lado da vítima e sacudi-la pelos ombros para constatar reação.
- 3 - Chamar socorro: pedir às pessoas próximas para que ativem um sistema de emergência avançado.
- 4 - Posicionar a vítima: deitar o paciente sobre uma superfície plana e dura, mantendo a cabeça nivelada com o tórax.
- 5 - Abrir a via aérea: na maioria dos indivíduos inconscientes o relaxamento da língua obstrui a via aérea.

Segundo Duncan (2004), qual das alternativas corresponde à seqüência correta de atendimento quando da ocorrência de parada cardiorrespiratória?

- (A) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (B) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- (C) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- (D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (E) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.

60. Marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () É recomendado que todo paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica atinja controle dos níveis pressóricos de <140/90 mmHg, e de que estes sejam inferiores a 130/80 mmHg naqueles com Diabetes melito e doença renal crônica.
- () Em indivíduos com risco cardiovascular moderado e alto, é recomendado o uso de aspirina profilática (100 mg/dia) após controle ideal ou próximo do alvo da pressão arterial (<140/90 mmHg).
- () A cetoacidose em evolução – com presença de sintomas de sudorese, palpitações, tremores, sensação desagradável de apreensão, confusão e fraqueza – requer tratamento imediato no local de atendimento usual ou em serviço de emergência.
- () Caso a glicemia de jejum esteja muito alta (acima de 170 mg/dl) e/ou constata-se presença de infecção, provavelmente o paciente necessitará de um tratamento com insulina, podendo ser por curto período de tempo até atingir níveis de glicemia que possam ser controlados com hipoglicemiantes orais ou com o tratamento definitivo.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – F – F – V.