

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2015 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 47

MÉDICO I (Medicina de Família e Comunidade)

01.	B	11.	A	21.	D
02.	D	12.	C	22.	C
03.	B	13.	B	23.	E
04.	D	14.	C	24.	D
05.	B	15.	ANULADA	25.	A
06.	C	16.	A		
07.	C	17.	E		
08.	B	18.	A		
09.	D	19.	C		
10.	D	20.	B		



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 05/2015 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 47 - MÉDICO I (Medicina de Família e Comunidade)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. De acordo com a história natural das doenças, o médico de atenção primária pode intervir em diversas fases de evolução do processo patológico.

Em relação aos tipos de prevenção clínica, relacione a primeira coluna com a segunda, associando os tipos de prevenção aos respectivos procedimentos.

- (1) Prevenção primária
 (2) Prevenção secundária
 (3) Prevenção terciária
 (4) Prevenção quaternária
- () Coleta para citopatológico de colo uterino.
 () Imunização contra sarampo, caxumba e rubéola.
 () Desprescrição de estatinas em pacientes com risco cardiovascular <10%.
 () Aplicação de laser em paciente com retinopatia diabética.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
 (B) 2 – 1 – 4 – 3.
 (C) 3 – 4 – 1 – 2.
 (D) 4 – 1 – 3 – 2.
 (E) 1 – 2 – 4 – 3.

02. Quanto às circunstâncias que justificam o rastreamento populacional de determinada doença ou condição, considere as características abaixo.

- I - Ser rara.
 II - Ter uma fase pré-clínica conhecida e tratamento efetivo disponível.
 III- Poder ser identificada em fase precoce pelo teste de rastreamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
 (B) Apenas III.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

03. Porto Alegre (RS) é uma das capitais com maior incidência de tuberculose (TB) em nosso país. Para tentar reverter esta situação, além da identificação dos sintomas respiratórios e do tratamento precoce e diretamente observado dos pacientes, é fundamental a investigação dos seus contatos.

Em relação ao exame de contatos, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) independentemente da forma clínica na qual o paciente apresente TB, todos os seus contatos devem ser examinados.
 (B) crianças maiores de cinco anos e portadores de HIV/Aids são as populações mais vulneráveis.
 (C) a visita domiciliar realizada pela equipe de Saúde da Família pode auxiliar na busca ativa dos contatos.
 (D) para contatos com sintomas respiratórios, deve-se seguir investigação de doença ativa.
 (E) para crianças menores de 10 anos, além da prova tuberculínica, deve-se solicitar uma radiografia de tórax.

04. Considere o quadro abaixo.

Na cidade em que você trabalha, diversas vezes há desabastecimento de medicamentos essenciais, falta de material para pequenos procedimentos cirúrgicos, assim como DIU e outros métodos contraceptivos. Além disso, sua unidade de Saúde da Família possui uma população adscrita de aproximadamente seis mil pessoas, o que frequentemente tem ocasionado reclamações e tumultos no agendamento de consultas.

Quais atributos da Atenção Primária à Saúde provavelmente apresentam pior avaliação por parte dos usuários?

- (A) Acesso e longitudinalidade.
 (B) Acesso e competência cultural.
 (C) Integralidade e orientação comunitária.
 (D) Acesso e integralidade.
 (E) Coordenação e integralidade.

05. Quanto ao sangramento uterino anormal, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Sua caracterização é estabelecida a partir do relato de modificação do ciclo menstrual.
 (B) Dosagens de hormônios sexuais são sempre indicadas para sua investigação.
 (C) Na suspeita de alguma anormalidade estrutural, uma ultrassonografia deve ser solicitada.
 (D) O tratamento clínico deve ser considerado quando não há suspeita de anormalidade estrutural ou histológica ou quando há miomas menores de 3cm, que não causam distorção da cavidade uterina.
 (E) Dentre as opções de tratamento clínico, estão: DIU com levonorgestrel, anti-inflamatórios não esteroides e anticoncepcionais orais combinados.

- 06.** Conforme a figura abaixo, uma criança de quatro anos de idade apresenta lesões pruriginosas, lineares e tortuosas, nas nádegas, com aspecto serpiginoso. Essas lesões vêm aumentando cerca de 1cm por dia.



Qual tratamento é indicado para este caso?

- (A) Benzoato de benzila.
- (B) Permanganato de potássio.
- (C) Tiabendazol.
- (D) Tioconazol.
- (E) Dexclorfeniramina.

- 07.** Na consulta de puericultura, pais mostram-se bastante ansiosos em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor de seu filho, que completou 16 semanas de vida. Eles têm dúvidas relacionadas aos marcos de desenvolvimento e comportamento para essa idade.

Considere os itens abaixo.

- I - Rolar sem auxílio e reconhecer pessoas.
- II - Sentar sem apoio e apanhar objetos.
- III- Juntar as mãos e rotina diurna.

Quais se constituem marcos de desenvolvimento e comportamento para um bebê com 16 semanas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

- 08.** Considerando que as grandes modificações da sociedade propiciaram o surgimento de formatos diferentes de famílias, assinale a afirmação correta no que se refere à estrutura familiar.

- (A) Em famílias monoparentais, isto é, nas quais existe um único filho e um só membro do casal (a mãe ou o pai), há risco de isolamento da família.
- (B) Nas famílias reconstituídas, aquelas formadas por adultos que já tiveram um casamento anterior, com filhos, é comum que todos os seus membros tenham sofrido perdas.
- (C) Famílias estendidas são formadas pela reunião de cônjuges que já tiveram vários casamentos anteriores, com filhos.
- (D) Nas famílias estendidas, quando a avó tem responsabilidades parentais, é importante que o médico restaure o poder dos pais.
- (E) Em famílias reconstituídas, é importante que as crianças vivam na casa que oferece uma estrutura familiar mais saudável, evitando-se, ao máximo, o contato com membros disfuncionais.

09. Sobre a declaração de óbito, é correto afirmar que

- (A) as estatísticas de mortalidade são produzidas com base na chamada causa básica atribuída na primeira linha do atestado de óbito.
- (B) óbitos fetais não necessitam de declaração de óbito.
- (C) cabe ao médico não perito sempre fornecer apenas o atestado de óbito nos casos de morte violenta.
- (D) o código CID (Classificação Internacional de Doenças) não deve ser colocado ao lado da descrição da causa básica.
- (E) o atestado deve ser dado pelo cartório de registro de óbitos nos casos de morte natural em que o óbito ocorreu sem assistência médica.

10. Sobre o tratamento de transtornos de ansiedade, é correto afirmar que

- (A) o uso de inibidores da recaptção de serotonina, associado à terapia cognitivo-comportamental, apresenta melhor resultado em relação ao tratamento psicoterapêutico isolado somente nos casos de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).
- (B) não há evidências que justifiquem o uso de benzodiazepínicos nos casos de ataques de pânico.
- (C) os antidepressivos tricíclicos são superiores aos inibidores da recaptção de serotonina nos casos de transtorno do pânico com agorafobia.
- (D) clomipramina é um fármaco de segunda linha no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).
- (E) não se deve associar medicamentos antidepressivos de classes diferentes no tratamento dos casos refratários, pois há um aumento de efeitos colaterais sem melhora da eficácia.

11. As afirmações abaixo estão corretas em relação aos fármacos antidepressivos, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) A disfunção sexual é mais comum durante o uso de bupropiona do que venlafaxina.
- (B) Na distímia, há evidências de efeito benéfico no uso de inibidores da recaptção de serotonina e antidepressivos tricíclicos.
- (C) Na depressão leve, a eficácia dos antidepressivos é semelhante a de placebo.
- (D) Os inibidores da recaptção da serotonina causam menos efeitos colaterais do que os antidepressivos tricíclicos.
- (E) Pacientes com história prévia de crises convulsivas apresentam risco de convulsão com bupropiona.

12. Sobre os tipos de transtornos psicóticos, considere as características abaixo.

- I - A duração da psicose é maior do que um mês, e a duração dos sintomas é superior a seis meses.
- II - Os sintomas duram pelo menos um dia e menos que um mês.
- III - Os sintomas afetivos iniciam-se antes dos sintomas psicóticos.

As características acima referem-se, respectivamente, a:

- (A) transtorno psicótico breve – transtorno esquizofreniforme – transtorno afetivo com sintomas psicóticos.
- (B) esquizofrenia – transtorno psicótico breve – transtorno delirante.
- (C) esquizofrenia – transtorno psicótico breve – transtorno afetivo com sintomas psicóticos.
- (D) transtorno esquizofreniforme – transtorno psicótico breve – transtorno esquizoafetivo.
- (E) esquizofrenia – transtorno esquizofreniforme – transtorno esquizoafetivo.

13. Um serviço é considerado _____ quando é identificado pela população e pela equipe como o primeiro recurso a ser buscado em caso de necessidade em saúde, situação que define o atributo _____ da atenção primária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) referência principal – integralidade
- (B) porta de entrada – acesso
- (C) porta de entrada – coordenação
- (D) referência principal – longitudinalidade
- (E) referência primária – acesso

14. Mulher de 54 anos, aposentada, com diagnóstico de fibromialgia há vários anos, vem à consulta com o médico de família e comunidade por apresentar queixa de piora das dores generalizadas, nos últimos dias. Ela procura a unidade de saúde apenas nos períodos de piora do quadro. Atualmente, está em uso de amitriptilina 25mg à noite e de paracetamol 500mg de seis em seis horas.

Dentre as opções abaixo, qual a conduta que **NÃO** está indicada no manejo dessa situação?

- (A) Prescrição de ciclobenzaprina.
- (B) Prescrição de tramadol.
- (C) Prescrição de prednisona.
- (D) Indicação de um programa de exercícios físicos.
- (E) Indicação de um programa de terapia cognitivo-comportamental.

15. Assinale, dentre as alternativas abaixo, qual a condição clínica que pode estar relacionada à Síndrome do Túnel do Carpo.

- (A) Obesidade.
- (B) Artrite Reumatoide.
- (C) Hipertireoidismo.
- (D) Diabetes Melito.
- (E) Tabagismo.

16. Quanto à Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale a afirmação correta.

- (A) Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
- (B) É editada pelo Ministério da Saúde no âmbito da Política Nacional de Humanização.
- (C) O seu escopo limita-se aos serviços hospitalares e aos ambientes cirúrgicos.
- (D) Estabelece que todas as instituições de saúde devem dispor, no local do trabalho, de medicamentos para uso emergencial dos seus trabalhadores, em caso de acidente com material biológico com fonte desconhecida.
- (E) Permite que cada instituição crie, a partir das suas peculiaridades, normas específicas sobre o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

17. A investigação da infecção latente por tuberculose (ILTb), em profissionais de saúde, pode ser realizada nos exames admissionais e periódicos, por meio da prova tuberculínica (PT).

Com relação a esse exame, considere as recomendações abaixo.

- I - Caso a PT seja <10mm, repetir a PT em uma a três semanas para avaliação do efeito *booster*.
- II - No caso de persistência de PT <10mm, repetir a PT a cada 12 meses, quando o profissional de saúde atuar em locais de elevado risco de transmissão por *M. tb*. Será considerada ILTB recente quando ocorrer conversão da PT, caracterizada por incremento de 10mm em relação ao valor encontrado na última PT realizada; nesse caso, considerar tratamento de ILTB.
- III- Caso a PT seja ≥10mm, documentar essa informação, afastar TB ativa; nesses casos, não será necessária a repetição da PT.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Homem de 34 anos, motorista de ônibus, busca atendimento médico por apresentar um abscesso na região posterior da coxa esquerda. Informa que o quadro teve início há poucos dias e que o abscesso vem aumentando de tamanho. Exceto pela dor no local, ele nega outras queixas e não apresenta outras comorbidades. Ao exame físico, constata-se a presença de lesão eritematosa única, com 3cm de diâmetro, e presença de flutuação na área central.

Qual a melhor conduta terapêutica nesse caso?

- (A) Incisão, drenagem da lesão e colocação de dreno.
- (B) Incisão, drenagem da lesão e prescrição de antibióticos sistêmicos.
- (C) Prescrição de antibióticos sistêmicos.
- (D) Prescrição de antibióticos locais.
- (E) Calor local até que ocorra drenagem espontânea de pus.

19. Sobre as medidas de avaliação de benefícios ou impacto de um tratamento ou medida preventiva, assinale a afirmação correta.

- (A) Risco Relativo é a razão entre a incidência de eventos nos controles e no total da população.
- (B) Redução Relativa de Risco é a proporção ou percentual absoluto de eventos que deixam de ocorrer com o tratamento.
- (C) Tamanho do efeito é a diferença das médias entre os grupos, dividida pelo desvio padrão comum.
- (D) Número Necessário Tratar é o número de indivíduos a serem tratados por um determinado tempo para evitar 100 eventos.
- (E) Número Necessário para Causar Dano é o número de indivíduos a serem tratados para ocasionar 100 danos.

20. Com relação aos métodos anticoncepcionais, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Os anticoncepcionais orais combinados podem ser mantidos até 50-55 anos.
- (B) A minipílula é indicada para mulheres com idade ≥35 anos, que tenham enxaqueca com sinais focais.
- (C) O DIU de cobre, inserido até 120h após a relação sexual, é uma opção de contracepção de emergência.
- (D) A medroxiprogesterona é o método indicado para mulheres com epilepsia.
- (E) O preservativo feminino pode ser colocado antes do início da relação sexual.

21. Assinale a resposta correta com relação ao manejo dos fogachos da menopausa.

- (A) A terapia hormonal é eficaz para reduzir os fogachos somente quando associa estrogênio e progesterona.
- (B) Os fitoestrogênios são eficazes para uso a longo prazo em mulheres com maior risco de câncer de mama.
- (C) A desvenlafaxina é o único antidepressivo com eficácia comprovada para o tratamento desse sintoma.
- (D) Não existem ensaios clínicos que comprovem a eficácia e segurança da sulpirida no controle de fogachos.
- (E) Doses baixas de estrogênio, via oral, são recomendadas para mulheres com doença hepática ativa.

22. Gestante de 33 anos, IG= 10 semanas +5 dias, vem à UBS sozinha, mostrar exames de primeiro trimestre. É primigesta, casada há 3 anos, a gestação foi planejada, não apresenta comorbidades. É assintomática. Os exames mostram: EQU= nitrito +, urocultura negativa, toxoplasmose IgM negativo/ IgG positivo, glicemia de jejum= 84mg/dL, Hb=11,6g/dL e Ht= 37%, anti-HIV e HBsAg não reagentes, VDRL 1:8, tipagem sanguínea O+.

Qual a conduta a ser tomada em relação a essa paciente?

- (A) Encaminhar para o tratamento de toxoplasmose.
- (B) Solicitar novamente a glicemia de jejum.
- (C) Tratar a paciente e o seu parceiro para sífilis.
- (D) Tratar a bacteriúria assintomática com nitrofurantoína.
- (E) Prescrever ácido fólico e sulfato ferroso profiláticos.

23. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as Síndromes Demenciais às suas respectivas características.

- (1) *Delirium*
 - (2) Pseudodemência depressiva
 - (3) Comprometimento cognitivo leve
 - (4) Doença de Alzheimer
- () Sintomas brandos; alteração cognitiva detectada por anamnese e testagem neuropsicológica.
 - () Amnésia anterógrada, diminuição da memória espacial e afasia anômica são alterações comuns.
 - () Tem origem orgânica, de natureza aguda, com curso flutuante, de causa reversível; afeta a atenção.
 - () Associada a perdas, dores crônicas, isolamento social; o tratamento melhora a cognição e o humor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 3 – 4 – 2 – 1.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 3 – 4 – 1 – 2.

24. São opções medicamentosas disponíveis para o tratamento da obesidade em adultos, **EXCETO**

- (A) bupropiona.
- (B) sibutramina.
- (C) orlistat.
- (D) paroxetina.
- (E) fluoxetina.

25. Os testes abaixo, com seus respectivos pontos de corte, podem ser utilizados para o diagnóstico de Diabetes Mellito, com **EXCEÇÃO** de um deles, assinale-o.

- (A) Glicemia casual ≥ 140 mg/dL.
- (B) Glicemia jejum ≥ 126 mg/dL.
- (C) Glicemia de 2h ≥ 200 mg/dL.
- (D) Hemoglobina glicada $\geq 6,5\%$.
- (E) Glicemia casual ≥ 200 mg/dL + sintomas.