

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 01/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 02 - ENFERMEIRO I (Internação Clínica e Cirúrgica)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 02

ENFERMEIRO I (Internação Clínica e Cirúrgica)

01.	B	11.	D	21.	C	31.	B
02.	C	12.	C	22.	C	32.	A
03.	C	13.	B	23.	E	33.	A
04.	E	14.	B	24.	E	34.	C
05.	D	15.	A	25.	A	35.	E
06.	C	16.	E	26.	B	36.	D
07.	C	17.	A	27.	E	37.	B
08.	A	18.	C	28.	D	38.	A
09.	B	19.	E	29.	C	39.	B
10.	B	20.	ANULADA	30.	A	40.	D



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 6 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 7 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3,5)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1,5) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- 11 **O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá utilizar sanitários nas dependências do local de Prova.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. Sobre infecção urinária, está **INCORRETO** afirmar que

- (A) a dor alivia com uso de terapia antimicrobiana e antiespasmódicos.
- (B) a bolsa de drenagem da sonda vesical de demora deve ser mantida na altura da bexiga do paciente.
- (C) a infecção associada ao cateter vesical pode apresentar risco para sepse.
- (D) a instalação da sonda de demora requer técnica asséptica e remoção precoce.
- (E) a ingesta hídrica pode ser estimulada.

02. Em relação à doença lúpus eritematoso sistêmico, é correto afirmar que

- (A) é uma doença de início agudo.
- (B) se deve estimular exposição ao sol e luz ultravioleta.
- (C) se deve observar riscos sistêmicos, incluindo efeitos renais e cardiovasculares.
- (D) se deve avaliar como um distúrbio mais comum em idosos.
- (E) se deve identificar dor, edema articular e rigidez noturna.

03. Em relação à diabetes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Hipoglicemia
 - (2) Insulina regular
 - (3) Cetoacidose diabética
 - (4) Insulina NPH
 - (5) Hiperglicemia
- () Distúrbio metabólico que resulta de uma deficiência de insulina.
 - () Efeitos a longo prazo contribuem para complicações macro e microvasculares.
 - () Ocorre suor, tremor, tonteira, cefaleia, taquicardia, confusão, entre outros sintomas.
 - () Apresenta um início de ação de 30 minutos a uma hora e, em geral, é administrada 20 a 30 minutos antes de uma refeição.
 - () Apresenta ação máxima de 4 a 12 horas, quando do uso isoladamente; não é primordial que seja administrada antes da refeição.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- (B) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (C) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- (D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (E) 5 – 1 – 4 – 2 – 3.

04. Com base nos cuidados com a dor em pacientes com câncer, considere as afirmações abaixo.

- I - A dor pode estar relacionada com a doença subjacente, a pressão exercida pelo tumor, os procedimentos diagnósticos ou com o tratamento da doença.
- II - Outros fatores podem aumentar a percepção da dor, como medo e apreensão, fadiga, raiva e isolamento social.
- III- Etiologia, localização, tipo e intensidade são fatores determinantes para definição do tratamento da dor.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

05. Considere as afirmações abaixo sobre quimioterapia.

- I - Manter cuidado rigoroso durante a administração do agente quimioterápico devido a riscos e as consequências de extravasamento.
- II - Descartar todos os resíduos de quimioterapia como materiais perigosos.
- III- Aplicar gelo sempre que ocorrer extravasamento do agente quimioterápico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

06. Assinale a alternativa que relaciona os aspectos importantes na avaliação de riscos para úlceras por pressão.

- (A) Estado nutricional alterado, área de debridamento e avaliação da condição total da pele.
- (B) Imobilidade, estado nutricional diminuído e perfusão tecidual aumentada.
- (C) Imobilidade, percepção sensorial prejudicada e forças de atrito e cisalhamento.
- (D) Umidade da pele, área de eritema e edema com extravasamento celular.
- (E) Alterações da pele relacionadas com a idade, área de debridamento e abrasão.

07. Considere as afirmações abaixo com base nos princípios de Bioética.

- I - A Bioética tem uma abordagem secular e global e dela participam apenas as visões dos diferentes profissionais que integram a equipe de saúde.
- II - As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos nazistas, fez com que fosse proposta pelo Tribunal de Nuremberg a primeira recomendação de conduta adequada à assistência em seres humanos, de abrangência internacional.
- III- A Bioética tem uma abordagem secular e global, pois dela participam as diferentes visões de profissionais de saúde, filósofos, advogados, sociólogos, administradores, economistas, teólogos e leigos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

08. Com relação à primeira meta de segurança, que é a identificação do paciente, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Todos os profissionais devem participar ativamente do processo de identificação na admissão, na transferência ou recebimento de pacientes de outra unidade ou instituição, antes do início dos cuidados, de qualquer tratamento ou procedimento, da administração de medicamentos e soluções.
- () No caso de não aceitação de qualquer tipo de identificação aparente, como a pulseira e a etiqueta, por parte do paciente ou dos familiares, utilizar idade, sexo, diagnóstico, número do leito ou do quarto.
- () Enfatizar a responsabilidade dos profissionais de saúde na identificação correta de pacientes antes da realização de exames, procedimentos cirúrgicos, administração de medicamentos/hemocomponentes e realização de cuidados.
- () Desenvolver protocolos para identificação de pacientes com identidade desconhecida, comatosos, confusos ou sob efeito de ação medicamentosa.
- () Confirmar a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento/hemocomponente, antes de sua administração.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – V.
 (B) F – V – V – F – V.
 (C) V – F – F – V – F.
 (D) V – F – V – F – V.
 (E) F – V – V – F – F.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, com base no código de ética de enfermagem.

- (1) Princípios fundamentais do código de ética de enfermagem.
- (2) Responsabilidades e deveres das relações profissionais.
- (3) Direitos das relações com a pessoa, família e coletividade.
- (4) Proibições das relações com a pessoa, família e coletividade.
- (5) Responsabilidades e deveres do sigilo profissional.
- () Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- () Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- () Participar das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e de defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
- () O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento.
- () Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
 (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
 (C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
 (D) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
 (E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.



10. Em relação ao cálculo de soro e diluições, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) se deve considerar o tipo de equipo, a quantidade de soro e o número de horas desejado para calcular o ritmo do fluxo de soro a ser administrado em um determinado período de tempo.
- (B) será necessário infundir 55 microgotas por minuto para administrar 1000 mL de soro fisiológico em 6 horas.
- (C) o número de microgotas por minuto é igual ao volume em mL, dividido pelo número de horas a infundir.
- (D) a relação entre microgotas por minuto e mL por hora é igual, isto é, o número de microgotas é igual ao número de mL/hora a infundir.
- (E) a apresentação de um comprimido é de 500 mg. Foi prescrito 400 mg desse mesmo comprimido para ser administrado via sonda nasointestinal. O mesmo, então, foi diluído em 10 mL e administrado 8 mL desta solução.

11. Em relação à anorexia e caquexia em pacientes em cuidado paliativo, considere as afirmações abaixo.

- I - O primeiro passo para o adequado manejo da síndrome da caquexia é a boa comunicação com o paciente e seus familiares.
- II - A determinação da massa magra é significativamente importante no diagnóstico da caquexia, sendo o método ideal a medida das pregas cutâneas, especialmente em pacientes severamente doentes.
- III - Segundo pesquisas, medidas como evitar odores durante a elaboração das comidas, usar condimentos de acordo com a preferência do paciente, reduzir o tamanho das porções e fazer refeições mais frequentes podem melhorar o aporte nutricional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, e III.

12. Sobre o Processo de Enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É um instrumento ou modelo metodológico utilizado para favorecer a organização do cuidado.
- (B) Deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- (C) É composto por quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, planejamento, intervenção e resultado.
- (D) Na implementação de algumas de suas etapas, os vocabulários descritos pelos sistemas de classificação – como NANDA-I, NIC e NOC – são importantes elementos para o raciocínio clínico.
- (E) Após a coleta de dados, o enfermeiro realiza a interpretação e o agrupamento dos dados para a tomada de decisão sobre os diagnósticos de enfermagem.

13. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo em relação ao Processo de Enfermagem e suas classificações.

- () A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) define uma intervenção de enfermagem como qualquer tratamento, que tenha por base o julgamento clínico e o conhecimento, executado pelo enfermeiro para melhorar os resultados do paciente.
- () A aplicação das classificações na implementação do Processo de Enfermagem segue as etapas deste método, sendo que a Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) pode ser utilizada tanto no planejamento como na avaliação de enfermagem.
- () A NANDA Internacional (NANDA-I) é uma classificação usada para avaliar o quanto o paciente melhorou em resposta às intervenções de enfermagem e é usada na primeira etapa do Processo de Enfermagem.
- () Os sistemas de Classificação refletem o significado dos fenômenos comuns “na e para” a prática de Enfermagem, como diagnósticos, intervenções e resultados.
- () As Classificações NIC e NOC compreendem em sua estrutura taxonômica os elementos que compõem um diagnóstico, uma intervenção e um resultado, ou seja, domínio e classe.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

14. Em relação ao Diagnóstico de enfermagem, considere as afirmações abaixo.

- I - É o processo de coleta de dados que leva à tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam as respostas da pessoa, família ou coletividade humana.
- II - É o julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde, processos vitais reais ou potenciais.
- III- Constitui-se na base para a seleção dos resultados a serem implementados na execução do processo de enfermagem.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

15. A dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável, e é subjetiva. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através de suas experiências anteriores.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os fatores a serem considerados na avaliação completa da dor com as suas descrições.

- (1) intensidade
 (2) regulação temporal
 (3) qualidade
 (4) significado pessoal
 (5) fatores agravantes e aliviadores

- () é influenciada pelo limiar de dor e pela tolerância à dor.
 () início, duração, relação entre tempo e intensidade e alterações nos padrões rítmicos.
 () o paciente descreve com o que se parece a dor.
 () cada paciente experimenta a dor de maneira diferente.
 () relação entre a atividade e a dor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 (B) 1 - 3 - 4 - 5 - 2.
 (C) 3 - 2 - 1 - 4 - 5.
 (D) 4 - 1 - 3 - 2 - 5.
 (E) 5 - 2 - 3 - 4 - 1.

16. Promover o ensino pré-operatório é papel fundamental do enfermeiro para melhorar a recuperação da anestesia e os cuidados pós-operatórios. Com base nos cuidados essenciais para prevenir complicações como pneumonias e trombose venosa profunda, recomenda-se

- (A) repouso relativo no leito.
 (B) repouso absoluto no leito.
 (C) exercícios respiratórios, tosse, exercícios com os braços, mudanças de posição e deambulação precoce.
 (D) exercícios respiratórios, tosse, exercícios com as pernas, mudanças de posição e deambulação tardia.
 (E) exercícios respiratórios, tosse, exercícios com as pernas, mudanças de posição e deambulação precoce.

17. A hemorragia é uma complicação grave da cirurgia e pode resultar em morte. Com relação aos sinais da hemorragia, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) ocorre diminuição da frequência de pulso.
 (B) ocorre queda da pressão sanguínea arterial e venosa.
 (C) ocorre queda da temperatura.
 (D) ocorre diminuição do débito cardíaco.
 (E) se observa respirações rápidas.

18. J.P.S, de 56 anos, foi submetida à Lobectomia pulmonar esquerda devido à neoplasia. Está com dois drenos pleurais em aspiração contínua.

Com base na indicação de drenagem torácica, considere as finalidades relacionadas abaixo.

- I - Reexpandir o pulmão afetado e remover o excesso de ar, líquido e sangue.
 II - Restaurar a pressão intratorácica negativa necessária para a reexpansão pulmonar.
 III- Restaurar a pressão positiva no pulmão que pode resultar em colapso pulmonar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II, III.

19. M.R, de 82 anos, é portador de insuficiência arterial no membro inferior direito em decorrência de aterosclerose. Desenvolveu oclusão arterial com isquemia severa no pé direito e foi submetido à Bypass femoropoplíteo. Com relação aos cuidados de enfermagem no pós-operatório para identificar a manutenção da circulação, considere as instruções abaixo.

- I - Observar a cor e temperatura da pele.
- II - Verificar presença de pulso periférico.
- III- Verificar as funções sensoriais e motoras do membro afetado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. A ileostomia é a abertura de um estoma na parede abdominal para drenagem do material fecal a partir do íleo até o exterior do corpo. A adaptação adequada da bolsa é extremamente importante. Para tanto, faz-se necessário medir o tamanho do estoma para comparar com a abertura da bolsa. Qual a margem que deve ser observada ao redor do estoma?

- (A) Cerca de 1 cm.
- (B) Cerca de 2 cm.
- (C) Cerca de 3 mm.
- (D) Exatamente 7 mm.
- (E) Exatamente do diâmetro do estoma.

21. Considere as afirmativas abaixo sobre cuidados com a Sonda Nasoentérica (SNE).

- I - A SNE é empregada para alimentação e sua posição deverá ficar na altura do jejuno.
- II - O comprimento da SNE é determinado medindo-se a distância da ponta do nariz até o apêndice xifoide, acrescentando 10 cm para a posição intestinal.
- III- Deve-se verificar a posição da SNE cada vez que líquidos e medicações são administrados, e uma vez por turno para paciente com alimentação contínua.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

22. As manifestações clínicas mais evidentes no paciente com edema pulmonar são

- (A) agitação, desorientação e dor torácica.
- (B) cianose, dor torácica e dispneia.
- (C) cianose, dispneia e angústia respiratória.
- (D) dor torácica, dispneia e angústia respiratória.
- (E) dispneia, desorientação e dor torácica.

23. Considere as afirmações abaixo sobre epilepsias.

- I - Durante a crise de epilepsia, deve-se colocar o paciente em decúbito lateral para ajudar na drenagem das secreções faríngeas.
- II - Deve-se iniciar a avaliação e o monitoramento contínuos das funções respiratórias e cardíacas, devido ao risco de depressão tardia da respiração e da pressão arterial como resultado da administração das drogas.
- III- Deve-se manter sempre acesso venoso para infusão das medicações e parede de aspiração próxima devido ao risco de aspiração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os déficits neurológicos dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) aos seus sintomas.

- (1) Perda da visão periférica
 - (2) Hemiparesia
 - (3) Ataxia
 - (4) Parestesias
 - (5) Afasia receptiva
- () Incapacidade de compreender palavras faladas; paciente consegue falar, mas suas palavras podem não fazer sentido.
 - () Dificuldade em enxergar a noite; não percepção de objetos ou de suas bordas.
 - () Dormência e formigamento das extremidades.
 - () Fraqueza da face, braço e perna do mesmo lado.
 - () Marcha cambaleante e instável.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 4 - 5 - 2 - 3.
- (B) 2 - 5 - 4 - 3 - 1.
- (C) 3 - 2 - 4 - 1 - 5.
- (D) 5 - 2 - 3 - 1 - 4.
- (E) 5 - 1 - 4 - 2 - 3.



25. Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada sintoma da crise hipertensiva.

- (A) Polaciúria.
- (B) Dor anginosa.
- (C) Alterações visuais e fala.
- (D) Epistaxe.
- (E) Cefaleia.

26. Um paciente está recebendo 500 ml de soro glicosado a 5%, que iniciou às 7 horas da manhã, e a prescrição é de 21 gotas por minuto. São 11 horas e o soro já terminou. A que horas deveria terminar o soro? Quanto de soro deveria ter no frasco às 11 horas?

- (A) 14 horas / 248 ml
- (B) 15 horas / 248 ml
- (C) 15 horas / 252 ml
- (D) 16 horas / 252 ml
- (E) 19 horas / 63 ml

27. O paciente com meningite pneumocócica necessita, durante a assistência de saúde, da adoção de precauções _____, por um período equivalente a _____.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase acima.

- (A) aéreas – três dias, apenas.
- (B) aéreas – cinco dias.
- (C) aéreas – sete dias, apenas.
- (D) padrão – 30 dias, em média.
- (E) padrão – toda a internação.

28. É característica **INDESEJÁVEL** de um antisséptico

- (A) a solubilidade em água.
- (B) a facilidade de uso.
- (C) a rapidez de ação.
- (D) a instabilidade da solução.
- (E) o amplo espectro de ação.

29. Sobre a NR32 – Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.
- (B) o empregador deve vedar o uso de calçados abertos, adornos, e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- (C) um exemplar de cada equipamento de proteção individual – EPI, descartável ou não, deverá estar à disposição por posto de trabalho.
- (D) os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- (E) são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

30. A Lei n.º 8080, de 19 de setembro de 1990, regulamenta as ações e serviços de saúde em todo território nacional. Diz no Art. 3º que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, _____, _____, _____, (...) e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto acima.

- (A) o saneamento básico – o meio ambiente – o trabalho
- (B) o saneamento básico – a renda – o cartão cidadão
- (C) o meio ambiente – o trabalho – a bolsa família
- (D) o lazer – o meio ambiente – a cultura
- (E) o transporte – a educação – a bolsa família

31. É um princípio norteador da Política Nacional de Humanização – PNH:

- (A) A responsabilidade dos usuários na gestão do SUS.
- (B) O fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional.
- (C) O uso adequado de medicamentos.
- (D) O estímulo a grupos de trabalho com plano de trabalho definido.
- (E) A existência de mecanismos de desospitalização.

32. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as especificidades _____, a superação das _____ regionais, as necessidades de _____ e desenvolvimento para o trabalho em saúde.

- (A) regionais – desigualdades – formação
- (B) regionais – dificuldades – capacitação
- (C) municipais – desigualdades – capacitação
- (D) municipais – dificuldades – formação
- (E) nacionais – desigualdades – formação

33. Pesquisas recentes concentram-se mais na liderança como processo de influenciar indivíduos na cultura organizacional e na relação interativa entre líder e liderados. São papéis inerentes à liderança:

- (A) Modelo de conduta, agente de mudança, facilitador.
- (B) Modelo de conduta, agente de mudança, controlador.
- (C) Controlador, agente de mudança, treinador.
- (D) Agente de mudança, cargo de chefia, facilitador.
- (E) Agente de mudança, cargo de chefia, controlador.



34. O planejamento estratégico como processo de administração costuma incluir a seguinte etapa:

- (A) comunicar o plano de metas aos escalões superiores da instituição.
- (B) definir as metas para identificar os pontos fortes e fracos da organização.
- (C) estabelecer metas realistas com a missão da organização.
- (D) estabelecer objetivos adequados ao quadro clínico da instituição.
- (E) estabelecer metas diferentes para os setores deficitários da organização.

35. No cuidado de enfermagem ao paciente que realizou colecistectomia e está com dreno biliar, é correto afirmar que

- (A) o dreno biliar deverá permanecer clampeado nas primeiras 24 horas do pós-operatório.
- (B) o repouso absoluto no leito deve ser orientado enquanto o sistema de drenagem estiver instalado.
- (C) a aferição da pressão intra-abdominal deve ser realizada a cada 12 horas, através do dreno biliar.
- (D) o dreno biliar deverá permanecer clampeado nas primeiras 12 horas do pós-operatório.
- (E) se deve realizar frequentes trocas de curativo e proteger a pele contra irritação em caso de extravasamento ao redor do dreno.

36. A mastectomia envolve a remoção do tecido mamário e, em alguns casos, a dissecação dos linfonodos axilares. Em relação ao pós-operatório, é correto afirmar que

- (A) o rubor e o inchaço do braço operado são manifestações esperadas no pós-operatório.
- (B) é contraindicado o uso de barbeador elétrico na depilação das axilas.
- (C) é contraindicado realizar exercícios com o membro operado.
- (D) se deve evitar medições de pressão arterial e injeções no membro afetado.
- (E) se pode realizar coletas de sangue no membro afetado após 30 dias de cirurgia.

37. A artroplastia de quadril é uma cirurgia em que ocorre a substituição de parte ou de toda a superfície articular.

Assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), considerando os cuidados de enfermagem.

- () posicionar em abdução o membro operado para prevenir a luxação da prótese.
- () observar dor, tumefação e imobilização no membro operado.
- () manter os joelhos aproximados ao sentar o paciente na cadeira.
- () orientar o paciente a não cruzar as pernas.
- () manter o membro operado elevado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – F – V – V – F.

38. Para o paciente de pós-operatório de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), que mantém sonda vesical de demora, é correto afirmar que

- (A) a incontinência urinária pode ocorrer após remoção da sonda vesical.
- (B) é indicado o clampeamento da sonda ao ser constatada a presença de coágulos no sistema de drenagem.
- (C) a irrigação contínua em sistema de drenagem de duas vias objetiva a prevenção de coágulos.
- (D) a drenagem da bexiga deve ser realizada através de um sistema aberto.
- (E) a coloração âmbar da urina indica sangramento ativo.

39. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente com cálculos renais, podemos afirmar que é **INCORRETO**

- (A) monitorar o débito urinário e o padrão de micção.
- (B) desestimular a deambulação.
- (C) coar a urina.
- (D) incentivar a ingesta hídrica.
- (E) observar a presença de hematúria.

40. A hipovolemia é um dos distúrbios do volume de líquidos. Assinale a alternativa correta com relação às manifestações clínicas para sua detecção.

- (A) Turgor cutâneo aumentado.
- (B) Temperatura diminuída.
- (C) Poliúria.
- (D) Pele fria e pegajosa.
- (E) Pressão venosa central aumentada.