

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## MISSÃO INSTITUCIONAL

*Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.*

## EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

### PS 66 - ENFERMEIRO I (Pediatria)

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n.º: \_\_\_\_\_



# INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se, preferencialmente, de caneta esferográfica de tinta azul. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **41**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**Boa prova!**

**01.** Para Goldim e Francisconi (2014), a utilização de dados sobre os pacientes para exemplificar situações clínicas ou administrativas sem descaracterizar plenamente sua identificação é considerada

- (A) exceção à preservação.
- (B) quebra de privacidade e quebra de confidencialidade.
- (C) atitude frequente na área do ensino e da pesquisa.
- (D) quebra de confidencialidade e exceção à preservação.
- (E) postura correta, no que se refere à ética profissional.

**02.** Assinale a alternativa correta sobre o direito à vida e à saúde, contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

- (A) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, por meio de prontuários, pelo prazo de oito anos.
- (C) Nos casos de internação de crianças e adolescentes, os estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência dos pais ou responsáveis, em turnos a serem definidos pelas instituições.
- (D) Somente os casos com confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão comunicados ao Conselho Tutelar.
- (E) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica para a prevenção das enfermidades que afetam a população infantil, não estando sob sua responsabilidade a assistência odontológica.

**03.** Considerando o capítulo III do Código de Ética da Enfermagem, que trata do Ensino, Pesquisa e Produção Técnico-científica, preencha os parênteses abaixo.

- (1) Direitos
  - (2) Responsabilidades e Deveres
- ( ) Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados.
  - ( ) Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
  - ( ) Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
  - ( ) Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 1 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2.
- (C) 1 – 1 – 2 – 2.
- (D) 2 – 1 – 2 – 1.
- (E) 2 – 2 – 1 – 1.

**04.** A bronquiolite é uma infecção virótica autolimitada, mas potencialmente grave, com inflamação e obstrução predominante em bronquíolos terminais em lactentes. Qual alternativa contempla os achados mais frequentes da história e dos exames físicos dessa patologia?

- (A) Tosse, prostração, cianose, apneia e icterícia.
- (B) Coriza, taquipneia, febre (38 a 39°C) e secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
- (C) Tosse, sibilo/chiado, expiração prolongada, tiragem intercostal e subcostal.
- (D) Sibilo/chiado, uso de musculatura respiratória acessória e anúria.
- (E) Batimento de aleta nasal, cianose, fígado rebaixado, náusea e diarreia.

**05.** Em relação à Síndrome de West, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É geralmente refratária a tratamentos.
- (B) Manifesta-se em bebês entre 12 e 18 meses de idade.
- (C) Caracteriza-se por espasmos com queda súbita da cabeça para frente ou para o lado.
- (D) Sintomas parecidos ocorrem em crianças normais ou com seqüela de lesões do SNC (Sistema Nervoso Central).
- (E) O prognóstico é ruim (doença degenerativa) nos casos de retardo progressivo do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) ou de síndrome neurocutânea associada.

**06.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as doenças às suas respectivas características.

- (1) Doença Celíaca
  - (2) Atresia Biliar
  - (3) Estenose Hipertrófica de Píloro
  - (4) Apendicite
- ( ) É tipicamente o resultado da obstrução da luz do apêndice geralmente por um fecalite. Os sinais e sintomas comuns são dor abdominal no quadrante inferior direito, sensibilidade e febre.
- ( ) As intervenções de enfermagem incluem o suporte da família antes, durante e após os procedimentos e a educação relacionada ao plano de tratamento. Os familiares necessitam de orientações ao que se refere à administração adequada de medicamentos e terapia nutricional.
- ( ) O diagnóstico baseia-se em uma biópsia do intestino delgado, que demonstra as alterações características da inflamação da mucosa, hiperplasia de criptas e atrofia das vilosidades. Após um ou dois dias da instituição da dieta, a maioria das crianças demonstra uma resposta favorável, incluindo ganho de peso e aumento do apetite.
- ( ) É reconhecida por vômitos em jatos, desnutrição, desidratação e uma massa palpável no epigástrico.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 4 – 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 4 – 2 – 1 – 3.

**07.** Assinale a alternativa **INCORRETA**, considerando a avaliação da hidratação de uma criança com diarreia.

- (A) Verificar a umidade das mucosas pedindo, no caso de crianças maiores, para juntar saliva e mostrá-la entre os lábios e, no caso de crianças menores, avaliando a presença de saliva na boca.
- (B) Verificar o tempo de enchimento capilar através da compressão da mão fechada por uns 15 segundos, descompressão e observação do tempo de demora da recoloração, ou através da verificação do leito ungueal ou da planta dos pés.
- (C) Verificar a elasticidade da pele através do toque cutâneo nos membros inferiores.
- (D) Verificar a diurese para constatação de qualquer alteração.
- (E) Verificar sinais de choque hipovolêmico grave (irritabilidade ou sonolência).

**08.** Considere as seguintes medidas de prevenção de infecções.

- I - Educação periódica da equipe multiprofissional, com aulas formais e treinamento prático nos setores onde ocorre a utilização de cateteres centrais.
- II - Antissepsia rigorosa no local de implantação do cateter; escovação das mãos, seguida de parâmentação cirúrgica; uso de campos estéreis com exposição do sítio de inserção.
- III- Escolha adequada do sítio de inserção, com preferência da veia subclávia, e, como segunda opção, da veia jugular.
- IV - Uso de curativo transparente estéril trocado a cada 15 dias e curativo com gaze a cada 7 dias, anotando no curativo a data da troca.
- V - Uso de luvas e realização de desinfecção com álcool 70% na manipulação das conexões.

Quais são adotadas para a prevenção de infecções relacionadas a cateter?

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas I, II, III e V.
- (C) Apenas I, II, IV e V.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**09.** Considere as frases a seguir sobre precauções padrão ou precauções universais, no que se refere à prevenção de infecções hospitalares.

- (1) \_\_\_\_\_, sobretudo antes e depois de examinar ou cuidar de um paciente.
- (2) \_\_\_\_\_, sempre que houver risco de tocar em áreas ou objetos contaminados com sangue, excreções, secreções ou qualquer líquido corporal, exceto suor.
- (3) \_\_\_\_\_, quando houver risco de contaminar a roupa com respingos ou *sprays* de sangue, excreções e secreções.
- (4) \_\_\_\_\_, quando houver risco de respingos ou *sprays* de sangue ou secreções nos olhos e boca, e para executar procedimento de risco.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das frases acima.

- (A) Lavagem das mãos – Uso de avental – Uso de luvas – Uso de máscara
- (B) Higienização das mãos – Uso de luvas – Uso de avental – Uso de máscara e óculos
- (C) Higienização das mãos – Lavagem das mãos – Uso de avental – Uso de óculos
- (D) Colocação de avental – Lavagem das mãos – Uso de óculos – Uso de máscara
- (E) Antissepsia das mãos – Uso de avental – Uso de máscara – Uso de óculos

**10.** Em crianças com diagnóstico de Fibrose Cística é **INCORRETO** afirmar que

- (A) as principais complicações gastrointestinais incluem íleo meconial, constipação intestinal, colonopatia fibrosante, mucocele do apêndice e apendicite.
- (B) pacientes com fibrose cística têm possibilidade de desenvolver diabete melito relacionada à fibrose cística. Todos os indivíduos acima de 10 anos devem ser submetidos ao teste de tolerância oral à glicose.
- (C) todos os pacientes com fibrose cística devem receber educação nutricional, aconselhamento dietético, reposição enzimática e suplementação vitamínica.
- (D) crianças com fibrose cística têm maiores riscos de hiponatremia por causa da perda de sal na pele, a qual pode ser identificada por baixos níveis de sódio sanguíneo.
- (E) os pacientes com fibrose cística não deverão receber terapia de reposição enzimática durante o aleitamento materno.

**11.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os cateteres às suas indicações ou características.

- (1) Cateter central de implantação periférica
  - (2) Cateter central tunelizado
  - (3) Cateter totalmente implantável
  - (4) Cateter central não tunelizado
  - (5) Cateter periférico
- ( ) dispositivo de borracha siliconizada cuja extremidade distal se acopla à câmara puncionável.
- ( ) pode possuir um, dois ou mais lumens, porém está associado a um aumento nos índices de infecção.
- ( ) uma de suas principais limitações é a administração de fármacos vesicantes sob infusão contínua prolongada.
- ( ) indicado com frequência em paciente onco-hematológico, principalmente em transplante de medula óssea.
- ( ) as indicações de uso são: prematuridade, imunossupressão, coagulopatias, acesso vascular difícil, jejum prolongado e impossibilidade de ingestão via oral.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- (B) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- (C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (D) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.

**12.** Considere as afirmações abaixo sobre a toxicidade hematológica no paciente onco-hematológico.

- I - O tempo transcorrido entre a aplicação da droga e o aparecimento do menor valor de contagem hematológica é chamado NADIR.
- II - A plaquetopenia é a primeira queda hematológica perceptível, e a segunda é a leucopenia.
- III- Nos indivíduos neutropênicos, os sinais clássicos de infecção podem não ocorrer em função do limitado número de células fagocitárias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**13.** A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é a doença maligna mais comum na infância. Assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas da LLA.

- (A) Palidez, febre, rigidez de nuca e mal-estar.
- (B) Febre, infecção na boca, equimoses e disúria.
- (C) Poliúria, infecção de garganta, febre e cefaleia.
- (D) Cefaleia, febre, equimoses e palidez.
- (E) Dor óssea, cefaleia, vômitos e diarreia.

**14.** Considere as afirmações abaixo sobre o Transplante de Medula Óssea.

- I - Existem basicamente três tipos: autólogo, singênic e alogênico.
- II - As células para o transplante podem ser obtidas da medula óssea, do sangue periférico ou do sangue de cordão umbilical e placentário.
- III- O regime de condicionamento, que é realizado antes do transplante, consiste na aplicação de quimioterapia em altas doses, associada ou não à irradiação corporal total.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**15.** Sobre Linfoma de Hodgkin é **INCORRETO** afirmar que

- (A) trata-se de uma doença causada por linfócitos malignos que se acumulam nos linfonodos.
- (B) pode surgir em qualquer idade, embora tenha um pico de incidência em crianças e seja raro em adultos jovens.
- (C) os sintomas sistêmicos são febre contínua ou cíclica, prurido quase sempre intenso, perda de peso, sudorese, fraqueza, fadiga, anorexia e caquexia.
- (D) predomina no sexo masculino.
- (E) o tratamento é feito com radioterapia, quimioterapia ou com a combinação de ambas.

**16.** Considerando que os diversos agentes antineoplásicos necessitam de cuidados de enfermagem específicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se estimular a ingestão hídrica em todo paciente submetido à administração de ciclofosfamida, pois previne a cistite hemorrágica.
- (B) Deve-se observar a presença de conjuntivite durante a terapia em altas doses de citarabina, já que o fármaco é excretado pelas lágrimas.
- (C) O uso de metotrexato em altas doses requer hidratação vigorosa antes, durante e após a aplicação, alcalinização da urina com bicarbonato de sódio endovenoso e/ou por via oral, monitorização da diurese, e controle do pH urinário a cada micção.
- (D) A administração da daunorubicina sob infusão superior a meia hora não deve ser feita por veia periférica, pois tem ação vesicante.
- (E) A cisplatina possui baixo poder emetogênico. Sua administração não necessita ser precedida de antiemético potente.

**17.** Considere as afirmações a seguir, com relação aos direitos e deveres do profissional de enfermagem.

- I - É direito do profissional recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- II - É dever do profissional executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam ou não a segurança da pessoa.
- III- É proibido assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

Quais estão corretas, tendo em vista o disposto na Resolução COFEN nº 311/2007, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**18.** Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação à avaliação do estado físico das funções vitais da criança, como temperatura, pulso, respiração e pressão arterial (PA).

- (A) Para melhores resultados na obtenção dos sinais vitais em lactentes, verifica-se a temperatura, em seguida o pulso e por último a respiração.
- (B) A temperatura em crianças saudáveis pode ser medida em vários locais do corpo por via oral, retal, axilar, canal auditivo, membrana timpânica, artéria temporal ou via cutânea.
- (C) Um pulso satisfatório pode ser obtido na artéria radial em crianças maiores de dois anos. Entretanto, em lactentes e crianças pequenas, o impulso apical é mais confiável utilizando ausculta cardíaca.
- (D) Em lactentes, devemos observar os movimentos abdominais, já que as respirações são primariamente diafragmáticas. Como os movimentos são irregulares, é indicado contá-los por 1 minuto.
- (E) Para aferição correta de PA não invasiva, o fator mais importante é o tamanho apropriado do manguito, cujo balão inflável deve ter uma largura de aproximadamente 40% da circunferência do braço.

**19.** Em relação aos cuidados paliativos em pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Oferecer cuidados paliativos de qualidade significa tratar o sofrimento e melhorar as condições de vida em todas as fases da doença.
- (B) Cuidado paliativo eficaz exige uma abordagem ampla e multidisciplinar que inclui a família.
- (C) Tem como objetivo a melhora da qualidade de vida, funcionalidade do paciente e o auxílio na tomada de decisões no final da vida.
- (D) Em pacientes pediátricos, dor é o sintoma mais frequente e o fator mais estressante para o paciente e sua família.
- (E) Os responsáveis e/ou familiares não devem ser incluídos nas tomadas de decisões e na discussão de plano de final de vida.

**20.** Em relação aos tipos de maus-tratos sexuais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Incesto
  - (2) Molestamento
  - (3) Exibicionismo
  - (4) Pornografia infantil
  - (5) Prostituição infantil
  - (6) Pedofilia
- ( ) Termo vago que inclui "liberdades indecentes" como toque, carícia, beijo, masturbação de um só ou mútua, ou contato oral-genital.
  - ( ) Significa literalmente "amor por criança" e não denota um tipo de atividade sexual, mas, sim, a preferência de um adulto por crianças na pré-adolescência como meio de atingir excitação sexual.
  - ( ) Exposição indecente, em geral, exposição da genitália por um adulto para crianças ou outro adulto.
  - ( ) Qualquer atividade sexual entre membros da família; não é necessário haver relação de sangue (abusadores podem incluir padrasto ou madrasta, irmãos não consanguíneos, avós, tios e tias).
  - ( ) Preparar e fotografar em qualquer mídia atos sexuais envolvendo crianças sozinhas ou com adultos ou animais sem o consentimento do responsável legal da criança; também significa distribuição desse material sob qualquer forma, com ou sem lucro.
  - ( ) Envolver crianças em atos sexuais para ter lucro e, geralmente, com troca de parceiros.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 6 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (B) 4 – 1 – 5 – 3 – 2 – 6.
- (C) 3 – 6 – 2 – 1 – 4 – 5.
- (D) 2 – 3 – 6 – 1 – 4 – 5.
- (E) 6 – 3 – 1 – 5 – 2 – 4.

**21.** As reações adversas decorrentes da quimioterapia relacionam-se à não especificidade, ou seja, essas drogas não afetam exclusivamente as células tumorais. Assinale a alternativa correta em relação às complicações do tratamento antineoplásico.

- (A) Trombocitopenia não é agravada com o uso concomitante de antineoplásicos e medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos e diuréticos.
- (B) Náuseas e vômitos devem ser avaliados da mesma forma, pois são eventos semelhantes e possuem as mesmas causas.
- (C) Na mucosite oral a higiene oral tende a agravar o processo inflamatório.
- (D) A nefrotoxicidade é um fator dose-limitante para alguns quimioterápicos, pois podem causar desequilíbrio hidroeletrolítico, e evoluir para falência renal aguda ou crônica.
- (E) A cardiotoxicidade aguda pode ocorrer ao longo ou logo após a infusão da droga. Em geral, existe a necessidade de suspensão da dose subsequente.



**22.** Considere as afirmações abaixo.

- (1) \_\_\_\_\_ é uma forma grave de abuso infantil causada pelo sacudimento violento do lactente ou de criança pequena.
- (2) \_\_\_\_\_ é uma forma rara, porém grave, de abuso infantil, no qual cuidadores deliberadamente exageram ou inventam histórias ou induzem sintomas. Inclui abuso físico, emocional ou psicológico para gratificação do cuidador, que geralmente é a mãe biológica com algum conhecimento e treinamento em cuidados de saúde.
- (3) \_\_\_\_\_ consiste geralmente na falha de um dos pais ou de outra pessoa legalmente responsável pelo bem-estar da criança em prover suas necessidades básicas em um nível de cuidado adequado.
- (4) \_\_\_\_\_ é um aspecto difícil de ser definido; refere-se à tentativa deliberada de destruir ou prejudicar a autoestima ou competência da criança. Pode assumir as seguintes formas: rejeitar, isolar, aterrorizar, ignorar, corromper, agredir verbalmente ou exercer pressão excessiva sobre a criança.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das afirmações acima.

- (A) Síndrome de Munchausen por procuração – Abuso emocional – Abuso sexual – Síndrome do bebê sacudido
- (B) Síndrome do bebê sacudido – Síndrome de Munchausen por procuração – Negligência infantil – Abuso emocional
- (C) Abuso emocional – Síndrome do bebê sacudido – Síndrome de Munchausen por procuração – Negligência infantil
- (D) Síndrome do bebê sacudido – Negligência infantil – Abuso emocional – Síndrome de Munchausen por procuração
- (E) Síndrome de Munchausen por procuração – Negligência infantil – Abuso emocional – Abuso físico

**23.** Os tumores cerebrais são a segunda neoplasia de maior frequência na infância. Sobre os tumores de sistema nervoso central é **INCORRETO** afirmar que

- (A) cefaleia progressiva é uma manifestação inicial frequente.
- (B) devem ser cogitados na presença de qualquer alteração neurológica progressiva ou prolongada.
- (C) têm como achados no exame físico: estrabismo, paresias, marcha instável, desequilíbrio.
- (D) a radioterapia é desaconselhada em pediatria pelos riscos oferecidos às crianças menores de dois anos.
- (E) a cirurgia não faz parte do tratamento, pois não existe a possibilidade de ressecção total do tumor.

**24.** A ventilação mecânica é o principal fator de risco para a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Em relação às medidas para redução da PAV, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) Elevação da cabeceira da cama a 30° - 45°.
- (B) Higiene oral a cada 2-4 horas.
- (C) Usar solução salina nas aspirações.
- (D) Uso de tubos traqueais com balonete.
- (E) Intubação via orotraqueal, ao invés de nasotraqueal.

**25.** Considere as afirmativas abaixo sobre choque na criança.

- I - Choque hipovolêmico é o tipo mais comum encontrado em crianças. Ocorre um decréscimo absoluto na perfusão. Resulta da diminuição da pré-carga por perda de fluido extravascular ou perda de líquido intravascular.
- II - O choque distributivo pode levar à hipovolemia funcional com diminuição da pré-carga. Está associado a um débito cardíaco diminuído.
- III - Choque cardiogênico é resultado de falha da bomba cardíaca, manifestado fisiologicamente como diminuição da função sistólica e débito cardíaco deprimido. É menos frequente entre crianças em comparação aos adultos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**26.** A cetoacidose diabética é caracterizada por hiperglicemia, geralmente acima de 300mg/dL (Oliveira, 2011). É uma emergência, com mortalidade significativa, mesmo quando adequadamente tratada, sobretudo quando complicada com edema cerebral. Assinale a alternativa com quadro sintomático que **NÃO** está associado à cetoacidose diabética.

- (A) Desidratação com vômitos e hálito cetônico.
- (B) Obnubilação e letargia, evoluindo para o coma.
- (C) Anúria.
- (D) Taquipneia e hiperpneia.
- (E) Respiração acidótica.



**27.** Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem com crianças traqueostomizadas.

- (A) Estudos demonstram que o uso de solução fisiológica está associado a uma maior taxa de infecção do que a limpeza realizada com substâncias assépticas.
- (B) A cânula de traqueostomia deve ser mantida sem manipulação por pelo menos 48-72 horas no pós-operatório imediato. Durante esse período ocorre a estabilização do traqueostoma.
- (C) A troca rotineira da cânula não é recomendada, pois não evita o acúmulo de secreções.
- (D) A manipulação da cânula não é irritante para a traqueia e raramente causa tosse.
- (E) O traqueostoma deve ser higienizado a cada 48 horas.

**28.** O transplante de fígado de urgência é o único tratamento definitivo para a maioria dos pacientes com insuficiência hepática aguda. Em relação a esse tipo de transplante, considere as afirmações abaixo.

- I - Geralmente o paciente chega na UTI pediátrica comatoso, com pupilas mióticas, com tubo orotraqueal, ausência de ventilação espontânea e em uso de droga vasoativa.
- II - Realiza-se hemoglicoteste no paciente a cada hora até a estabilização; verificam-se os sinais vitais e a pressão venosa central, também, a cada hora. Mede-se a circunferência abdominal ao menos uma vez por turno.
- III- São avaliadas diurese, densidade urinária e glicosúria.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**29.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as medicações utilizadas na parada cardiorrespiratória as suas características ou indicações.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Adrenalina</li> <li>(2) Atropina</li> <li>(3) Lidocaína</li> <li>(4) Bicarbonato de Cálcio</li> <li>(5) Naloxona</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Antagonista de opioides, reverte rapidamente efeitos tóxicos, como depressão respiratória, sedação, hipotensão e hipoperfusão. Pode ser administrada por via endovenosa, subcutânea, endotraqueal ou intramuscular.</li> <li>( ) Medicação utilizada no tratamento da acidose metabólica, na hiperpotassemia, hipermagnesemia e nas intoxicações por tricíclicos ou bloqueadores de canais de sódio.</li> <li>( ) Droga de escolha no tratamento da taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e extrasístoles ventriculares sintomáticas. Pode ser administrada por via endotraqueal.</li> <li>( ) É uma droga parassimpaticolítica que acelera o marcapasso sinusal e a condução atrioventricular. Previne a bradicardia de origem vagal para entubação.</li> <li>( ) Aumenta a resistência vascular sistêmica, eleva a pressão sistólica e diastólica e a pressão de perfusão coronariana.</li> </ul> |
|--|--|

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
- (C) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.
- (D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.

**30.** Existem situações clínicas associadas ao risco de parada cardiorrespiratória pediátrica que necessitam de intervenção imediata. Assinale a alternativa que apresenta todas as alterações clínicas presentes nesses casos.

- (A) Alteração do nível de consciência, frequência respiratória igual ou menor que 60mpm, palidez.
- (B) Sangramento profuso, hiperglicemia, pulso filiforme ou paradoxal.
- (C) Moteamento cutâneo, frequência respiratória menor ou igual a 60mpm, frequência cardíaca abaixo de 160bpm em crianças maiores de oito anos.
- (D) Estridor laríngeo, hipoglicemia, convulsão de difícil controle.
- (E) Tosse produtiva, arritmia, retração intercostal, supraclavicular e subcostal.

**31.** A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é um procedimento desenvolvido para dar suporte ventilatório a pacientes com insuficiência respiratória aguda, crônica ou crônica agudizada, evitando estabelecer uma via aérea artificial. Assinale a alternativa correta, com relação à VMNI.

- (A) Requer mais sedoanalgesia.
- (B) Aumenta o tempo de permanência em UTI.
- (C) Não antecipa o desmame dos pacientes em ventilação mecânica invasiva.
- (D) Não evita a entubação traqueal.
- (E) Permite ganhar tempo na tomada de decisões bioéticas em pacientes com necessidade eventual de limitação de esforço terapêutico.

**32.** O Processo de Enfermagem é o método científico através do qual o enfermeiro organiza seu conhecimento e sua prática, o que pressupõe a existência de uma abordagem sistematizada e norteada pelo pensamento crítico, constituindo-se em 5 etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada etapa do Processo de Enfermagem a sua caracterização.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Coleta de Dados</li> <li>(2) Diagnóstico de Enfermagem</li> <li>(3) Planejamento</li> <li>(4) Implementação</li> <li>(5) Avaliação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana.</li> <li>( ) Processo sistemático realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana.</li> <li>( ) Processo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa/família para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.</li> <li>( ) Julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais, constituindo a base para a seleção das intervenções de enfermagem.</li> <li>( ) Realização das ações ou intervenções de enfermagem que foram determinadas durante todo o processo.</li> </ul> |
|--|---|

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
- (B) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (D) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.

**33.** São sinais e sintomas indicativos de doença cardiovascular:

- (A) dor articular, claudicação, palidez cutânea.
- (B) edema de face, prurido, icterícia.
- (C) cianose, taquicardia, ganho de peso deficiente.
- (D) febre, retrações subcostais, rouquidão.
- (E) cefaleia, confusão mental, movimentos tônico-clônicos.

**34.** Considere as seguintes afirmativas sobre morte encefálica em crianças.

- I - Consequência de uma lesão encefálica irreversível e de causa conhecida.
- II - É caracterizada pela realização de exames clínicos e complementares com intervalos de 12 horas, independente da faixa etária.
- III- O exame clínico confirma a presença do coma e a ausência de função do tronco cerebral em todos os seus níveis.
- IV - O teste de apneia confirma a presença de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios com hipercapnia maior ou igual a 55mmHg (Piva, 2014).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**35.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as doenças cardíacas congênitas às suas respectivas características.

- (1) Tetralogia de Fallot
  - (2) Comunicação Interatrial
  - (3) Coartação de Aorta
  - (4) Persistência do Canal Arterial
  - (5) Transposição de grandes vasos da base
- ( ) A artéria pulmonar origina-se no ventrículo esquerdo e a aorta origina-se no ventrículo direito, sem comunicação entre a circulação sistêmica e a pulmonar.
- ( ) Estreitamento localizado próximo à inserção do canal arterial, culminando em pressão aumentada proximal ao defeito (cabeça e membros superiores) e diminuída distal à obstrução (corpo e membros inferiores).
- ( ) Caracteriza-se por defeito septal ventricular, estenose pulmonar, cavalgamento da aorta e hipertrofia ventricular direita.
- ( ) O sangue flui a partir do átrio esquerdo de maior pressão para dentro do átrio direito de menor pressão.
- ( ) O sangue flui da artéria aorta com maior pressão para a artéria pulmonar com menor pressão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

**36.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada tipo de som pulmonar a sua caracterização.

- (1) Sibilos
  - (2) Crepitantes ou Estertores
  - (3) Vesicular
  - (4) Estridor
- ( ) Som normal auscultado em toda a superfície dos pulmões, com exceção da região intraescapular superior e da área abaixo do manúbrio.
- ( ) Som produzido à medida que o ar atravessa passagens estreitas, a despeito da causa, que pode ser exsudação, inflamação, espasmo e tumor.
- ( ) Som resultante da passagem de ar através de fluido e de umidade.
- ( ) Som mais grosseiro que se relaciona com obstrução respiratória alta.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

**37.** Os sintomas como proteinúria maciça, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema são encontrados em

- (A) síndrome nefrítica.
- (B) síndrome nefrótica.
- (C) glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- (D) síndrome hemolítico-urêmica.
- (E) insuficiência renal aguda.

**38.** Com relação à infecção hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) São fatores de risco de infecção hospitalar: baixa idade, queimaduras, traumas, intoxicação, anestesia geral recente, uso de nutrição parenteral e múltiplas infusões venosas contínuas.
- (B) Suspeita-se de provável quadro infeccioso em pacientes que apresentam prostração, diminuição da proteína C reativa, distensão abdominal, aumento de peso, alcalose metabólica e bradicardia.
- (C) Os sítios de infecção hospitalar mais frequentes são: gastroenterites, meningites, endocardites, artrites sépticas e osteomielites.
- (D) A falta de adesão às regras de lavagem de mãos antes e depois de tocar nos pacientes e o uso de antimicrobianos de amplo espectro são causas menores ou secundárias de infecção hospitalar.
- (E) As infecções hospitalares ocorrem em média em 3 a 5% dos pacientes pediátricos em unidades de internação e são 3 a 5 vezes menos frequentes nas unidades de tratamento intensivo.

**39.** Sobre medidas de avaliação da dor em crianças, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A capacidade de diferenciar os graus de dor nas expressões faciais, apresentadas nas tabelas de avaliação da dor, parece ser razoavelmente estabelecida por volta dos três anos de idade.
- (B) As dimensões da dor – qualidade, localização e distribuição – podem variar, sem mudança na intensidade dessa dor.
- (C) A aplicabilidade das medidas para avaliação da dor em crianças independe de sua capacidade linguística e cognitiva.
- (D) A dor em criança somente pode ser avaliada por meio de medidas fisiológicas e autorrelato.
- (E) As medidas comportamentais mais utilizadas para avaliação da dor em pediatria levam em consideração itens como choro, expressão facial, movimentos das pernas e capacidade de ser consolado.

**40.** Sobre os cuidados de enfermagem a crianças em crise convulsiva, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Somente soro fisiológico pode ser utilizado para lavar equipos e catéteres quando se administra fenitoína, pois a mesma precipita quando misturada à glicose.
- (B) O diazepam é incompatível com muitas medicações; para administração endovenosa, é recomendado injetar lentamente e diretamente na veia ou por equipos o mais próximo possível do local de inserção do acesso venoso.
- (C) Cuidados de enfermagem incluem monitoração dos sinais vitais, observação do episódio convulsivo e registro dos eventos com precisão.
- (D) Torna-se impossível interromper o episódio convulsivo após o seu início, e nenhuma iniciativa deve ser realizada neste sentido, além da administração de medicamentos.
- (E) Durante uma convulsão tônico-clônica o profissional de enfermagem deve levar a criança ao leito e tentar imobilizá-la para evitar possíveis lesões.

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 66

##### ENFERMEIRO I (Pediatria)

01.	B	11.	B	21.	D	31.	E
02.	A	12.	D	22.	B	32.	D
03.	E	13.	D	23.	E	33.	C
04.	C	14.	E	24.	C	34.	B
05.	B	15.	B	25.	D	35.	A
06.	E	16.	E	26.	C	36.	C
07.	C	17.	D	27.	B	37.	B
08.	B	18.	A	28.	E	38.	A
09.	B	19.	E	29.	D	39.	ANULADA
10.	E	20.	A	30.	D	40.	E