



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

CADERNO DE QUESTÕES

EDITAL 02/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 13 - ENFERMEIRO I **Internação Clínica e Cirúrgica**

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 02/2011 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 13

ENFERMEIRO I – Internação Clínica e Cirúrgica

01.	A	11.	D	21.	B	31.	E
02.	E	12.	A	22.	B	32.	B
03.	C	13.	B	23.	E	33.	C
04.	A	14.	C	24.	B	34.	C
05.	D	15.	A	25.	C	35.	C
06.	C	16.	D	26.	E	36.	D
07.	E	17.	D	27.	E	37.	E
08.	A	18.	B	28.	A	38.	B
09.	D	19.	A	29.	B	39.	D
10.	A	20.	D	30.	A	40.	C



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada com caneta esferográfica, de tinta azul, na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 41, serão desconsideradas.
- 6 Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- 7 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 8 A duração da prova é de **três (3) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 9 O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova após transcorrida uma (1) hora do seu início.
- 10 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!



01. Quanto à dor no pós-operatório (PO), assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Todos os pacientes submetidos a operações sentem dor de intensidade moderada a forte.
- (B) O grau e a intensidade da dor dependem de vários fatores.
- (C) A orientação pré-operatória ao paciente pode ser um fator significativo na diminuição da intensidade da dor.
- (D) A dor intensa estimula a resposta ao estresse, que afeta os sistemas cardíaco e imunológico.
- (E) Os analgésicos opioides são comumente prescritos para a dor e para a agitação no PO imediato.

02. Em relação ao manejo da dor em cuidados paliativos, assinale **V** para as afirmações verdadeiras e **F** para as afirmações falsas.

- () A morfina não apresenta efeito teto.
- () As terapias medicamentosas e não medicamentosas devem ser associadas para o adequado manejo da dor.
- () Todos os opioides permitem que as doses sejam ajustadas de forma crescente, progressiva e segura, sem dose teto.
- () A metadona apresenta meia-vida longa e imprevisível.
- () Morfina é um analgésico que pode ser infundido por hipodermóclise.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V – V.

03. Em relação à bioética e a suas múltiplas abordagens, assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA**.

- (A) A bioética utiliza uma abordagem originada da realidade biomédica.
- (B) A bioética adota uma abordagem secular e global, pois dela participam diferentes visões de profissionais de saúde, filósofos, advogados, sociólogos, administradores, economistas, teólogos e leigos.
- (C) A bioética aborda tanto velhos quanto novos problemas, e a simples repetição das respostas tradicionais são suficientemente adequadas, sendo, portanto, imprescindível o conhecimento e a aplicação das discussões anteriores.
- (D) A bioética inclui os processos de tomada de decisão e as relações interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas: o paciente, sua família, seu médico, os demais profissionais, a comunidade e as demais estruturas sociais e legais.
- (E) As novas práticas de atenção à saúde são, cada vez mais, exercidas por equipes multiprofissionais, pressupondo-se a integração dos mesmos em um fazer comum, e a bioética surge, nesse contexto, com os dilemas oriundos do exercício desses profissionais.

04. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 311/2007, está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência acessível a toda população, sem riscos e sem danos. Com base nisso, o enfermeiro deve:

- I - recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- II - executar ou participar da assistência à saúde, sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
- III- divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

05. Considere as afirmações abaixo sobre pós-operatório em pacientes submetidos a transplante renal.

- I - A rejeição aguda pode ocorrer de 3 a 14 dias após o transplante.
- II - O rim recebido de um doador falecido pode não funcionar por 2 a 3 semanas após o transplante.
- III- Edema e poliúria podem ser considerados sinais de rejeição.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

06. A Nutrição Parenteral (NP) é um método para fornecer nutrição ao organismo através de uma via intravenosa. Com respeito a essa terapia, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) uma das indicações para uso de NP é um déficit de 10% no peso corporal em comparação com o peso pré-doença.
- (B) o elevado conteúdo de glicose nas soluções as torna um meio de cultura ideal para o crescimento bacteriano e fúngico.
- (C) o período de administração de um frasco de NP pode exceder 24 horas, pois o importante é que o paciente receba todo o conteúdo.
- (D) as soluções de NP suprem nutrientes como glicose, aminoácidos e vitaminas.
- (E) as fontes primárias de microorganismos para infecções do cateter são a pele e o canhão do mesmo.

07. Para determinar a medida de inserção de uma sonda nasoentérica para alimentação, deve-se, primeiramente, medir a distância entre a ponta do nariz e o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do apêndice xifóide. A essa distância deve-se acrescentar

- (A) zero cm.
- (B) 05 cm.
- (C) de 10 a 15 cm.
- (D) de 15 a 20 cm.
- (E) de 20 a 25 cm.

08. A trombose venosa profunda é uma das complicações potenciais graves no paciente em pós-operatório. Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta uma situação que aumenta o risco para ocorrência desse evento?

- (A) Hipoxemia.
- (B) Desidratação.
- (C) Repouso no leito.
- (D) Obesidade.
- (E) Baixo débito cardíaco.

09. Considere as afirmações abaixo sobre cirurgia bariátrica.

- I - Essa cirurgia é realizada apenas depois que fracassaram outras tentativas não cirúrgicas para perda de peso.
- II - Essa cirurgia pode amenizar ou solucionar condições mórbidas como diabetes melito, hipertensão arterial sistêmica e apneia do sono.
- III- Os procedimentos cirúrgicos bariátricos agem restringindo a capacidade de ingestão e aumentando a absorção dos nutrientes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

10. As feridas cicatrizam-se por diferentes mecanismos. Sobre o mecanismo de cicatrização por primeira intenção, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) Nesse tipo de cicatrização, ocorre pouca reação tissular.
- (B) Nesse tipo de cicatrização, o tecido de granulação fica visível.
- (C) Esse tipo de cicatrização ocorre nas feridas infectadas.
- (D) Esse tipo de cicatrização resulta em cicatriz profunda e ampla.
- (E) Para induzir esse tipo de cicatrização, deve-se inserir compressas de gaze.

11. Em relação a cuidados ao paciente em pré-operatório, assinale **V** para verdadeiro ou **F** para falso.

- () O momento ideal para orientações de pré-operatório é o próprio dia da cirurgia.
- () O principal propósito da suspensão de alimentos e líquidos é evitar aspiração.
- () Orientações sobre exercícios respiratórios devem ser evitadas, pois o paciente não conseguirá assimilá-las.
- () Os pacientes devem urinar imediatamente antes de se encaminharem ao bloco cirúrgico.
- () Em geral, não se realizam enemas, a menos que o paciente seja submetido a cirurgia abdominal ou pélvica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V – F.

12. Sobre cuidados com o paciente em pós-operatório (PO), assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) A expectativa é de que o paciente venha a urinar nas primeiras oito horas de PO.
- (B) Distensão abdominal é um sinal que aparece apenas em pacientes submetidos a cirurgia abdominal ou intestinal.
- (C) Caso o paciente não consiga urinar espontaneamente no PO imediato, a preferência é o cateterismo vesical de demora.
- (D) Em geral, a infecção de uma ferida operatória fica evidente no primeiro dia de PO.
- (E) Os analgésicos opioides não contribuem para constipação.

13. Após uma angioplastia coronariana transluminal percutânea, pode ocorrer sangramento retroperitoneal. São sintomas dessa complicação:

- (A) bradicardia, febre, dor nas costas.
- (B) dor nas costas e no flanco, taquicardia, hipotensão.
- (C) pressão arterial alta, dor nas costas e no flanco, febre.
- (D) sonolência, taquicardia, pressão alta.
- (E) débito urinário aumentado, bradicardia, sonolência.

14. Atualmente, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens, depois do câncer de pele não melanoma. Em caso de câncer de próstata, a prostatectomia radical laparoscópica favorece

- (A) a avaliação por palpação de nódulos.
- (B) o delineamento da proximidade do envolvimento dos feixes neurovasculares.
- (C) o curto período de permanência da sonda vesical de demora.
- (D) a abordagem cirúrgica através da bexiga.
- (E) a abordagem anatômica direta da bexiga.

15. Que precaução deve ser tomada logo após cirurgia de prótese total de quadril, a fim de prevenir luxação?

- (A) O paciente deve manter o posicionamento da perna em abdução.
- (B) O paciente deve manter flexão do quadril acima de 90°.
- (C) A cabeceira da cama do paciente deve ficar erguida num ângulo superior a 60°.
- (D) Quando sentado, o paciente não deve flexionar o joelho da perna operada.
- (E) Ao calçar meias ou sapatos, o paciente deve flexionar o quadril.

16. Considere as afirmações abaixo sobre sistema de aspiração úmida em drenagem torácica.

- I - Esse sistema requer que o líquido estéril seja instilado dentro dos compartimentos com selo d'água e de aspiração.
- II - Esse sistema possui válvulas de pressão positiva e negativa.
- III - O borbulhamento intermitente indica que o sistema não está funcionando de maneira adequada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

17. A resolução do COFEN n.º 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, refere que o Processo de Enfermagem possui cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas etapas, na ordem em que aparecem na resolução do COFEN.

- (A) I- Coleta de dados de Enfermagem; II- Prognóstico de Enfermagem; III- Planejamento de Enfermagem; IV- Implementação; V- Avaliação de Enfermagem.
- (B) I- Histórico de Enfermagem; II- Prognóstico de Enfermagem; III- Planejamento de Enfermagem; IV- Implementação; V- Avaliação de Enfermagem.
- (C) I- Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem; II- Diagnóstico de Enfermagem; III- Implementação; IV- Prescrição; V- Avaliação de Enfermagem.
- (D) I- Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem; II- Diagnóstico de Enfermagem; III- Planejamento de Enfermagem; IV- Implementação; V- Avaliação de Enfermagem.
- (E) I- Coleta de dados de Enfermagem; II- Planejamento de Enfermagem; III- Diagnóstico de Enfermagem; IV- Evolução de Enfermagem; V- Avaliação de Enfermagem.

18. Conforme a *NANDA-Internacional*, o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. Esses constituem a base para a seleção _____ de enfermagem e para o alcance _____ de enfermagem.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na ordem em que aparecem.

- (A) dos resultados – da prescrição
- (B) das intervenções – dos resultados
- (C) da avaliação – das intervenções
- (D) da avaliação – dos resultados
- (E) das intervenções – da prescrição

19. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de intervenção de enfermagem, conforme a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC).

- (A) Tratamento realizado por um enfermeiro com base no julgamento e no conhecimento clínico para melhorar os resultados do paciente/cliente.
- (B) Tratamento realizado por um enfermeiro com base no conhecimento do diagnóstico médico.
- (C) Diagnóstico realizado por um enfermeiro com base no julgamento e no conhecimento clínico.
- (D) Julgamento diagnóstico realizado por um enfermeiro com base no conhecimento do diagnóstico médico.
- (E) Julgamento diagnóstico com base no conhecimento clínico para melhorar os resultados de saúde do paciente/cliente.

20. A cirurgia é um dos principais tratamentos para os cânceres de cólon e reto, sendo que, algumas vezes, as colostomias são necessárias. Nesses casos, além de proporcionar alívio da dor e controlar os sinais vitais e o equilíbrio hídrico, o profissional de enfermagem deve estar atento

- (A) à frequência e aspecto das eliminações urinárias e ao surgimento de infecção anal.
- (B) ao surgimento de infecção anal e às condições de integridade da pele ao redor do estoma.
- (C) à frequência e aspecto das eliminações urinárias e ao surgimento de edema generalizado.
- (D) à frequência e ao aspecto das eliminações intestinais e às condições de integridade da pele ao redor do estoma.
- (E) à frequência e consistência das eliminações intestinais e ao risco de infecção urinária.

21. A encefalopatia e o coma hepático são complicações que podem ser causadas pela

- (A) gastrite.
- (B) cirrose.
- (C) esofagite.
- (D) hepatectomia.
- (E) duodenite.

22. Alguns pacientes, quando submetidos à colonoscopia, apresentam cólicas abdominais causadas por

- (A) peristalse ausente, que ocorre devido ao ar insuflado dentro do intestino durante o procedimento.
- (B) peristalse aumentada, que ocorre devido ao ar insuflado dentro do intestino durante o procedimento.
- (C) peristalse diminuída, que ocorre devido ao ar insuflado dentro do intestino durante o procedimento.
- (D) diminuição dos movimentos intestinais em decorrência do uso dos laxativos.
- (E) aumento dos movimentos intestinais em decorrência do uso do bário.

23. Considere as intervenções de enfermagem abaixo.

- I - Avaliar o balanço hídrico, incluindo a ingesta e o débito.
- II - Pesar diariamente o paciente no mesmo horário e na mesma balança, preferencialmente pela manhã, logo após o paciente urinar.
- III- Avaliar a frequência cardíaca apical, antes de administrar o glicosídeo cardíaco derivado do digitálico.

Quais devem ser realizadas em pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Alguns pacientes, quando submetidos a quimioterapia, podem apresentar alterações no sistema gastrointestinal, dando origem a sintomas como náuseas e vômitos. Em relação a esses dois sintomas, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) Náusea e vômitos são os efeitos colaterais menos comuns da quimioterapia.
- (B) Esses sintomas podem começar logo após a administração da quimioterapia, persistindo por um período de 24 a 48 horas.
- (C) Esses sintomas ocorrem apenas tardiamente e, na maioria dos casos, não são graves.
- (D) Técnicas de imaginação e relaxamento não são eficazes no combate a esses sintomas.
- (E) Refeições leves e pouco frequentes não são indicadas para o combate a esses sintomas.

25. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um cuidado de enfermagem necessário com pacientes em uso de sondas enterais.

- (A) Confirmar, através de exames radiológicos, se a sonda foi inserida corretamente em pacientes com nível de consciência diminuído.
- (B) Instruir o paciente a abaixar ligeiramente a cabeça e começar a engolir quando a sonda alcançar a nasofaringe.
- (C) Manter o paciente em decúbito dorsal e lateral, num ângulo de aproximadamente 15°, para evitar pneumonia aspirativa.
- (D) Observar possíveis deslocamentos da sonda, que podem ser causados por tosse ou vômitos excessivos.
- (E) Evitar administração de dieta fria e de forma rápida, para prevenir distensão abdominal e cólica.

26. Considere as afirmações abaixo, sobre úlceras de pressão.

- I - Pressão por tempo suficientemente longo gera trombose dos pequenos vasos e necrose tecidual, resultando em úlcera por pressão.
- II - Redução da circulação sanguínea e da nutrição da pele e dos tecidos subcutâneos (perfusão tecidual e periférica) aumenta o risco de úlcera por pressão.
- III- Atrito e umidade sobre a pele são fatores a serem considerados como causadores de úlcera por pressão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

27. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta cuidado de enfermagem necessário com pacientes em relação ao uso de sonda vesical de demora.

- (A) Avaliar criteriosamente, devido ao risco de infecção, se é imprescindível o uso de cateterismo vesical de demora.
- (B) Realizar higiene das mãos antes e após a manipulação do cateter para evitar risco de contaminação.
- (C) Fixar a sonda de demora para evitar tensão e tração da bexiga.
- (D) Avaliar sinais e sintomas de infecção do trato urinário como febre, mal-estar, calafrios, urina turva e fétida, e hematúria.
- (E) Desconectar o sistema de drenagem, para coleta de amostra de urina para cultura, ao primeiro sinal de infecção.

28. Em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente idoso hospitalizado, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

- (A) A infusão rápida de volume excessivo endovenoso pode produzir no idoso sobrecarga de líquidos e insuficiência cardíaca.
- (B) Quedas podem ser causa de lesões graves no idoso, por isso é necessário manter o paciente no leito, com contenção química.
- (C) Desidratação pode ocorrer devido à incontinência urinária, sendo necessária avaliação de restrição de líquidos.
- (D) O envelhecimento produz alterações nos vasos sanguíneos, sendo necessário uso permanente de oxigênio para manter o transporte do mesmo para os tecidos.
- (E) O uso de medicamentos para doenças crônicas sempre produz constipação e diarreia, o que torna necessária uma avaliação permanente, pois em alguns casos será preciso substituí-los.

29. Considere as seguintes afirmações, sobre os cuidados com paciente portador de diabetes melito.

- I - A insulina de ação rápida começa a fazer efeito de 5 a 15 minutos após a aplicação, tem pico de ação entre 40 a 50 minutos, e duração de 2 a 4 horas.
- II - A insulina de ação intermediária começa a fazer efeito de 3 a 4 horas após a aplicação, tem pico de ação entre 4 a 12 horas, e duração de 16 a 20 horas.
- III- A insulina de ação curta começa a fazer efeito de 30 minutos a 1 hora após a aplicação, tem pico de ação entre 2 a 3 horas, e duração de 16 a 20 horas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Assinale a alternativa que apresenta instrução correta para a medição da pressão arterial (PA).

- (A) É contraindicado conversar com o paciente durante a verificação da PA.
- (B) O tamanho do manguito não interfere na medida obtida.
- (C) Durante a medição da PA, o manguito não deve ser enrolado muito firmemente ao redor do braço do paciente.
- (D) Não é necessário registrar em qual braço a PA foi medida.
- (E) Existe desvantagem em palpar a pressão sistólica antes da ausculta.

31. O preparo para a alta de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que envolve orientações sobre o uso de inalador com dose metrificada (IDM) inclui:

- I - motivos para o uso do IDM.
- II - quantidade de medicação que permanece no IDM.
- III- mecanismo de ação do medicamento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

32. Assinale a alternativa que apresenta afirmação **INCORRETA** sobre cuidados de enfermagem na insuficiência renal aguda (IRA).

- (A) Em distúrbios hidroeletrólíticos graves, os medicamentos endovenosos devem ser administrados com o menor volume possível.
- (B) A alteração das transaminases é o mais importante indicador da oligúria.
- (C) É importante um cuidado cutâneo meticuloso, porque a pele pode estar seca ou suscetível à ruptura devido ao edema.
- (D) É importante monitorar a pressão arterial e o débito urinário.
- (E) A assepsia é essencial nas linhas invasivas ou cateteres, visando minimizar o risco de infecção.

33. No que se refere à avaliação neurológica de pacientes inconscientes, associe os dados de avaliação clínica a suas respectivas significâncias clínicas, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tamanho das pupilas
- (2) Hiperventilação
- (3) Assimetria facial
- (4) Rigidez de nuca
- (5) Reflexo de deglutição

- () indica hemorragia subaracnoide ou meningite.
- () está ausente em pacientes em coma.
- () pode sugerir início de um problema metabólico ou lesão do tronco cerebral.
- () constitui sinal de paralisia.
- () ajuda a determinar a localização da lesão.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a segunda coluna, de cima para baixo.

- (A) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- (B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
- (C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.

34. A Política Nacional de Humanização (PNH) proposta pelo Ministério da Saúde apresenta diretrizes gerais e específicas para sua implementação nos diferentes níveis de atenção. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta em relação às diretrizes da PNH para a atenção hospitalar.

- (A) As experiências exitosas e os processos de debate e de pactuação entre o nível federal e estadual deverão consolidar a humanização como uma estratégia comum em toda a rede de atenção.
- (B) As unidades de saúde garantirão a gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos usuários.
- (C) A visita aberta deve ser garantida por meio da presença de acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- (D) A humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, não podendo ser entendida como apenas um programa a mais a ser aplicado aos diversos serviços da atenção básica da rede.
- (E) O tema "humanização da assistência" inclui o debate de questões fundamentais que orientam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de toda a rede conveniada do SUS.

35. Assinale as afirmações abaixo, sobre princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, com **V** para verdadeiro, ou **F** para falso.

- () Igualdade de assistência à saúde, de acordo com a iniciativa privada conveniada, é um princípio ou diretriz do SUS.
- () Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde é um princípio ou diretriz do SUS.
- () Participação da comunidade é um princípio ou diretriz do SUS.
- () Regionalização do setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho é um princípio ou diretriz do SUS.
- () Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência é um princípio ou diretriz do SUS.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – V – V – V – F.

36. Considere as afirmações abaixo.

- I - Liderança é um processo que envolve persuadir e influenciar outras pessoas em direção a uma meta, e que se compõe de uma ampla gama de papéis.
- II - Integrar habilidades de liderança com a capacidade de executar funções administrativas é necessário quando o enfermeiro quer tornar-se um líder-administrador verdadeiro.
- III- À medida que entramos no século XXI, surge a necessidade de ir-se além dos modelos transformacionais de liderança, sendo que os conceitos emergentes apresentam o foco na estrutura hierárquica da instituição.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

37. Gaidzinski (1988) propõe um método de dimensionamento de pessoal de enfermagem que possibilita a identificação e análise de variáveis intervenientes nesse processo, tornando-o um instrumento auxiliar no planejamento e avaliação do serviço, uma vez que permite avaliar o quantitativo e o qualitativo de pessoal de enfermagem. Com base nisso, considere os itens abaixo.

- I - Carga média de trabalho da unidade.
- II - Tempo efetivo de trabalho.
- III- Índice de segurança técnica.

Quais variáveis devem ser identificadas para aplicação do método de Gaidzinski?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

38. Uma das importantes responsabilidades do enfermeiro é a determinação do nível de excelência da equipe na realização das tarefas que compõem seu trabalho. Isso é feito por meio de apreciações do desempenho. Sobre esse tema, assinale as afirmações abaixo, com **V** para verdadeiro, ou **F** para falso.

- () A avaliação mede o desempenho real do colaborador, mediante as descrições do trabalho/cargo.
- () A avaliação permite saber em que nível de excelência o colaborador realiza seu trabalho.
- () A avaliação gera informações sobre a necessidade de desenvolvimento do colaborador.
- () As apreciações ampliam o número de postos de trabalho e as respectivas descrições do cargo.
- () As apreciações possibilitam elaborar um instrumento para demonstrar as metas da organização.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – F.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – V – V – V – F.

39. Considere as afirmativas abaixo sobre higienização de mãos.

- I - Vários estudos demonstram a eficácia da higienização das mãos com produto alcoólico em substituição à lavagem das mãos.
- II - A lavagem das mãos com água e sabão não deve ser realizada quando nelas houver sujeira visível.
- III- De maneira prática, sabemos que, após três ou quatro aplicações de solução alcoólica, sentimos necessidade de lavar as mãos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

40. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta característica desejável em um antisséptico.

- (A) Rapidez de ação.
- (B) Baixa toxicidade.
- (C) Instabilidade.
- (D) Amplo espectro de ação.
- (E) Efeito cumulativo.

