

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 39

ENFERMEIRO I (Hemodiálise)

01.	C	11.	A	21.	C
02.	D	12.	A	22.	E
03.	A	13.	C	23.	E
04.	A	14.	C	24.	B
05.	C	15.	C	25.	D
06.	E	16.	E		
07.	B	17.	D		
08.	B	18.	A		
09.	D	19.	E		
10.	D	20.	C		



EDITAL Nº 04/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 39 - ENFERMEIRO I
(Hemodiálise)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Sobre o uso de medicamentos em pacientes com doença renal crônica (DRC), considere as afirmações abaixo.

- I - O medicamento SEVELAMER®, utilizado como quelante intestinal de fosfato, não deve ser administrado com alimentos.
- II - Não é recomendado o uso de heparina em gestantes em terapia hemodialítica.
- III- As sobras da ampola de ferro parenteral devem ser descartadas; e a solução diluída para uso intravenoso tem estabilidade por 12 horas em temperatura ambiente.
- IV- Vitamina D3 (calcitriol) é usada para hipercalcemia e hiperparatireoidismo secundário à DRC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

02. Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 11, de 13 março de 2014, que estabelece os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de diálise, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A amostra da solução de diálise (dialisato) deve ser coletada imediatamente após o dialisador, no final da sessão.
- () O valor máximo permitido no dialisato é de 200 (duzentos) UFC/mL e o nível de ação é de 50 (cinquenta) UFC/mL.
- () A rotina da coleta de amostras do dialisato, assim como o seu registro, deve ser semestral.
- () Em caso de sinais e sintomas de bacteremia ou reação pirogênica durante a hemodiálise, deve-se proceder imediatamente a coleta de amostra do dialisato e enviar para análise.
- () O exame de contagem de endotoxinas e bacterioscópico deve ser realizado na amostra do dialisato.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) V – V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – V – F.

03. Segundo Silva e Lucena (2011), ingestão excessiva de líquidos e ingestão excessiva de sódio são fatores relacionados ou fatores de risco para qual Diagnóstico de Enfermagem?

- (A) Volume de líquidos excessivo.
- (B) Risco de desequilíbrio do volume de líquidos.
- (C) Risco de perfusão renal ineficaz.
- (D) Risco de desequilíbrio eletrolítico.
- (E) Nutrição desequilibrada: mais que as necessidades corporais.

04. Sobre o conteúdo do capítulo VII (Segurança Ocupacional), da RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico e Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Para o pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização e armazenamento de resíduos, a realização de exame médico está prevista em dois momentos: na admissão e em caso de demissão por justa causa.
- (B) Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização, obedecendo o calendário previsto nesse programa ou naquele adotado pelo estabelecimento.
- (C) Os trabalhadores, uma vez imunizados, necessitam de controle laboratorial sorológico para avaliação da resposta imunológica.
- (D) O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada sobre manejo dos resíduos, incluindo sua responsabilidade em relação à higiene pessoal, assim como a higiene dos materiais e dos ambientes.
- (E) A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de equipamentos de proteção individual, bem como a necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação.

05. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – RESOLUÇÃO COFEN nº 311/2007 – das Responsabilidades e Deveres, assinale a alternativa que apresenta uma ação **INCORRETA**.

- (A) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
- (B) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
- (C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, sem exceção.
- (D) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.
- (E) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.

06. Paciente transplantado renal, tendo realizado biópsia do enxerto, teve sua prescrição de enfermagem alterada. Foi acrescentado o Diagnóstico de Enfermagem "Risco de sangramento". Assinale a alternativa que apresenta a definição desse diagnóstico, conforme NANDA 2015-2017 (NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION).

- (A) Vulnerabilidade à redução da circulação sanguínea para os rins, que pode comprometer a saúde.
- (B) Vulnerabilidade devido à lesão localizada no tecido subjacente.
- (C) Vulnerabilidade à alteração na epiderme e/ou derme, que pode comprometer a saúde.
- (D) Vulnerabilidade ao distúrbio na circulação e coagulação.
- (E) Vulnerabilidade à redução do volume de sangue, que pode comprometer a saúde.

07. Paciente, 32 anos, foi submetido à cirurgia de transplante renal e está utilizando medicamentos imunossupressores para evitar rejeição do órgão.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os medicamentos a seus respectivos efeitos adversos (MANFRO, 2014).

- (1) Ciclosporina
- (2) Micofenolato Mofetil
- () Gastrointestinais
- () Nefrotoxicidade
- () Hematológicos
- () Hiperplasia gengival
- () Neurotoxicidade

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
- (B) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
- (C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (D) 2 – 2 – 1 – 2 – 2.
- (E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.

08. Sobre o transplante renal, assinale a alternativa correta.

- (A) A hemodiálise é o melhor tratamento para pacientes com doença renal crônica com mais de 60 anos.
- (B) A idade avançada não deve ser considerada critério de exclusão para o transplante renal.
- (C) A definição da etiologia da doença renal crônica não é importante na avaliação para transplante.
- (D) Pacientes que apresentam muitas intercorrências na diálise podem ser considerados prioritários para transplante renal.
- (E) O transplante renal não pode ser realizado antes de o paciente entrar em programa de diálise.

09. No que diz respeito às Diretrizes Gerais para a Implementação da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), nos diferentes níveis de atenção, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Grupos de trabalho de humanização, com plano de trabalho definido, devem ser implantados, estimulados e fortalecidos.
- () Práticas terapêuticas devem ser estimuladas, e o uso de medicamentos deve ser adequado e racionalizado, eliminando-se ações preventivas desnecessárias.
- () Deve-se ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a administração, promovendo-se a gestão participativa.
- () Deve-se reforçar o compromisso individual de cada profissional, com estímulo à autonomia de gestão e valorização objetiva e individual em todas as práticas de atenção à saúde.
- () Devem-se adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando-se a privacidade e promovendo-se uma ambiência acolhedora e confortável.
- () Devem-se promover ações de incentivo e valorização da jornada integral ao SUS, do trabalho em equipe e da participação em processos de educação permanente que qualifiquem a ação e a inserção dos trabalhadores na rede SUS.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V – F – F.
- (C) F – V – F – F – V – F.
- (D) V – F – V – F – V – V.
- (E) V – V – V – F – F – V.

10. Paciente implantou, há 4 semanas, um cateter duplo-lúmem, de longa permanência tunelizado e com *cuff*. Quando o enfermeiro manuseou o cateter para iniciar a sessão de hemodiálise, percebeu que o acesso vascular infundia solução salina sem resistência, mas a aspiração de uma das vias do cateter estava com disfunção. Sobre essa disfunção do cateter, assinale a afirmação correta.

- (A) Trata-se de uma disfunção precoce do cateter.
- (B) Essa disfunção é decorrente da inserção inadequada, com posição errônea.
- (C) É obrigatório o reposicionamento ou a substituição do cateter com fluoroscopia, quando ocorre essa disfunção.
- (D) A formação de um coágulo de fibrina ou de um trombo mural pode ser a causa dessa disfunção de cateter.
- (E) A remoção do cateter e o implante de novo acesso vascular devem ser considerados como primeira conduta.

11. Paciente masculino, 62 anos, portador de diabetes *mellitus* tipo 2 há 20 anos e tabagista ativo, dá entrada no serviço de Emergência. Ao ser avaliado, o mesmo se encontra dispnéico, com frequência respiratória de 30mpm, saturação de oxigênio em 80%, queixa de inapetência há três meses, emagrecimento, soluços e, há um mês, apresenta vômitos pela manhã. Os exames laboratoriais mostram uma taxa de filtração glomerular de 8mL/min/1,73m². Com base nesses dados, pode-se concluir que o paciente se encontra no estágio _____ de doença renal crônica. Devido aos sintomas respiratórios sugestivos de _____ e ao quadro de _____, há a indicação de tratamento hemodialítico imediato. Na primeira sessão de hemodiálise, deve-se manter baixo _____ para evitar a _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) V – congestão – uremia – o fluxo de sangue – síndrome de desequilíbrio
- (B) IV – congestão – azotemia – o bicarbonato – acidose
- (C) V – derrame pleural – hipercalemia – o fluxo de sangue – hemólise
- (D) IV – broncoespasmo – anemia – o sódio – síndrome de desequilíbrio
- (E) V – broncoespasmo – azotemia – o bicarbonato – reação ao primeiro uso

12. Sobre a prevalência de doença cardiovascular, no paciente portador de doença renal crônica, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O risco de doença cardiovascular aumenta proporcionalmente à medida em que o ritmo de filtração glomerular estimada cai abaixo de 60mL/min.
- () A alteração do metabolismo interno, gerado pela diminuição da função dos rins, desacelera o processo aterosclerótico e reduz o fenômeno de calcificação vascular.
- () A prevalência de hipertrofia ventricular esquerda é elevada entre os pacientes portadores de doença renal crônica, em todos os seus estágios, independente da faixa etária analisada.
- () A presença da fístula arteriovenosa para realização de hemodiálise não tem impacto direto na hemodinâmica cardíaca.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – F – V – V.

13. Unidade de hemodiálise hospitalar recebe diariamente muitos pacientes portadores de germes multirresistentes (GMR).

Com relação às medidas gerais recomendadas para os pacientes portadores de GMR, considere as afirmações abaixo.

- I - É necessário utilizar luvas para o contato com o paciente portador de GMR ou com o ambiente contaminado (cama, grades, mesa de cabeceira, bombas de infusão), e as luvas devem ser trocadas entre cada procedimento realizado no mesmo paciente.
- II - Entre as trocas de luvas, é obrigatório realizar a higiene de mãos.
- III - Os equipamentos e superfícies ao redor do paciente devem ser desinfetados com hipoclorito de sódio, uma vez ao turno, para descontaminação do ambiente.
- IV - Após o atendimento ao paciente, retirar as luvas e o avental, imediatamente após sua utilização. A manutenção do uso desses equipamentos é causa mais frequente de contaminação do ambiente.
- V - Estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetros que entraram em contato com o paciente GMR devem ser mantidos dentro do quarto de isolamento e de uso individual do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I, III e V.
- (C) Apenas I, II, IV e V.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

14. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os germes às respectivas características e aspectos.

- (1) *Enterococcus spp* resistente à vancomicina
- (2) *Acinetobacter spp* resistente aos carbapenêmicos
- (3) *Clostridium difficile*
- () A transmissão desse germe através do ambiente, de roupas ou de outras superfícies inanimadas é maior quando comparada à de outras bactérias.
- () Esse germe coloniza o trato gastrointestinal, a pele e o ambiente.
- () Após o contato com o paciente ou com o ambiente, é obrigatória a higienização das mãos com água e sabonete, pois o álcool não elimina os esporos da bactéria.
- () Os fatores de risco para infecção/colonização por esse germe são: hospitalização prolongada, uso de antibióticos de amplo espectro, uso de antiácidos, uso de corticoides, gravidade da doença, procedimentos cirúrgicos prévios e baixos níveis de albumina.
- () O paciente infectado por esse germe deverá ser mantido por precaução, fora de contato, em quarto individual ou coorte, até 48 horas após o término da diarreia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 3 – 2.
- (B) 3 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3 – 2 – 3.
- (E) 2 – 1 – 2 – 3 – 3.

15. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organização e funcionamento dos serviços correspondentes. São objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

- (A) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades curativas.
- (D) vigilância nutricional e orientação alimentar.
- (E) formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção.

16. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os processos de higienização das mãos às ocasiões em que devem ser postos em prática, conforme o capítulo VII, da Segurança Do Paciente – Higienização das mãos (ANVISA, 2009).

- (1) Higienização de mãos com água e sabonete.
 (2) Higienização de mãos com preparação alcoólica, quando não estiverem visivelmente sujas.
- () Antes e após ir ao banheiro.
 () Antes e após a remoção de luvas.
 () Antes de preparo e manipulação de medicamentos.
 () Após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico.
 () Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 2 – 2 – 1 – 1.
 (B) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
 (C) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
 (D) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.
 (E) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.

17. Sobre adesão à higienização das mãos por profissionais da saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - São fatores de risco para a baixa adesão às recomendações voltadas à higienização das mãos: pertencer ao sexo feminino, ser médico, trabalhar em unidades de emergência.
- II - São fatores apontados pelos profissionais de saúde para explicar a baixa adesão às práticas de higienização das mãos: ceticismo a respeito da importância da higienização das mãos, pias insuficientes e mal posicionadas, bem como esquecer de higienizar as mãos.
- III- São barreiras apontadas para a não adesão às práticas de higienização das mãos: falta da participação ativa na promoção da higienização das mãos no nível individual ou institucional e ausência de clima institucional de segurança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

18. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta uma atribuição do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde, conforme a Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986.

- (A) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.
 (B) Consulta de enfermagem.
 (C) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de decisões imediatas.
 (D) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
 (E) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

19. A Bioética aborda os _____ problemas de forma _____. A Bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço de diálogo _____, ou seja, de colaboração e interação de diferentes áreas de conhecimento.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) velhos – tradicional – interdisciplinar
 (B) velhos – contemporânea – multiprofissional
 (C) novos – tradicional – interdisciplinar
 (D) velhos – tradicional – multiprofissional
 (E) novos – contemporânea – interdisciplinar

20. Sobre os sinais e sintomas do sistema renal, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) Hipotensão pode ser um fator de risco de mortalidade nos pacientes que realizam hemodiálise.
 (B) Uso de solução de diálise com baixo teor de sódio e alta velocidade de ultrafiltração são fatores predisponentes de câimbras em pacientes dialíticos.
 (C) A acidose metabólica é um distúrbio em que há elevação na concentração de bicarbonato, gerando um pH baixo no fluido extracelular.
 (D) Dose de diálise inadequada pode desencadear sintomas de náuseas e vômitos.
 (E) O edema pode ocorrer pelo aumento da pressão hidrostática vascular, diminuição da pressão oncótica e obstrução linfática ou venosa.

21. Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), considere as afirmações abaixo.

- I - A NR-32 não se aplica à prestação de assistência à saúde da população em serviços de saúde de baixa complexidade.
- II - De acordo com a NR-32, príons não são considerados agentes de risco biológico com probabilidade de exposição ocupacional.
- III- De acordo com a NR-32, todo equipamento deve ser submetido à prévia descontaminação para que seja realizado o serviço de manutenção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um princípio da diálise peritoneal.

- (A) A superfície média de troca do peritônio em adulto é $1,0\text{m}^2$ a $1,3\text{m}^2$.
- (B) Difusão, ultrafiltração e convecção são considerados princípios fundamentais.
- (C) O transporte de solutos ocorre por difusão e convecção.
- (D) Há três barreiras que separam o dialisato e o sangue capilar: a parede capilar, o interstício e a camada de células mesoteliais.
- (E) O modelo de transporte de solutos corresponde a três tamanhos de poros: poros ultrapequenos, poros pequenos e poros médios.

23. É correto afirmar que a solução de diálise peritoneal ideal

- (A) compõe-se de água, eletrólitos e agente osmótico.
- (B) compõe-se de água, eletrólitos e tampão.
- (C) não precisa ser estéril.
- (D) não precisa corrigir distúrbios do equilíbrio ácido-base.
- (E) deve repor eletrólitos e nutrientes deficientes no organismo.

24. Em relação às soluções de diálise peritoneal, assinale a alternativa que contém apenas agentes osmóticos.

- (A) Dextrose, lactose, aminoácido e glicerol.
- (B) Dextrose, aminoácido, glicerol, xilitol e icodextrina.
- (C) Dextrose, lactose, icodextrina.
- (D) Icodextrina, sódio, lactose.
- (E) Dextrose, icodextrina e lactose.

25. Sobre gerenciamento de conflitos em enfermagem, considere as afirmações abaixo.

- I - Permitir que apenas as emoções determinem como conduzir um conflito é impedir que a dimensão racional interfira nessa condução.
- II - Faz parte do enfoque gerencial contemporâneo admitir que o conflito é inerente às organizações, não sendo considerado como patológico.
- III- Na administração de conflitos, denomina-se acomodação a estratégia que visa satisfazer as exigências das partes envolvidas, que, ao buscar soluções alternativas, escolhe a mais favorável.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.