HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 46

MÉDICO I (Patologia e Citologia)

01.	C	11.	B	21.	A	31.	C
02.	D	12.	A	22.	A	32.	D
03.	B	13.	C	23.	D	33.	E
04.	E	14.	E	24.	A	34.	B
05.	A	15.	B	25.	C	35.	D
06.	E	16.	A	26.	D	36.	D
07.	B	17.	ANULADA	27.	E	37.	E
08.	C	18.	E	28.	A	38.	D
09.	E	19.	B	29.	D	39.	D
10.	C	20.	B	30.	A	40.	C

EDITAL Nº 04/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 46 - MÉDICO I
(Patologia e Citologia)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Paciente do sexo feminino, 25 anos, apresenta nódulo mamário firme, móvel, bem circunscrito. Foi realizada punção aspirativa por agulha fina e esfregaço para exame citopatológico. Qual dos achados abaixo melhor se relaciona ao caso descrito acima?

- (A) Esfregaços com grande celularidade e perda da coesão celular.
- (B) Esfregaços celulares sem identificação de células mioepiteliais.
- (C) Esfregaços celulares com dois componentes, um epitelial denso e coeso e um estromal.
- (D) Presença de componente estromal com células mioepiteliais esparsas.
- (E) A presença de atipias nucleares exclui o diagnóstico.

02. Paciente do sexo masculino, 68 anos, mau estado geral, apresenta derrame pleural. Dentre as alternativas abaixo, qual achado citopatológico do derrame pleural possui relação com a hipótese diagnóstica de tuberculose?

- (A) Alta contagem de células mesoteliais típicas.
- (B) Alta contagem de macrófagos.
- (C) Baixa contagem de linfócitos.
- (D) Alta contagem de linfócitos.
- (E) Alta contagem de células mesoteliais reacionais.

03. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a citopatologia do carcinoma ductal bem diferenciado de pâncreas.

- (A) Relação núcleo/citoplasma aumentada.
- (B) Escassos grupamentos celulares.
- (C) Nucléolos pequenos.
- (D) Grupamentos celulares compactos.
- (E) Frequentes vacúolos citoplasmáticos contendo mucina.

04. Dentre as alternativas abaixo, qual **NÃO** representa achado citopatológico em um linfonodo reacional?

- (A) Linfócitos polimorfonucleares.
- (B) Imunoblastos.
- (C) Plasmócitos.
- (D) Macrófagos com corpos tingíveis.
- (E) Macrófagos gigantes.

05. Paciente do sexo masculino, 74 anos, apresenta aumento volumétrico indolor na região da parótida direita. A punção aspirativa obteve fluido escuro, tendo o exame citopatológico mostrado células epiteliais grandes, de citoplasma eosinofílico e granular, bem como linfócitos de aspecto reacional.

O diagnóstico mais provável, nesse caso, é

- (A) tumor de Warthin.
- (B) adenoma pleomórfico.
- (C) sialoadenite crônica.
- (D) adenoma monomórfico.
- (E) mioepitelioma.

06. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a citologia do liquor.

- (A) O aumento da contagem de macrófagos e leucócitos sempre indica presença de uma patologia.
- (B) A presença de leucócitos polimorfonucleares sempre indica processo inflamatório agudo.
- (C) O *cryptococcus neoformans* é o principal agente causal de meningite fúngica em pacientes debilitados ou imunocomprometidos.
- (D) A presença de plasmócitos, mesmo sem atipias, desacompanhado de outras células inflamatórias, é compatível com diagnóstico de plasmocitoma.
- (E) O diagnóstico de carcinoma metastático é difícil de ser estabelecido, uma vez que as células carcinomatosas são similares a linfócitos.

07. Paciente do sexo feminino, 30 anos, apresenta tireoide dolorosa, com aumento moderado de volume. Refere forte gripe há 15 dias. Punção aspirativa por agulha fina demonstrou células foliculares e numerosos macrófagos, alguns gigantócitos tipo Langhans e linfócitos. O diagnóstico mais provável para este caso é tireoidite

- (A) de Hashimoto.
- (B) de Quervain.
- (C) de Riedel.
- (D) de palpação.
- (E) linfocítica.

08. Assinale a alternativa que apresenta os critérios citopatológicos diagnósticos para carcinoma papilar de tireoide.

- (A) Grupos celulares papiliformes, microfóculos e fendas nucleares.
- (B) Inclusões citoplasmáticas intranucleares, fendas nucleares e material colóide abundante.
- (C) Inclusões citoplasmáticas intranucleares, fendas nucleares e arranjos celulares papiliformes.
- (D) Corpos psamomatosos, microfóculos e linfócitos.
- (E) Corpos psamomatosos, fendas nucleares e abundante material colóide.

09. Assinale a alternativa que apresenta a condição clínica em que é realizada a pesquisa de células *decoy* no sedimento urinário.

- (A) Glomerulopatia membranosa.
- (B) Cistite eosinofílica.
- (C) Carcinoma urotelial.
- (D) Refluxo vesicoureteral.
- (E) Paciente transplantado.

10. Assinale a alternativa que **NÃO** representa critério diagnóstico de adenocarcinoma em líquido de ascite.

- (A) Presença de muco no interior do citoplasma.
- (B) Hiper Cromasia nuclear.
- (C) Grupamentos com espaços intercelulares na forma de "janelas".
- (D) Grupamentos celulares tridimensionais.
- (E) Nucléolo grande e irregular.

11. Células representativas do segmento uterino baixo podem ser observadas em esfregaços cervicovaginais de pacientes com

- (A) metaplasia escamosa.
- (B) conização uterina prévia.
- (C) salpingites.
- (D) endocervicitis.
- (E) endometrites.

12. Esfregaço cervicovaginal apresenta macrocélulas com macronúcleos, multinucleação, discreta hiper cromasia nuclear e citoplasma com policromasia e vacúolos.

Qual alternativa representa a situação descrita acima?

- (A) Efeito radioterápico.
- (B) Alterações de reparo.
- (C) Atipias de significado indeterminado em células escamosas.
- (D) Alterações celulares relacionadas ao uso de dispositivo intrauterino.
- (E) Alterações celulares relacionadas ao uso de estrogênio.

13. Esfregaço cervicovaginal, apresentando lençóis de células de aspecto poligonal, com núcleos aumentados, nucléolos proeminentes e cromatina de distribuição irregular caracterizam um reparo atípico.

Empregando o Sistema de Bethesda, qual resultado representa a situação descrita acima?

- (A) Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade – inflamação.
- (B) Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade – metaplasia.
- (C) Presença de anormalidades epiteliais – células escamosas atípicas de significado indeterminado.
- (D) Presença de anormalidades epiteliais – lesão escamosa intraepitelial de baixo grau.
- (E) Presença de anormalidades epiteliais – lesão escamosa intraepitelial de alto grau.

14. Em uma amostra cervicovaginal, a presença de multinucleação amoldada, inclusões eosinofílicas intranucleares e núcleos com aspecto de vidro despolido estão associados a

- (A) efeito radioterápico.
- (B) papiloma vírus.
- (C) citomegalovírus.
- (D) reparo atípico.
- (E) herpes vírus.

15. São achados celulares observados em esfregaços cervicovaginais atróficos, com **EXCEÇÃO** de

- (A) fundo do esfregaço apresentando debris celulares, leucócitos e células escamosas profundas degeneradas.
- (B) nucléolos proeminentes.
- (C) núcleos de contornos regulares.
- (D) *blue blobs*.
- (E) pseudoparaceratose.

16. Assinale a alternativa correta sobre lesões escamosas intraepiteliais de baixo grau, em amostra cervicovaginal.

- (A) Compreendem lesões coilócíticas, displasias leves e neoplasias intraepiteliais de grau I.
- (B) Caracterizam-se pela presença de restos celulares e hemorragia.
- (C) Presença de coilócito é indispensável para firmar este resultado.
- (D) Possuem comportamento biológico similar às lesões de alto grau.
- (E) Apresentam alterações celulares em células escamosas intermediárias e parabasais.

17. Assinale a alternativa que apresenta os critérios para reconhecimento de uma lesão escamosa intraepitelial de alto grau em uma amostra cervicovaginal.

- (A) relação núcleo/citoplasma alta – nucléolo proeminente – hipercromasia nuclear
- (B) relação núcleo/citoplasma baixa – perda da polaridade nuclear – nucléolo proeminente
- (C) relação núcleo/citoplasma alta – hipercromasia nuclear – perda da polaridade nuclear
- (D) relação núcleo/citoplasma alta – membrana nuclear lisa – nucléolo proeminente
- (E) relação núcleo/citoplasma baixa – membrana nuclear lisa – nucléolo proeminente

18. A presença de grupos de células de aparência colunar, formando rosetas, com núcleos hipercromáticos e pseudoestratificados que, por vezes, se projetam para periferia em uma amostra cervicovaginal corresponde a

- (A) adenocarcinoma endocervical invasor.
- (B) adenocarcinoma endometrial invasor.
- (C) endocervicite crônica.
- (D) células endocervicais hiperplásico-regenerativas.
- (E) adenocarcinoma endocervical *in situ*.

19. Em caso de adenocarcinoma endocervical invasor, identificado em exame citopatológico cervicovaginal de rotina, qual das alternativas abaixo **NÃO** representa critério diagnóstico?

- (A) Diátese tumoral.
- (B) Pequenos nucléolos.
- (C) Sobreposição nuclear.
- (D) Ocasionais atipias escamosas concomitantes.
- (E) Citoplasma vacuolizado.

20. Assinale a alternativa correta sobre carcinoma escamoso em cérvix uterina.

- (A) O Sistema de Bethesda para relato de citologia cervicovaginal, em sua última revisão, preconiza a especificação sobre o grau de diferenciação celular.
- (B) A presença de alterações ceratóticas, na ausência de atipias nucleares, não é suficiente para interpretação de carcinoma escamoso.
- (C) A diátese tumoral é visível somente nas formas não queratinizantes de carcinoma escamoso.
- (D) Macronúcleolos são observados costumeiramente no carcinoma escamoso.
- (E) Células escamosas atípicas, monomórficas são características dos carcinomas escamosos queratinizantes.

21. Assinale a alternativa correta em relação à hematopatologia.

- (A) O achado laboratorial mais proeminente na leucemia mieloide crônica (LMC) é a leucocitose com escalonamento, acúmulo de mielócitos e basofilia absoluta. Clinicamente observa-se fraqueza, cansaço e aumento de volume abdominal com esplenomegalia.
- (B) A translocação t(9;22), conhecida como cromossoma Philadelphia, está presente na maioria das doenças mieloproliferativas.
- (C) A reação leucemoide (RL) ou leucocitose reacional pode ser diferenciada da LMC por características clínico-laboratoriais. A presença de processo inflamatório ou infeccioso e hemograma com basofilia favorece RL, enquanto o predomínio de mieloblastos favorece LMC.
- (D) Em relação às doenças mieloproliferativas, somente a mielofibrose primária (MFP) apresenta, ao exame clínico, esplenomegalia.
- (E) A presença de grupos coesos de micromegacariócitos com osteoesclerose e acentuada hipoplasia eritroide são altamente sugestivas de trombocitemia essencial (TE).

22. Sobre o perfil imuno-histoquímico dos carcinomas de mama, segundo a Organização Mundial da Saúde, (OMS, 2012), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O carcinoma medular é tipicamente triplo-negativo.
- () O carcinoma micropapilar invasor é tipicamente estrógeno positivo.
- () O carcinoma secretor é tipicamente triplo-negativo.
- () O carcinoma neuroendócrino (não de pequenas células) é tipicamente triplo-negativo.
- () O carcinoma metaplásico é tipicamente triplo-negativo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – V.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – F – V – F – F.
- (E) F – F – V – V – V.

23. Em relação ao carcinoma adenoide cístico da glândula salivar, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) trata-se de uma neoplasia de células ductais e mioepiteliais.
- (B) ocorre frequentemente em glândulas salivares menores.
- (C) exibe propensão à invasão perineural.
- (D) pode exibir uma matriz condroide, assim como no adenoma pleomórfico.
- (E) exibe padrões histológicos cribriforme, tubular e sólido.

24. Dentre os marcadores abaixo, qual **NÃO** costuma ser expresso em tumores estromais gastrointestinais?

- (A) CD56
- (B) CD34
- (C) Vimentina
- (D) CD117
- (E) DOG1

25. Assinale a alternativa que apresenta a localização mais frequente, na cavidade oral, do tumor de células granulares.

- (A) Assoalho da boca.
- (B) Língua.
- (C) Gengiva.
- (D) Palato mole.
- (E) Palato duro.

26. Em relação ao diagnóstico de adenocarcinoma primário do colo uterino, assinale a alternativa correta.

- (A) No diagnóstico diferencial com adenocarcinoma primário endometrial, a imuno-histoquímica positiva para p16 e negativa para vimentina favorece o diagnóstico de lesão primária de endométrio.
- (B) A imunopositividade para p53 é rara nos adenocarcinomas primários endocervicais.
- (C) O aspecto histopatológico mais frequentemente encontrado é o glandular pouco diferenciado com secreção de mucina.
- (D) O adenocarcinoma viloglandular pode ser revestido por epitélio dos tipos intestinal, endometrial ou endocervical, apresentando apenas atipias leves.
- (E) O carcinoma de células claras (*glassy cell*) é considerado um subtipo pouco diferenciado de adenocarcinoma endometriode com numerosas mitoses.

27. Assinale a alternativa correta em relação às neoplasias ovarianas.

- (A) A presença de lesões em peritônio, em linfonodos ou em pulmão confirma o diagnóstico de neoplasia serosa ovariana maligna, independentemente dos aspectos morfológicos do tumor primário.
- (B) Em 30%-50% dos casos, os carcinomas mucinosos ovarianos são menos comuns que os serosos e bilaterais.
- (C) Os carcinomas endometrioides ovarianos correspondem a 2%-5% dos carcinomas e raramente apresentam metaplasia escamosa.
- (D) *Struma ovarii* se refere a um teratoma ovariano com predomínio de tecido estromal endometrial.
- (E) As neoplasias mucinosas ovarianas primárias podem apresentar imunopositividade para CEA, CK-20 e CDX-2 e imunonegatividade para PAX-8.

28. Exame de necropsia realizado em mulher de 60 anos que faleceu em decorrência de AVC revela nódulo amarelado na cortical renal, medindo 0,4cm. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao provável diagnóstico para este caso.

- (A) Tumor de Wilms.
- (B) Adenoma papilar renal.
- (C) Oncocitoma.
- (D) Carcinoma renal.
- (E) Angiomiolipoma.

29. Sobre tumores da placenta e doença trofoblástica gestacional, assinale a alternativa correta.

- (A) Atipia citológica acentuada das células trofoblásticas (núcleos bizarros e hiper cromáticos) é característica do coriocarcinoma, não estando presente nas molas hidatiformes completas ou parciais.
- (B) A ausência de cisternas exclui o diagnóstico de mola hidatiforme completa inicial.
- (C) O p57 positivo serve para confirmar o diagnóstico de mola hidatiforme completa.
- (D) O diagnóstico de mola invasora não pode ser determinado por curetagem, sendo necessária a ressecção cirúrgica (histerectomia).
- (E) Na mola hidatiforme parcial, não podem ser identificadas partes fetais, âmnio ou cordão umbilical.

30. Dermatose acantolítica suprabasal com paraceratose suprajacente, corpos redondos e papilomatose é consistente com

- (A) Doença de Darier.
- (B) Doença de Hailey-Hailey.
- (C) pênfigo vulgar.
- (D) penfigoide bolhoso.
- (E) dermatite herpetiforme.

31. Lesão intraepidérmica pagetoide com perfil imuno-histoquímico positivo para citoqueratinas e negativo para CEA e S100 sugere

- (A) Doença de Paget.
- (B) melanoma cutâneo intraepidérmico.
- (C) Doença de Bowen.
- (D) reticulose pagetoide.
- (E) ceratose seboreica clonal.

32. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à Malacoplaquia.

- (A) É uma doença inflamatória da bexiga.
- (B) Lesões similares podem também ocorrer no cólon.
- (C) Os corpos de *Michaelis-Gutmann* são tipicamente encontrados nesse tipo de lesão.
- (D) A sua causa é totalmente desconhecida.
- (E) Ocorre com maior frequência em pacientes transplantados imunossuprimidos.

33. Em relação às pericardites, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O diagnóstico de pericardite tuberculosa pode ser feito por biópsia.
- (B) Pericardite crônica é acompanhada frequentemente por fibrose e calcificação.
- (C) Pericardite constrictiva pode resultar de tratamento radioterápico.
- (D) Pericardite purulenta pode ser acompanhada de importante hiperplasia mesotelial.
- (E) O diagnóstico de pericardite somente pode ser estabelecido após o exame histopatológico de amostras pericárdicas.

34. Assinale a alternativa correta sobre os carcinomas uroteliais não invasivos planos (carcinoma *in situ*).

- (A) Tendem a ser indistinguíveis dos papilomas à cistoscopia.
- (B) Diferentemente dos carcinomas papilares uroteliais, são raramente multifocais.
- (C) Raramente evoluem para um carcinoma urotelial invasivo.
- (D) A baixa coesão celular explica o fato de, muito raramente, serem detectados em exames citopatológicos de urina.
- (E) As células malignas não precisam, necessariamente, ocupar toda a espessura do urotélio.

35. Com relação a metástase óssea, considere os itens abaixo.

- I - Frequentemente é multifocal.
- II - Ocorre mais frequentemente em esqueleto axial.
- III- É sempre osteolítica e nunca osteoblástica.

Quais são características da metástase óssea?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

36. Considere as características abaixo, no que se refere a tumores benignos de partes moles.

- I - São muito frequentemente superficiais.
- II - Muito frequentemente medem menos de 5,0cm.
- III- A taxa de recidiva é alta quando não são ressecados com margem cirúrgica ampla.

Quais estão relacionadas a esse tipo de tumor?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

37. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considere as afirmações abaixo.

- I - O SUS proporciona atendimento e internação domiciliares, tais como procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II - A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros é permitida para as atividades de apoio à assistência à saúde, como os laboratórios de anatomia patológica.
- III- Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao SUS, conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

38. Considere as afirmações abaixo no que se refere à Ética.

- I - No raciocínio bioético, a análise dos fatos e a análise dos valores envolvidos são elementos importantes na tomada de decisões.
- II - A interdisciplinaridade possibilita o diálogo entre diferentes formas de conhecimento, permitindo, assim, que os diferentes pensamentos se complementem uns aos outros.
- III- Na Bioética, a repetição das respostas tradicionais é adequada e não significa que o passado não tenha importância. A memória é um dos fundamentos da interdisciplinaridade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

39. Considere as afirmações abaixo em relação às doenças intersticiais.

- I - O padrão clássico de pneumonia de hipersensibilidade crônica está constituído de granulomas de células gigantes não necrosantes, associados a infiltrado inflamatório mononuclear predominantemente linfocitário disperso.
- II - Marcada fibrose com distorção arquitetural predominantemente subpleural, presença de envolvimento focal, focos fibroblásticos e ausência de achados sugerindo diagnósticos alternativos, como exposição ambiental, uso de drogas lícitas ou doenças do colágeno, são critérios diagnósticos de fibrose pulmonar idiopática.
- III- Faveolamento pulmonar costuma ocorrer nas fases iniciais de pneumonia organizante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

40. Considere as afirmações abaixo em relação às lesões fúngicas pulmonares.

- I - A lesão primária pulmonar da criptococose é totalmente diferente da lesão inicial da histoplasbose.
- II - O criptococo não é encontrado no escarro em casos de envolvimento pulmonar.
- III- A coloração Fontana Masson pode ajudar no reconhecimento de criptococos cápsula-deficiente porque, diferentemente das demais leveduras, os criptococos produzem um pigmento semelhante à melanina.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.