

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 52

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Emergência Adulto ou Pediátrica)

01.	B	11.	D	21.	B
02.	D	12.	B	22.	E
03.	E	13.	A	23.	B
04.	E	14.	C	24.	E
05.	E	15.	B	25.	D
06.	C	16.	ANULADA		
07.	E	17.	D		
08.	C	18.	A		
09.	C	19.	A		
10.	A	20.	E		



**EDITAL Nº 04/2016**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 52 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
**(Emergência Adulto ou Pediátrica)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Em relação ao trabalho noturno, estudos apontam que, neste período, há mais demora para a efetivação do atendimento, mesmo que haja menor demanda de pacientes, tendo em vista as equipes reduzidas e a indisponibilidade de alguns serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento. Isso afeta, também, os “tempos-porta” e, conseqüentemente, os desfechos. Assinale a alternativa que indica, de forma correta, o tempo-porta máximo para a realização de eletrocardiograma em paciente com dor torácica e sensação de aperto.

- (A) 5 minutos.
- (B) 10 minutos.
- (C) 15 minutos.
- (D) 40 minutos.
- (E) 60 minutos.

**02.** O uso de drogas vasopressoras tem como finalidade não apenas a adequação dos valores da pressão arterial média, mas também a melhoria de parâmetros de oxigenação tecidual que representam o mais importante objetivo da circulação, que é o suprimento do metabolismo corporal mesmo em condições não ideais. Considere as afirmações abaixo em relação aos cuidados com o paciente crítico, com possibilidade de morte iminente.

- I - A norepinefrina é um vasoconstritor e é indicada no tratamento do choque, cuja finalidade é reduzir a pressão arterial. Além disso, um dos cuidados de enfermagem é avaliar arritmias cardíacas, hipertensão, dor torácica, confusão mental e retenção urinária.
- II - O nitroprussiato de sódio é um vasodilatador arterial e venoso. É indicado nas crises hipertensivas que exigem terapia parenteral. Deve ser administrado em bomba de infusão observando e registrando a frequência cardíaca.
- III- A nitroglicerina é um dilatador dos vasos coronarianos e é utilizada para o alívio e prevenção da dor torácica típica. Deve ser preparada com frasco livre de PVC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**03.** Segundo a Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

Considere os objetivos abaixo.

- I - Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II - Formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e outros agravos.
- III- Proporcionar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Quais são objetivos do SUS?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**04.** As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, da Constituição Federal. Com relação ao SUS, considere os princípios abaixo.

- I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- III- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- V - Direito à informação, por parte das pessoas assistidas, sobre sua saúde.

Quais são princípios do SUS?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas III, IV e V.
- (D) Apenas I, II, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**05.** Os serviços de saúde são responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados. Assinale a alternativa **INCORRETA** no que se refere às normas e exigências legais, desde o momento da geração dos resíduos até a sua destinação final.

- (A) O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (RSSs) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e de direcioná-los de modo seguro e eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
- (B) O gerenciamento dos RSSs deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo desses resíduos.
- (C) Todo gerador de RSS deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- (D) O plano de gerenciamento de RSS, ao ser elaborado, deve ser compatível com as normas locais, relativas à coleta, ao transporte e à disposição final desses resíduos, estabelecidas pelos órgãos responsáveis por essas etapas.
- (E) O manejo dos RSSs é entendido como a ação de gerenciar os resíduos somente no que se refere ao extraestabelecimento, desde a geração até a disposição final.

**06.** A doença vascular cerebral é a patologia neurológica que mais acomete a população adulta no mundo atualmente. No Brasil, é a principal causa de morte em pessoas acima de sessenta anos e a principal causa isolada de óbito, como também a primeira causa de incapacidade por sequelas neurológicas. Sobre o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), assinale a alternativa correta.

- (A) Os AVCIs são hemorrágicos e ocorrem em 80% dos casos de acidente vascular cerebral em consequência da doença trombótica ou embólica.
- (B) A obstrução do fluxo sanguíneo ocasionada por hemorragia provoca alterações estruturais e funcionais no parênquima cerebral em função da maior demanda de oxigênio e glicose no tecido cerebral.
- (C) No atendimento pré-hospitalar, pode-se usar a escala de Cincinnati, que é a escala de avaliação para rápida suspeição dos sinais indicativos de acidente vascular cerebral.
- (D) O diagnóstico se baseia exclusivamente na avaliação clínica e nos exames de imagem.
- (E) O regime de tratamento do AVCI com trombolítico endovenoso é monitorizar a pressão arterial a cada uma hora, nas duas primeiras horas após o início do tratamento, e depois a cada seis horas.

**07.** Conforme as disposições da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, em relação à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
- II - Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
- III - Para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5cm abaixo do bocal.
- IV - Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**08.** Com relação ao uso de estratégias para segurança do paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A comunicação efetiva é bidirecional, e, para que esta ocorra com segurança, é necessário que haja resposta e validação das informações emitidas.
- (B) O uso de adornos, como anéis, pulseiras e relógio, não é permitido em ambiente hospitalar, bem como as unhas devem estar curtas e com o esmalte íntegro.
- (C) Na escala de Braden original, os escores de risco para úlcera por pressão (UP) para adultos são classificados em: risco baixo, moderado e elevado. Na validação desses escores, na população brasileira, o escore  $\leq 15$  foi definido como de risco para o desenvolvimento de UP.
- (D) As soluções eletrolíticas concentradas devem receber atenção especial devido à sua grande utilização e ao alto risco de dano ao paciente, inclusive morte associada ao uso inadequado. Devem, portanto, ser armazenadas e manipuladas de forma controlada e segura.
- (E) A comunicação ineficaz encontra-se entre as causas-raízes de mais de 70% dos erros na atenção à saúde. Interrupções na comunicação ou a falta de trabalho em equipe são fatores que contribuem para a ocorrência de eventos adversos e resultados insatisfatórios.

**09.** A UP é toda lesão na pele e/ou nos tecidos subjacentes, geralmente desenvolvida sobre uma proeminência óssea, como resultado da pressão isolada ou da pressão em combinação com a fricção e/ou o cisalhamento.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os estágios às suas respectivas características.

- (1) Estágio I
- (2) Estágio II
- (3) Estágio III
- (4) Estágio IV

- ( ) Pele intacta com eritema não branqueável.
- ( ) Perda parcial de tecido, envolvendo epiderme e derme. Pode também se apresentar como flictena fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou sero-hemático.
- ( ) Perda total da epiderme e derme. O tecido subcutâneo pode estar visível, sem exposição de ossos, tendões ou músculos.
- ( ) Perda total da epiderme, derme e tecido subcutâneo com exposição de ossos, tendões e/ou músculos.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 4 – 3 – 1.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 4 – 1 – 2.

**10.** Assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) em relação às disposições do Código de Ética de Enfermagem.

- ( ) O Código de Ética de Enfermagem prevê que o profissional tem o direito a exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- ( ) É proibido ao profissional de enfermagem executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte.
- ( ) É direito do profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- ( ) É de responsabilidade do profissional de enfermagem posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – F – V – F.

**11.** No que se refere às penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, considere os itens abaixo.

- I - Advertência escrita
- II - Multa
- III- Censura
- IV - Suspensão do Exercício Profissional
- V - Cassação do direito ao Exercício Profissional

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II, III, IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

**12.** A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adota as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto aos cinco momentos para a higienização das mãos. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, os cinco momentos da higienização das mãos.

- (A) Antes de contato com o paciente, após risco de exposição a fluidos corporais, após a realização de procedimento asséptico, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- (B) Antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- (C) Após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, antes de contato com as áreas próximas ao paciente, antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico.
- (D) Antes de contato com o paciente, após contato com o paciente, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com as áreas próximas ao paciente, após realização de procedimento asséptico.
- (E) Após contato com as áreas próximas ao paciente, antes de contato com o paciente, antes de risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após a realização de procedimento asséptico.

**13.** Em relação ao acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Alguns dos sintomas sugestivos de AVCI, são: parestesia, parestesia, confusão, disartria e cefaleia intensa.
- ( ) A endarterectomia é o principal procedimento cirúrgico para pacientes com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico agudo, com até três horas de evolução.
- ( ) Somente pacientes que chegarem à Emergência com mais de três horas de evolução dos sintomas de AVCI deverão ser submetidos à terapia trombolítica.
- ( ) Antes de o paciente receber o trombolítico, é aplicada a escala *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS), ferramenta de avaliação padronizada que ajuda a avaliar a gravidade do acidente vascular cerebral.
- ( ) O sangramento é o efeito colateral mais comum da administração de trombolítico, não sendo recomendadas punções intravenosas e sondagens nas primeiras 24 horas após a infusão do mesmo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – F – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – F.
- (E) V – F – V – F – V.

**14.** São sinais e sintomas de cetoacidose diabética, **EXCETO**:

- (A) anorexia.
- (B) vômitos.
- (C) hipoglicemia.
- (D) polidipsia.
- (E) hálito cetônico.

**15.** No que se refere à efetiva reanimação cardiopulmonar, a equipe de saúde, em um primeiro momento, deve

- (A) fornecer ventilação artificial através de cateter nasal.
- (B) promover circulação artificial através de compressão cardíaca externa com uma frequência de 100 compressões por minuto.
- (C) aplicar desfibrilação assim que for constatado o problema, independentemente do ritmo cardíaco.
- (D) administrar noradrenalina.
- (E) ventilar o paciente a cada três segundos, se não houver resistência.

**16.** Considere as afirmações abaixo no que se refere à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

- I - A limitação do fluxo de ar é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases nocivos.
- II - O fator de risco ambiental mais importante para a DPOC é o tabagismo.
- III- Os três principais sintomas da DPOC são: dispneia aos esforços, tosse seca e produção de escarro.
- IV- O uso de broncodilatadores é fundamental no tratamento da DPOC.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**17.** As crises hipertensivas podem ocorrer em pacientes cuja hipertensão tenha sido mal controlada, ou que não tenha sido diagnosticada, ou naqueles pacientes que interromperam subitamente o tratamento.

Sobre as crises hipertensivas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Na emergência hipertensiva, a pressão deve ser reduzida imediatamente para evitar a lesão de órgãos-alvo.
- (B) Na urgência hipertensiva, são recomendados medicamentos com doses orais e de ação rápida.
- (C) Nas emergências hipertensivas, os medicamentos de escolha são aqueles que possuem efeito imediato, como vasodilatadores intravenosos.
- (D) As urgências hipertensivas são elevações agudas da pressão arterial, potencialmente fatais, que exigem tratamento imediato em um ambiente de terapia intensiva.
- (E) É necessário monitoramento hemodinâmico extremamente rigoroso da pressão arterial e do estado cardiovascular do paciente durante o tratamento da crise hipertensiva.

**18.** A Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, esses princípios.

- (A) Transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- (B) Transversalidade; integralidade de assistência; direito à informação.
- (C) Indissociabilidade entre atenção e gestão; universalidade de acesso; integralidade de assistência.
- (D) Participação da comunidade; igualdade da assistência à saúde; preservação da autonomia.
- (E) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos; direito à informação; participação da comunidade.

**19.** A asma é caracterizada por ser uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, compreendendo cerca de 5% dos atendimentos na Emergência. No Brasil, a asma é a quarta causa de internação hospitalar no Sistema Único de Saúde.

Considere as afirmações abaixo com relação à asma.

- I - Os principais sintomas da crise de asma são a falta de ar, chiado ou aperto no peito e tosse que, em geral, piora nos períodos da manhã e da noite ou após exercício físico.
- II - Os marcadores de risco da asma na Emergência são: a hospitalização ou atendimento na emergência nos últimos 90 dias; emprego de antitérmicos por via sistêmica; baixo nível socioeconômico e precárias condições de habitação urbana.
- III - A avaliação da gravidade da crise de asma visa estabelecer as prioridades desse paciente ao chegar à Emergência. São sinais de risco iminente: saturação de oxigênio menor que 92%, cianose e confusão mental.
- IV - Os principais fatores que desencadeiam a crise de asma são: infecção viral das vias aéreas, poluentes atmosféricos, exercício físico e alérgenos inalatórios. Mudanças climáticas, drogas e estressores emocionais não são fatores desencadeantes de asma.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**20.** Considere as situações abaixo no que se refere à posição da criança para o procedimento de enema.

I - Com a face para baixo em sentido do ventre e joelhos e quadris flexionados em direção ao tórax.

II - Deitada sobre o lado esquerdo com a perna esquerda reta e a direita flexionada no quadril e joelho, colocada confortavelmente em cima da perna esquerda.

III - Sentada no vaso sanitário ou troninho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**21.** No que se refere à prevenção e à obstrução da sonda de gastrostomia, os medicamentos em comprimidos devem ser

(A) bem macerados e misturados com água antes da instalação. Deve-se periodicamente, limpar os dispositivos usados para alimentações contínuas com 2mL-5mL de água.

(B) bem macerados e misturados com água e alimento antes da instalação. Deve-se periodicamente, limpar os dispositivos usados para alimentações contínuas com 5mL-10mL de água.

(C) bem macerados e misturados com água antes da instalação. Deve-se periodicamente, limpar os dispositivos usados para alimentações contínuas com 5mL-15mL de água.

(D) bem macerados e misturados com água e alimento antes da instalação. Deve-se periodicamente, limpar os dispositivos usados para alimentações contínuas com 10mL-20mL de água.

(E) bem macerados e misturados com água antes da instalação. Deve-se periodicamente, limpar os dispositivos usados para alimentações contínuas com 15mL-20mL de água.



**22.** Considere os sinais abaixo, apresentados pelas crianças, em relação ao procedimento de aspiração das vias aéreas.

- I - Dificuldade de respirar.
- II - Inquietação.
- III- Dificuldade de se alimentar ou de sugar.
- IV- Palidez.
- V - Narinas exageradamente abertas.
- VI- Som de bolhas de ar ouvido através do muco.

Quais configuram indicações para a sucção?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas III, V e VI.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

**23.** Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, os sintomas que se manifestam em crianças vítimas de envenenamento, quando da avaliação da alteração do sensório.

- (A) Ansiedade, agitação, ataxia, alucinações, perda da consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor, coma.
- (B) Ansiedade, agitação, alucinações, perda da consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor, coma.
- (C) Agitação, alucinações, ataxia, sudorese, perda da consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor, coma.
- (D) Alucinações, palidez, bradipneia, perda da consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor.
- (E) Ansiedade, alucinações, ataxia, salivação, pele fria e pegajosa, perda da consciência, tonteiras, confusão mental, letargia, estupor, coma.

**24.** Considere os itens abaixo com relação às causas mais frequentes do choque distributivo em crianças.

- I - Anafilaxia
- II - Sepsis
- III- Perda do controle neural
- IV- Depressão miocárdica e dilatação

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**25.** No momento da avaliação de criança com Diabetes Mellito, devem ser observados sinais cardinais do diabetes. Quais são eles?

- (A) Poligastralgia, Polipepsia e Polidipsia.
- (B) Polialgia, Poliúria e Policetonúria.
- (C) Poliglicose, Polipepsia e Polidipsia.
- (D) Polifagia, Poliúria e Polidipsia.
- (E) Polipepsia, Poliúria e Polidisfagia.