

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 59

ENFERMEIRO I (Pediatria)

01.	D	11.	B	21.	B	31.	D
02.	E	12.	B	22.	ANULADA	32.	B
03.	B	13.	D	23.	C	33.	A
04.	C	14.	D	24.	ANULADA	34.	C
05.	A	15.	C	25.	E	35.	B
06.	C	16.	E	26.	B	36.	D
07.	D	17.	C	27.	C	37.	E
08.	C	18.	D	28.	A	38.	C
09.	B	19.	A	29.	E	39.	B
10.	A	20.	E	30.	D	40.	D



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 05/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 59 - ENFERMEIRO I
(Pediatria)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, régua, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova. (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 12 Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Assinale a afirmação correta sobre Ética e Bioética.

- (A) A Bioética aborda os novos problemas de forma contemporânea, desconsiderando sempre a memória para que ocorra um processo de construção.
- (B) A Ética busca as justificativas para as ações, muito embora tenha uma abordagem global e interdisciplinar.
- (C) As informações que os pacientes fornecem, quando de seu atendimento em um hospital, assim como os resultados de exames e procedimentos realizados com finalidade diagnóstica ou terapêutica, são de sua propriedade e de toda equipe multiprofissional, que tem direito de usar as informações livremente.
- (D) A Bioética inclui os processos de tomada de decisão, as relações interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas, estimula a reflexão e discussão sobre problemas.
- (E) O direito à privacidade, bem como o dever de confidencialidade que todos os profissionais de saúde devem observar, se extingue após a morte do paciente.

02. Considere os direitos abaixo.

- I - Direito e proteção à vida e à saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer forma de discriminação.
- II - Direito a ser hospitalizado, quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa.
- III- Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização, bem como receber visitas.

Quais desses direitos a Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, assegura a crianças e adolescentes?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa correta em relação ao direito à vida e à saúde garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

- (A) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam apenas o nascimento seguro e em condições dignas de existência.
- (B) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de cinco anos.
- (D) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência de um dos pais ou responsável, em um turno, escolhido pelo trabalhador de saúde.
- (E) Apenas os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.

04. Considere as afirmações abaixo sobre a segurança do paciente.

- I - Ao se pensar o cuidado, deve ser considerada a implantação de barreiras organizacionais efetivas para impedir a ocorrência de erros ou diminuir a sua probabilidade e impacto nos pacientes e na organização, por meio de boas práticas, como, por exemplo, os seis certos na medicação e a identificação dos pacientes.
- II - O sucesso na gestão da segurança do paciente depende de uma comunicação aberta e não punitiva sobre os eventos adversos e falhas de segurança, em que todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.
- III - Um dos enfoques atuais de gestão da segurança é o desenvolvimento de sistemas de indicadores de monitoramento, com o objetivo de comparar instituições, identificar problemas e situações susceptíveis de melhoria e controlar o efeito das eventuais intervenções.
- IV - O desenho dos processos de melhoria quando da identificação de problemas de segurança deve ser regulamentado internamente mediante normas ou protocolos adaptados pelos atores envolvidos na assistência, sem a prerrogativa de serem aprovados pela alta gestão e chefias intermediárias dos serviços de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

05. Em relação aos maus-tratos infantis, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os conceitos às respectivas caracterizações.

- (1) Síndrome de Munchausen por procuração
 - (2) Incesto
 - (3) Abuso emocional
 - (4) Negligência infantil
 - (5) Síndrome do bebê sacudido
-
- () Falha de um dos pais ou outra pessoa legalmente responsável pelo bem-estar da criança em prover suas necessidades básicas em um nível de cuidado adequado.
 - () Forma grave de abuso infantil causada pelo sacudimento violento do lactente ou de criança pequena.
 - () Abuso infantil no qual cuidadores deliberadamente exageram ou inventam histórias ou ainda induzem sintomas. Inclui abuso físico, emocional ou psicológico e tem por objetivo a gratificação do cuidador.
 - () Refere-se à tentativa deliberada de destruir ou prejudicar a autoestima ou competência da criança. Pode ser manifestada por rejeição, isolamento, agressão verbal ou pressão excessiva sobre a criança.
 - () Qualquer atividade sexual entre membros da família, sem necessidade de haver relação de sangue.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
- (B) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

06. Assinale a afirmação correta em relação ao cuidado de enfermagem à família da criança hospitalizada.

- (A) O acompanhante é uma pessoa significativa para a criança, sendo um representante de sua rede social que irá acompanhá-la durante um turno a ser escolhido pelo profissional de saúde durante sua hospitalização.
- (B) A importância do relacionamento humanizado, no âmbito hospitalar, com o familiar da criança, permite um olhar sensível para a assistência, muito embora a família deva ser orientada quanto aos cuidados referentes à criança somente no momento da alta hospitalar.
- (C) O profissional de enfermagem deve estar atento para os sentimentos enfrentados pelos familiares durante a fase da hospitalização, bem como estar sensível à participação da família no processo de cuidado da criança hospitalizada.
- (D) É de extrema relevância que a família não se envolva no processo de cuidado durante a hospitalização com objetivo de preservar a integralidade da saúde da criança.
- (E) Compartilhar o cuidado de enfermagem com a família leva a sérios problemas no engajamento desta e da criança no plano terapêutico.

07. Considere as afirmações abaixo.

- I - O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.
- II - O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, avaliação de enfermagem.
- III- A avaliação de enfermagem compreende o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- IV - O diagnóstico de enfermagem compreende o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- V - O processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, embora dificulte a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.

Quais estão corretas, de acordo com a Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e V.

08. Sobre a Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A humanização implica orientar práticas de atenção e gestão do SUS a partir das vivências concretas dos sujeitos, desconsiderando o seu entorno.
- (B) Deve ser entendida como a valorização de uma parcela dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde: os trabalhadores da saúde.
- (C) A Política Nacional de Humanização (PNH) fortalece o trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade nas redes corporativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- (D) A PNH tem como parâmetros para implementação de ações na atenção hospitalar a garantia de visita aberta, da presença do acompanhante e de sua rede social, independente da dinâmica de cada unidade hospitalar e peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- (E) Na atenção hospitalar, a implementação da PNH prevê a implantação de mecanismos de recepção duros aos usuários sem escuta à população e trabalhadores.

09. O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por uma deficiência parcial ou completa do hormônio insulina.

Sobre o DM, assinale a alternativa correta.

- (A) A prioridade no atendimento às crianças em cetoacidose diabética deve ser a administração de insulina.
- (B) Infecções recorrentes e infecções dos tratos vaginal e urinário, especialmente com *Candida albicans*, são frequentemente um sinal precoce de DM tipo 2.
- (C) São manifestações comuns da hipoglicemia: náuseas e vômitos, dor abdominal, letargia, confusão, palidez e sudorese.
- (D) Conforme o local de aplicação da insulina, sua ação pode ter diferentes tempos de absorção; por exemplo, na perna a absorção tende a ser mais rápida que no abdome.
- (E) São considerados valores ideais de glicemia para crianças entre um e três anos de idade e pré-escolares (menores de seis anos), antes das refeições: 90-130mg/dL.

10. Sobre a Fibrose Cística, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () É uma doença genética crônica grave, caracterizada por pneumopatia (obstrutiva e inflamatória), disfunção pancreática e excesso de sódio e cloro no suor.
- () O pulmão acaba colonizado por *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas aeruginosa* ou *Burkholderia cepacia*, levando à disfunção pulmonar progressiva.
- () A insuficiência pancreática ocorre em todos os pacientes, por isso utilizam enzimas.
- () Quando os dois pais são recessivos, há 25% de chance de o filho ter a doença.
- () É importante promover a socialização e o contato entre os pacientes com fibrose cística.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) F – F – V – F – F.
- (E) V – F – F – V – V.

11. A traqueostomia é uma abertura cirúrgica na traqueia que pode ser realizada de forma emergencial ou eletiva. As crianças submetidas a uma traqueostomia devem receber diversos cuidados de enfermagem.

Os cadarços de traqueostomia ficam firmemente ajustados, mas permitem a introdução de ____ dedo(s). O cateter de aspiração é inserido ____ da cânula de traqueostomia.

O estoma da traqueostomia requer cuidado diário. A avaliação inclui observar _____. A pele deve ser mantida limpa e seca.

A criança deve descansar por _____ depois de cada aspiração; em seguida o processo é repetido até que a traqueia fique limpa.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) dois – até o meio – sinais de infecção – 20 segundos
- (B) um – até o final – sinais de infecção e lesões de pele – 30 a 60 segundos
- (C) três – até o final – lesões de pele – 90 segundos
- (D) um – até o meio – sinais de infecção e lesões de pele – 30 a 60 segundos
- (E) dois – até o final – secreções e hiperemia – 10 a 20 segundos

12. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre as manifestações clínicas das convulsões.

- (A) É característica da convulsão parcial simples: frequência variável, duração inferior a 30 segundos e não comprometimento da consciência do paciente.
- (B) É característica da crise convulsiva de ausência: maior frequência antes dos três anos de idade, duração maior que 10 segundos e breve perda de consciência do paciente.
- (C) É característica da convulsão mioclônica o paciente apresentar contraturas súbitas breves de um grupo muscular, podendo ou não ser simétricas.
- (D) É característica da convulsão tônico-clônica o paciente apresentar movimentos espasmódicos violentos enquanto o tronco e as extremidades sofrerem relaxamentos ritmados, podendo haver incontinência urinária e fecal.
- (E) É característica da convulsão parcial complexa o paciente apresentar amnésia em relação ao evento, ter a consciência prejudicada e frequente comprometimento pós-ictal.

13. Sobre a varicela, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O agente etiológico é o vírus da varicela-zoster.
- (B) A prevenção é possível através da imunização na infância. A doença não confere imunidade.
- (C) A transmissão ocorre por contato direto, disseminação de gotículas e objetos contaminados.
- (D) O período de incubação é geralmente de 14-16 dias, e a transmissão ocorre somente após a erupção das lesões.
- (E) São complicações da varicela: abscessos, celulites, pneumonia, sepses, encefalite, varicela hemorrágica e trombocitopenia.

14. Considere as alternativas abaixo sobre apendicite na criança.

- I - A apendicite é a inflamação do apêndice vermiforme, sendo a causa mais comum de cirurgia abdominal na infância. A idade média das crianças é de 10 anos.
- II - O primeiro sintoma de apendicite é dor periumbilical seguida de náuseas, dor no quadrante inferior esquerdo e, mais tarde, vômitos com febre.
- III- A perfuração do apêndice pode ocorrer em um prazo de aproximadamente 48 horas da queixa inicial de dor.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

15. Sobre o tratamento da encefalopatia hepática, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se manter a sonda nasogástrica aberta.
- (B) A lactulose deve ser administrada até produzir diarreia leve.
- (C) Hemorragia, infecção, constipação, distúrbios hidroeletrólíticos e hipervolemia são complicações que agravam a encefalopatia.
- (D) Deve-se evitar a sedação.
- (E) Deve-se evitar o uso de medicamentos que aumentem o risco de disfunção renal.

16. Sobre a coqueluche, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A tosse é mais comum no início da manhã, consistindo em episódios curtos e rápidos, seguidos de inspiração súbita associada a um som alto, tipo guincho.
- () A transmissão ocorre através de contato direto ou disseminação de gotículas da pessoa infectada, além de contato indireto com objetos contaminados.
- () O período de incubação é de 6-20 dias.
- () Febre alta súbita, mais frequente à noite, aumento da frequência cardíaca, vômitos, calafrios e mal-estar estão entre as manifestações mais comuns.
- () É uma infecção aguda das vias aéreas causada pelo micro-organismo *Bordetella pertussis*.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

17. Um dos componentes mais importantes de uma avaliação completa de saúde é a identificação dos marcos do desenvolvimento, a fim de detectar rapidamente e com segurança crianças cujo nível de desenvolvimento encontra-se abaixo do esperado para a idade e, que, portanto, precisam de maiores investigações.

Assinale a afirmação correta sobre as etapas do desenvolvimento normal do lactente.

- (A) Aos dois meses já consegue levantar a cabeça e a parte frontal do peitoral, sustentando seu peso nos antebraços.
- (B) A partir dos quatro meses demonstra sorriso social em resposta a diversos estímulos.
- (C) A capacidade de rolar intencionalmente do decúbito ventral para o dorsal ocorre por volta dos cinco meses, já a habilidade para rolar do decúbito dorsal para o ventral ocorre aproximadamente aos seis meses.
- (D) O rastejamento (impulsionar-se para frente com a barriga no chão) progride até o engatinhar, com as mãos e joelhos (com a barriga no chão) até os seis meses de vida.
- (E) Aos nove meses aprende a sentar sozinho com apoio e começa a explorar os arredores nesta posição em vez de deitado.

18. Considere as afirmações abaixo sobre a alergia ao leite de vaca (ALV).

- I - A ALV é um distúrbio multifacetado, representando reações sistêmicas adversas e gastrointestinais locais à proteína do leite de vaca.
- II - Os principais objetivos dos cuidados de enfermagem são evitar a exposição dos lactentes à proteína do leite de vaca, desencorajando a amamentação logo que diagnosticada a ALV.
- III - As enfermeiras desempenham papel importante na identificação de potencial alergia à proteína do leite de vaca e no aconselhamento apropriado dos pais com relação a sinais e sintomas.
- IV - Manifestações clínicas respiratórias, como rinite, bronquite, asma, sibilância, espirros, tosse e secreção nasal crônica são comuns, podendo indicar sensibilidade ao leite de vaca.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

19. A Nutrição Parenteral Total (NPT) é a administração de todos os nutrientes, incluindo água, eletrólitos, carboidratos (glicose), aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais (oligoelementos), sendo indicada para todo paciente em que a nutrição oral livre, por gavagem ou sonda enteral, for impossível, insuficiente, perigosa ou contraindicada.

Sobre esse tipo de nutrição, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A solução de NPT deve ser preparada em condições estéreis, sendo obrigatório para a sua instalação o uso de máscara cirúrgica, avental e luvas estéreis.
- (B) A natureza altamente irritante da glicose concentrada impede o uso de veias periféricas pequenas na maioria dos casos.
- (C) As principais responsabilidades da enfermagem são controle da sepse, monitorização da velocidade de infusão e avaliação da tolerância do paciente à solução.
- (D) A infecção relacionada ao cateter é a complicação mais frequente da NPT prolongada.
- (E) Cuidados com a glicemia, níveis de sódio e potássio são de extrema importância e fazem parte do cuidado de enfermagem.

20. Lactente com infecção respiratória por adenovírus exige precaução

- (A) de contato.
- (B) de aerossóis.
- (C) de contato e de gotículas.
- (D) padrão e de aerossóis.
- (E) padrão, de contato e de gotículas.

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as fases do tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) a suas respectivas características.

- (1) Indução da Remissão
- (2) Intensificação ou Consolidação
- (3) Profilaxia Craniana
- (4) Manutenção
- () Tratamento específico para a prevenção e tratamento da doença no Sistema Nervoso Central por administração de quimioterápicos específicos por via intratecal.
- () Tem como objetivo destruir rapidamente a maioria das células tumorais, deixando a medula óssea com menos de 5% de blastos e nenhum sinal ou sintoma da doença.
- () Nesta fase, usam-se doses limítrofes com múltiplos fármacos para diminuir a carga tumoral a níveis muito baixos.
- () Tratamento instituído por dois anos em meninas e adultos, e durante três anos em meninos. A quimioterapia é realizada com doses diárias de quimioterapia via oral e uma dose de quimioterapia intravenosa acrescida de corticoide via oral, uma vez por mês ou, nos adultos, a cada três meses.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 2.
- (B) 3 – 1 – 2 – 4.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2.

22. O Transplante de Medula Óssea (TMO) é o processo de substituição da medula óssea (MO) doente ou suprimida por medula óssea normal. O objetivo do procedimento é infundir, através da via venosa do paciente, células progenitoras ou *stem cells*.

Assinale a afirmação correta sobre o TMO.

- (A) As células para o TMO singênico são obtidas a partir de um irmão gêmeo idêntico. São transplantes associados a índices de recidivas inferiores aos do alogênico.
- (B) As fases do TMO seguem a respectiva ordem: seleção e preparo do paciente, regime de condicionamento, coleta de MO, infusão da medula óssea.
- (C) No regime de condicionamento no TMO autólogo há o propósito de imunossuprimir o receptor para diminuir o risco de rejeição do enxerto (medula).
- (D) O dia de início do processo de condicionamento é considerado o dia zero.
- (E) A mucosite é esperada por volta de dez dias após a infusão da medula.

23. Considere as afirmações abaixo sobre Terapia Antineoplásica.

- I - A imunoterapia promove a estimulação do sistema imunológico por meio do uso de substâncias modificadoras da resposta biológica. Essa abordagem utiliza interferons, anticorpos monoclonais e vacinas.
- II - A poliquimioterapia é capaz de retardar o mecanismo de resistência tumoral. A associação de antineoplásicos possibilita o emprego de doses maiores, consequentemente, o tratamento torna-se mais efetivo.
- III- A Terapia antineoplásica neoadjuvante é realizada antes do tratamento curativo, visando menor radicalidade no procedimento cirúrgico e diminuindo o risco de doença a distância.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Sobre cuidados em fim de vida para criança e família, analise as afirmativas abaixo.

- I - As intervenções de cuidado paliativo não funcionam para acelerar a morte, mas sim como cuidado total ativo dos pacientes cuja doença não responde ao tratamento curativo.
- II - Crianças em idade escolar veem a morte como um tipo de sono. A morte é vista como temporária, podendo trocar de lugar com a vida.
- III- Crianças em idade escolar personificam a morte como um monstro ou bicho papão. A partir dos 9 ou 10 anos, percebem a morte como irreversível.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre os cuidados na manutenção, manuseio e remoção do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC).

- (A) O PICC valvulado permite coletas de sangue desde que seguidas todas as etapas necessárias.
- (B) O curativo do PICC precisa ser trocado a cada sete dias, fazendo uso de película transparente para a cobertura.
- (C) A realização da lavagem do PICC deve ser de maneira pulsátil com soro fisiológico em seringas de 10mL ou 20mL, exclusivamente.
- (D) A veia basilíca é a primeira escolha para inserção do PICC, pois diminui os riscos de flebite.
- (E) O PICC com ponta aberta precisa ser salinizado uma vez por semana quando não está em uso.

26. O tratamento antineoplásico causa reações adversas devido a sua não especificidade, ou seja, as drogas não afetam apenas as células tumorais. Sobre as toxicidades decorrentes da quimioterapia é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a leucopenia é relacionada à toxicidade hematológica e é o principal fator de risco para infecções.
- (B) a mucosite é relacionada à toxicidade gastrointestinal e não contraindica a quimioterapia.
- (C) para o controle da êmese, preconiza-se a administração de antieméticos até mesmo antes do início da quimioterapia.
- (D) a alopecia é uma toxicidade de caráter transitório, porém abala psicologicamente o paciente para enfrentar a doença e o tratamento.
- (E) o enfermeiro deve saber que a prevenção para as toxicidades vesical e renal é a hiper-hidratação.

27. Considere as afirmações abaixo sobre Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e Leucemia Mieloide Crônica (LMC).

_____ tem como aspecto clínico dominante a insuficiência da medula óssea, causada pelo acúmulo de blastos.

_____ é a forma comum de leucemia aguda em adultos, com início mediano aos 65 anos. Constitui um percentual de 10 a 15% das leucemias na infância.

_____ é responsável por cerca de 15% das leucemias. O diagnóstico é confirmado pela presença do cromossoma Filadélfia (Ph). Pode ocorrer em qualquer idade, embora seja mais comum entre 40 e 60 anos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos parágrafos acima.

- (A) LLA – LMC – LMA
- (B) LMA – LLA – LMC
- (C) LLA – LMA – LMC
- (D) LMC – LMA – LLA
- (E) LMA – LMC – LLA

28. Com relação aos tumores ósseos, assinale a alternativa correta.

- (A) As manifestações clínicas dos tumores ósseos frequentemente observadas são claudicação, restrição à atividade física habitual e dor.
- (B) Durante a infância, a idade de pico dos tumores ósseos pediátricos malignos é entre cinco e nove anos.
- (C) Tumor de Ewing não é considerado um tumor sólido.
- (D) Menos da metade dos osteossarcomas ocorrem no fêmur.
- (E) A quimioterapia não tem papel vital nos tumores ósseos.

29. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre a avaliação da dor.

- (A) Uma escala de alívio da dor ou uma graduação periódica da intensidade da dor deve ser usada para avaliar a efetividade dos regimes terapêuticos para a dor.
- (B) Dentre os efeitos colaterais dos opioides estão: constipação, depressão respiratória, náusea e vômito.
- (C) Para alívio da dor, antes de aumentar o opioide, é preferível acrescentar outro componente não opioide.
- (D) A dose ideal de um analgésico é aquela que controla a dor sem causar efeitos colaterais graves.
- (E) O uso de fentanil transdérmico é indicado para tratamento da dor aguda.

30. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre o retinoblastoma.

- (A) É o tumor intraocular maligno congênito mais comum na infância.
- (B) Um dos sinais mais comumente observados na avaliação do diagnóstico é a leucocoria.
- (C) Enucleação (remoção) do olho afetado é o tratamento de escolha quando não há esperança de uma visão útil.
- (D) Após a enucleação é desnecessária a troca diária do curativo, uma vez que a lesão é limpa e apresenta pouca drenagem.
- (E) A quimioterapia é utilizada precocemente na tentativa de reduzir o tamanho do tumor.

31. A Síndrome do intestino curto (SIC) é um distúrbio de má-absorção que ocorre quando há uma redução na área superficial da mucosa, geralmente como resultado da ressecção do intestino delgado. Com relação à SIC, considere as afirmações abaixo.

- I - A administração de medicamentos é o componente mais importante dos cuidados de enfermagem.
- II - A falta de locais adequados para a colocação de cateter central pode tornar-se um problema significativo para as crianças que precisam de nutrição parenteral de longo prazo.
- III - Nos casos de hospitalização prolongada, a enfermeira deve promover um planejamento especial para adaptar as rotinas hospitalares aos cuidados domiciliares da criança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

32. Através da entrevista, as enfermeiras focalizam os indivíduos para determinar o tipo de pessoa que são, seu modo usual de lidar com os problemas, suas necessidades de ajuda e suas reações ao aconselhamento.

Sobre este método de comunicação, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O local em que se realiza a entrevista é quase sempre tão importante quanto a própria entrevista. O ambiente físico deve permitir o máximo de privacidade possível, com o mínimo de distração.
- (B) O uso do silêncio é uma das técnicas de entrevista mais fáceis. Através dele é permitido espaço para a criança pensar, sentir e agir, fornecendo dados precisos para uma intervenção de enfermagem.
- (C) As percepções e julgamentos dos enfermeiros referentes a questões raciais, religiosas e/ou culturais não devem influenciar as ações de cuidado para com o paciente pediátrico e sua família.
- (D) Na maior parte dos casos, a informação sobre a criança é obtida por observação direta ou é comunicada à enfermeira pelos pais.
- (E) Na comunicação com crianças de todas as idades, os componentes não verbais transmitem as mensagens mais significativas.

33. Assinale a afirmação correta sobre os métodos dialíticos utilizados em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica (UTIP).

- (A) Na hemodiálise contínua, o principal método de remoção de solutos é a difusão, enquanto na hemofiltração contínua o principal método de depuração é a convecção.
- (B) A hipotermia é uma complicação frequente da hemodiálise intermitente.
- (C) Na diálise peritoneal, a peritonite deve ser sempre considerada na presença de febre, dor abdominal, saída de líquido de diálise turvo, alterações no sensorio e convulsões.
- (D) Intoxicações agudas, Erro Inato do Metabolismo (EIM), sepse/SIRS, cetoacidose diabética e febre reumática são indicações não renais de utilização de métodos dialíticos.
- (E) Na terapia hemodialítica contínua, heparina e citrato de sódio são os anticoagulantes utilizados, sendo que ambos promovem anticoagulação sistêmica.

34. Meningite é uma doença grave, com alta mortalidade e sequelas frequentes. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre a meningite.

- (A) Na meningite bacteriana há pleocitose (aumento dos leucócitos no liquor) com predomínio de neutrófilos, glicorraquia baixa (em geral <50% da glicemia) e elevação da proteinorraquia.
- (B) A hiperventilação de forma prolongada, com sua subsequente hipocapnia, deve ser evitada, pois pode haver redução do fluxo sanguíneo cerebral, desencadeando isquemia em regiões do cérebro.
- (C) A confirmação é feita pelo exame de liquor, que deve ser realizado sempre antes da antibioticoterapia.
- (D) A meningococemia evolui rapidamente para choque séptico grave, coagulação intravascular disseminada, necrose de extremidades e falência de múltiplos órgãos.
- (E) A punção lombar é contraindicada quando houver sinais de hipertensão intracraniana, choque ou instabilidade hemodinâmica grave ou quando houver infecção de pele no local da punção.

35. A Ventilação Mecânica não Invasiva (VMNI) é uma técnica que, por meio de um gerador de fluxo que provê pressão positiva, fornece um volume corrente aos pacientes, sem a necessidade de entubação traqueal.

Dentre as atribuições da enfermagem relacionadas à VMNI listadas abaixo, qual está correta?

- (A) Escolher ventilador e acessórios adequados, manter via aérea permeável e decúbito elevado.
- (B) Manter via aérea permeável, checar a montagem e conexões do ventilador e garantir conforto ao paciente.
- (C) Montar o ventilador, iniciar a ventilação e realizar controle periódico do paciente.
- (D) Manter acesso venoso permeável, revisar a cavidade oral e administrar sedação ao paciente.
- (E) Manter monitorização adequada, administrar dieta em gotejo contínuo por três horas e auxiliar no reconhecimento de complicações.

36. Os sinais mais importantes são a taquicardia com os pulsos finos ou de difícil palpação, a perfusão periférica lenta, com tempo de recoloração maior do que três segundos, extremidades frias, alteração do sensorio e oligúria. O quadro clínico descrito acima está relacionado a qual patologia?

- (A) Endocardite infecciosa.
- (B) Dengue grave.
- (C) Crise hipertensiva.
- (D) Choque.
- (E) Disfunção miocárdica aguda.

37. Considere as afirmações abaixo sobre ventilação mecânica.

- I - A mudança de decúbito de supina para prona mostrou ser efetiva na melhora das trocas gasosas, principalmente na oxigenação.
- II - Devem-se evitar a hiper-hidratação e o balanço hídrico cumulativo positivo.
- III- Os cuidados pré-extubação incluem: NPO (nada por via oral) prévio de quatro a seis horas, suspender a sedação, aspirar o tubo, hiperventilar antes de retirar o tubo traqueal e manter todo o material de extubação organizado e junto ao leito do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

38. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as principais urgências cirúrgicas respiratórias com as respectivas características.

- (1) Aspiração de corpo estranho
- (2) Pneumotórax
- (3) Pneumotórax hipertensivo
- () Na suspeita, deve-se realizar drenagem torácica de urgência. O tratamento definitivo ocorre através da colocação de um dreno torácico, que é mantido em aspiração contínua.
- () A criança pode apresentar tosse intensa, sibilância, vômito, palidez, cianose ou episódios breves de apnéia. Após estas manifestações dramáticas iniciais, o quadro clínico geralmente se atenua ou mesmo desaparece completamente.
- () A presença de ar no espaço pleural é que determina colapso pulmonar secundário. A causa mais comum de fuga aérea é o vazamento decorrente da perfuração do pulmão e da pleura visceral.
- () A anormalidade radiológica clássica é a hiperinsuflação pulmonar localizada.
- () A identificação pode ser realizada pela obtenção de alguns sinais clínicos, como cianose súbita, diminuição do murmúrio vesicular e abaulamento do hemitórax afetado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 1 – 2.
- (B) 2 – 1 – 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 3 – 1 – 3 – 1.

39. Assinale a afirmação correta sobre o Transplante Hepático Infantil (THI).

- (A) A capacidade de depuração de drogas não está relacionada diretamente com a qualidade do órgão transplantado, com o tempo de preservação, com o período de isquemia, com a estabilidade hemodinâmica e com o surgimento ou não de rejeição.
- (B) Os principais parâmetros que indicam um bom funcionamento do enxerto hepático são a estabilidade hemodinâmica, a ausência de sangramento ativo ou a diminuição de sangramento existente, a manutenção do débito urinário e a superficialização do nível de consciência do paciente.
- (C) O aumento das transaminases, nas primeiras 24 horas, com normalização progressiva nos dias seguintes, indica evolução clínica desfavorável.
- (D) É recomendável que os balanços iniciais no pós-operatório sejam mantidos positivos, tendo o cuidado de evitar desidratação, hipovolemia e hemoconcentração, em razão do risco aumentado de trombozes vasculares no enxerto.
- (E) A imunossupressão pode ser classificada em três fases principais: indução, manutenção e tratamento da rejeição aguda, sendo que o tratamento de indução inicia antes mesmo do transplante, o de manutenção inicia nas primeiras 24 horas e o tratamento da rejeição apenas quando há diagnóstico histológico.

40. Assinale a afirmação correta, de acordo com a Atualização das Diretrizes de 2015 da *American Heart Association* (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE).

- (A) Sistemas de Times de Resposta Rápida (TRR) e Times de Emergência Médica (TEM) estão indicados para pacientes adultos, sem comprovação de alteração no curso das paradas cardiorrespiratórias (PCRs) em pacientes pediátricos.
- (B) É aconselhável manter a sequência das Diretrizes de 2010, iniciando a RCP com A – B – C.
- (C) Em crianças comatosas, nos primeiros dias após PCR (intra-hospitalar ou extra-hospitalar), é desnecessário monitorar a temperatura continuamente.
- (D) Não há nenhuma evidência que respalde o uso rotineiro de atropina para evitar bradicardia em intubações pediátricas de emergência.
- (E) Durante uma PCR, em pacientes pediátricos, o uso da epinefrina deve ser avaliado conforme a patologia da criança.