

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 01/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 02

##### ENFERMEIRO I (Obstetrícia)

01.	<b>E</b>	11.	<b>C</b>	21.	<b>D</b>
02.	<b>E</b>	12.	<b>A</b>	22.	<b>C</b>
03.	<b>C</b>	13.	<b>A</b>	23.	<b>D</b>
04.	<b>A</b>	14.	<b>B</b>	24.	<b>C</b>
05.	<b>B</b>	15.	<b>E</b>	25.	<b>C</b>
06.	<b>E</b>	16.	<b>D</b>		
07.	<b>A</b>	17.	<b>E</b>		
08.	<b>A</b>	18.	<b>B</b>		
09.	<b>D</b>	19.	<b>C</b>		
10.	<b>A</b>	20.	<b>A</b>		



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

## EDITAL Nº 01/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

### MISSÃO

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

## PS 02 - ENFERMEIRO I (Obstetrícia)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_



- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Sobre *diabetes mellitus* na gestação (DMG), assinale a alternativa correta.

- (A) As gestantes com DMG devem evitar atividade física.
- (B) Macrossomia fetal em gestação anterior não é considerada fator de risco.
- (C) Não há necessidade de acompanhamento da gestante com DMG em serviço de pré-natal de alto risco.
- (D) Apenas gestantes com algum fator de risco devem realizar os exames de investigação da doença no pré-natal.
- (E) Nas gestantes com diagnóstico de DMG, o controle glicêmico deve ser feito com glicemias de jejum e pós-prandiais semanais.

**02.** Sobre hemorragia pós-parto (HPP), assinale a alternativa correta.

- (A) Atonia uterina é a segunda principal causa de HPP.
- (B) Gemelaridade e multiparidade não são fatores de risco.
- (C) A massagem uterina contínua é recomendada como intervenção para prevenir a HPP em mulheres que receberam ocitocina profilática.
- (D) O manejo ativo do terceiro período do parto está associado ao aumento na ocorrência de HPP.
- (E) A HPP pode ser agravada pela anemia preexistente.

**03.** Assinale a alternativa que contempla manifestação clínica de hipoglicemia do recém-nascido.

- (A) Hipertonia.
- (B) Taquicardia.
- (C) Sucção débil.
- (D) Hipertermia.
- (E) Bradipneia.

**04.** Sobre o uso da hidroterapia como medida não farmacológica que promove conforto e relaxamento no trabalho de parto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É mais eficaz quando iniciada na fase latente do trabalho de parto.
- (B) Reduz parto com fórceps.
- (C) Reduz trauma perineal.
- (D) Reduz a realização de episiotomia.
- (E) Aumenta a satisfação materna com a experiência do nascimento.

**05.** Sobre as hemorragias da segunda metade da gestação, assinale a alternativa correta.

- (A) A rotura prematura de membranas ovulares é fator de risco importante para o descolamento prematuro da placenta.
- (B) O uso de suplementação de ferro na gestação, nos casos de placenta prévia, é indicado para evitar anemia, com constante monitoração dos níveis de hematócrito e de hemoglobina.
- (C) Para gestantes Rh-negativo, com diagnóstico de placenta prévia, não é necessária a prescrição de imunoglobulina anti-D quando a gestante apresentar sangramento.
- (D) O quadro clínico característico do descolamento prematuro de placenta é sangramento indolor.
- (E) A rotura uterina tem como quadro clínico: queixa de dor aguda e de forte intensidade, aumento das contrações, descida da apresentação e fácil palpação das partes fetais.

**06.** Considere as afirmações abaixo sobre a cardiocografia anteparto de repouso.

- I - É recomendada sua realização somente após a 37ª semana de gestação.
- II - O feto hígido, próximo do termo, apresenta frequência cardíaca estável entre 110 e 160 batimentos por minuto.
- III - As desacelerações variáveis profundas e prolongadas com retorno abrupto são resultantes de compressão do cordão umbilical.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**07.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a avaliação da vitalidade do bebê ao nascer.

- ( ) A determinação da necessidade de reanimação depende da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca.
- ( ) A avaliação da coloração da pele e das mucosas do recém-nascido não é mais utilizada como critério para decidir procedimentos.
- ( ) O boletim de Apgar permite avaliar a resposta do recém-nascido às manobras realizadas, bem como a eficácia dessas manobras.
- ( ) A frequência respiratória é o principal determinante da decisão para indicar as diversas manobras de reanimação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – V – F.

**08.** Em relação à assistência no primeiro estágio do parto, assinale a alternativa correta.

- (A) A deambulação e outras posições verticais proporcionam menor duração do trabalho de parto e diminuem a necessidade de analgesia.
- (B) O uso do enema leva a uma redução significativa de infecção puerperal e neonatal.
- (C) A ingestão de alimentos leves ou fluidos durante o trabalho de parto aumenta a incidência de complicações.
- (D) O apoio físico e emocional deve ser oferecido somente pelos profissionais de saúde que prestam assistência à parturiente.
- (E) Há evidências que apoiam o uso rotineiro da tricotomia no parto.

**09.** Em relação às iniciativas “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” e “Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)”, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Evento adverso é incidente que resulta em dano ao paciente.
- (B) A lista de verificação de segurança cirúrgica ajuda a garantir que as equipes sigam de maneira adequada as etapas críticas de segurança, minimizando assim os riscos mais comuns e evitáveis.
- (C) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente é um dos objetivos do PNSP.
- (D) Segurança do paciente é definida como redução total do risco de dano desnecessário associado a cuidado de saúde.
- (E) A lista de verificação de segurança cirúrgica divide a cirurgia em três fases, cada uma correspondendo a um momento específico no fluxo normal do procedimento.

**10.** Com relação ao uso de sulfato de magnésio para prevenção de complicações em mulheres com pré-eclâmpsia, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração da dose de manutenção deve ser suspensa caso a frequência respiratória seja inferior a 16 incursões por minuto.
- (B) A administração da dose de manutenção deve ser suspensa caso a diurese seja inferior a 100mL durante as duas horas precedentes à avaliação.
- (C) O gluconato de cálcio a 10% deve ser administrado imediatamente após a administração da dose de manutenção do sulfato de magnésio em pacientes que convulsionarem.
- (D) O uso de sulfato de magnésio é indicado apenas durante o trabalho de parto e o parto.
- (E) A verificação dos reflexos patelares deve ser realizada imediatamente após a dose de ataque do sulfato de magnésio.

**11.** Considere as afirmações abaixo sobre acolhimento com classificação de risco em obstetrícia.

- I - É uma tecnologia para viabilizar o direito da gestante ao acesso, atendimento e resolutividade em tempo adequado.
- II - O atendimento é definido pela ordem de chegada.
- III- Na categorização dos sinais e sintomas, conforme o grau de risco, a cor vermelha significa que a mulher deve ser atendida em até 15 minutos.
- IV- No âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e a priorização da assistência em Serviços de Urgência são privativas do enfermeiro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas I, III e IV.

**12.** Sobre a presença de acompanhante no trabalho de parto, parto e pós-parto, é correto afirmar que

- (A) é vedado aos profissionais de enfermagem criar empecilhos e proibir a gestante, parturiente ou puérpera de ter o acompanhante de sua livre escolha.
- (B) é uma prática comprovadamente útil, mas que não deve ser estimulada devido ao risco de infecção.
- (C) não oferece conforto e segurança para a parturiente.
- (D) atrapalha a equipe de enfermagem na prestação de cuidados.
- (E) não é fator importante na prática de segurança do paciente.

**13.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, em relação às práticas integradas de atenção ao parto e nascimento, conforme o *Manual Além da Sobrevivência* (2011).

- ( ) O retardo no clameamento do cordão umbilical de recém-nascidos pré-termo/baixo peso ao nascer tem como benefício imediato diminuir o risco de hemorragia intraventricular.
- ( ) O contato pele a pele é tão efetivo quanto o uso da incubadora para aquecer um bebê hipotérmico.
- ( ) O clameamento tardio do cordão umbilical de recém-nascidos a termo tem sido associado à redução da necessidade de oxigênio e diminuição do uso de surfactante.
- ( ) O contato pele a pele não deve estar limitado à sala de parto; deve ser praticado tão frequentemente quanto possível durante os primeiros dias de vida, para manter a temperatura do recém-nascido, promover a amamentação e fortalecer o vínculo entre a mãe e o seu bebê.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – F – V – V.

**14.** Assinale a alternativa correta sobre métodos contraceptivos, conforme o *Caderno de Atenção Básica de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva* (2010).

- (A) Durante os primeiros seis meses do pós-parto, a amamentação exclusiva está associada a taxas baixíssimas de gravidez, sendo que a eficácia da amamentação como método contraceptivo independe de sucção frequente do bebê.
- (B) A esterilização voluntária é permitida em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- (C) Não está determinado se existem riscos para a mulher ou para o feto se a anticoncepção oral de emergência for acidentalmente usada na vigência de gravidez.
- (D) O dispositivo intrauterino é indicado para todas as mulheres, mesmo para aquelas com risco aumentado para doenças sexualmente transmissíveis/HIV/Aids, porque evitam gestações indesejadas.
- (E) Os anticoncepcionais hormonais orais combinados proporcionam ciclos menstruais regulares, com sangramento por menos tempo e em menor quantidade, mas existe a necessidade de pausas para "descanso" a cada dois anos de uso.

**15.** Sobre rotura prematura de membranas, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre 24 e 33 semanas, é indicado repouso restrito no leito.
- (B) Entre 22 e 24 semanas, realizar ausculta de batimentos cardíacos diariamente.
- (C) Nas gestações  $\geq 34$  semanas, independentemente da paridade e do amadurecimento cervical, a conduta é expectante.
- (D) Entre 24 e 33 semanas, verificar a temperatura axilar de 4/4h, inclusive durante o sono da gestante.
- (E) O toque vaginal deve ser evitado, exceto nas gestações a termo, em gestantes com parto iminente ou quando se planeja a indução imediata.

**16.** Em relação à infecção do trato urinário em gestantes, assinale a alternativa correta.

- (A) É recomendada a realização de cultura de urina somente no primeiro e segundo trimestres da gravidez.
- (B) A antibioticoterapia para infecção urinária na gestante deve ser sempre em regime de longa duração (7 a 10 dias).
- (C) A cistite é caracterizada por manifestações como queda do estado geral, disúria, febre e calafrios.
- (D) A infecção urinária na gestação pode ser associada a complicações como trabalho de parto prematuro, corioamnionite, febre no pós-parto, sepsise materna e infecção neonatal.
- (E) As gestantes com diagnóstico de infecção urinária devem ser hospitalizadas, e é necessário solicitar hemograma completo, níveis séricos de eletrólitos, creatinina e cultura de urina.

**17.** Sobre a transmissão vertical do HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) Cerca de 65% dos casos de transmissão vertical do HIV ocorrem intraútero, e os 35% restantes ocorrem durante o trabalho de parto e no parto.
- (B) A carga viral no leite materno tem-se mostrado pouco determinante no risco de transmissão pela amamentação.
- (C) A realização do diagnóstico da infecção pelo HIV no trabalho de parto, com o uso de testes rápidos, possibilita a adoção de medidas de tratamento da parturiente, mas não diminui a transmissão vertical do HIV.
- (D) Para definição do diagnóstico da infecção pelo HIV, basta que o primeiro teste rápido tenha resultado positivo (reagente).
- (E) A carga viral elevada e a rotura prolongada das membranas amnióticas são reconhecidas como os principais fatores associados à transmissão vertical do HIV.

**18.** Sobre complicações do puerpério, assinale a alternativa correta.

- (A) Presença de lóquios.
- (B) Sinal de Homan positivo.
- (C) Temperatura axilar de até 38°C nas primeiras 24h do pós-parto.
- (D) Útero na altura da cicatriz umbilical no puerpério imediato.
- (E) Mamas túrgidas no segundo ou terceiro dia do pós-parto.

**19.** Em relação à amamentação em recém-nascidos, assinale a alternativa correta.

- (A) Recomenda-se que o recém-nascido seja amamentado em horários determinados.
- (B) O tempo de permanência na mama, em cada mamada, deve ser fixado.
- (C) Se o bebê tiver sucção fraca, a mãe deve estimular sua mama por meio de ordenha manual.
- (D) O leite maduro é secretado logo após o nascimento do bebê.
- (E) Não há diferença entre leite de mães de bebês prematuros e a termo.

**20.** Em relação ao recém-nascido em alojamento conjunto de Hospital Amigo da Criança, assinale a alternativa correta.

- (A) É recomendado que o bebê seja colocado em decúbito dorsal para dormir.
- (B) O comportamento do recém-nascido é o mesmo independentemente da idade gestacional.
- (C) O uso da chupeta é permitido para acalmar o bebê.
- (D) Água e chás são permitidos no verão.
- (E) O teste do pezinho é realizado no primeiro dia de vida.

**21.** Sobre a sífilis na gestação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve ser solicitado exame de VDRL, mensalmente, para gestantes tratadas.
- (B) A elevação do título de VDRL em quatro vezes ou mais, em relação ao último exame, justifica um novo tratamento.
- (C) Parceiro não tratado caracteriza tratamento materno inadequado, sendo a criança considerada caso de sífilis congênita.
- (D) A notificação de sífilis pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação deve ser realizada mensalmente após o tratamento.
- (E) A gestante deve ser orientada a praticar abstinência sexual até que o tratamento seja completado e tenha evidência sorológica de cura.

**22.** O aconselhamento em amamentação faz parte dos cuidados de enfermagem no puerpério. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação a essa prática.

- (A) Fazer sugestões em vez de dar ordem.
- (B) Evitar palavras que soem como julgamentos.
- (C) Oferecer todas as informações sobre amamentação em cada aconselhamento.
- (D) Aceitar e respeitar os sentimentos e as opiniões das mães.
- (E) Usar linguagem simples e acessível.

**23.** Qual das alternativas abaixo **NÃO** é uma atribuição da Enfermeira Obstétrica?

- (A) Realização de episiotomia.
- (B) Realização de episiorrafia.
- (C) Assistência no trabalho de parto e no parto.
- (D) Realização de parto instrumentado.
- (E) Identificação de distócias obstétricas.

**24.** Sobre eclâmpsia, considere os sintomas abaixo.

- I - Cefaleia frontal ou occipital persistente
- II - Distúrbios visuais
- III- Dor no flanco esquerdo

Quais indicam eminência de eclâmpsia?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**25.** Sobre o exame físico do recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- (A) Choro forte de timbre variável está presente nas infecções e no desconforto respiratório.
- (B) A textura da pele independe da idade gestacional.
- (C) Alguns achados comuns, como milium, lanugo, vernix, mancha mongólica, não têm repercussão clínica.
- (D) Equimose situada na face tem aspecto de cianose localizada e é chamada de máscara equimótica, devendo ter investigação clínica.
- (E) O tônus muscular do recém-nascido depende da idade gestacional; quanto mais próximo do termo, menor o tônus flexor.