

## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 02/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 18

##### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Centro Obstétrico e Internação Obstétrica)

01.	<b>C</b>	11.	<b>D</b>	21.	<b>C</b>
02.	<b>B</b>	12.	<b>C</b>	22.	<b>A</b>
03.	<b>ANULADA</b>	13.	<b>B</b>	23.	<b>D</b>
04.	<b>A</b>	14.	<b>A</b>	24.	<b>B</b>
05.	<b>D</b>	15.	<b>C</b>	25.	<b>E</b>
06.	<b>A</b>	16.	<b>A</b>		
07.	<b>D</b>	17.	<b>E</b>		
08.	<b>B</b>	18.	<b>D</b>		
09.	<b>C</b>	19.	<b>E</b>		
10.	<b>E</b>	20.	<b>B</b>		



HOSPITAL DE  
**CLÍNICAS**  
PORTO ALEGRE RS

**EDITAL Nº 02/2017**  
**DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

**MISSÃO**

*Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.*

**PS 18 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**  
**(Centro Obstétrico e Internação Obstétrica)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição nº: \_\_\_\_\_



**FAURGS**  
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



**01.** No processo de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, **NÃO** é atribuição do técnico de enfermagem:

- (A) encaminhar a usuária para atendimento após a classificação de risco.
- (B) aferir sinais vitais da usuária.
- (C) reclassificar a usuária quando necessário.
- (D) escutar a queixa, os medos e as expectativas da usuária.
- (E) acolher a usuária e o acompanhante de forma cordial e responsável.

**02.** Conforme o Manual Técnico, *Gestação de Alto Risco*, do Ministério da Saúde (2012), assinale a alternativa que **NÃO** apresenta sintoma de iminência de eclâmpsia.

- (A) Cefaleia frontal ou occipital persistente.
- (B) Disúria.
- (C) Dor epigástrica.
- (D) Distúrbios visuais.
- (E) Dor em hipocôndrio direito.

**03.** Considere as afirmações abaixo sobre hemorragias.

- I - O principal fator de risco do descolamento prematuro de placenta é a hipertensão.
- II - O descolamento prematuro de placenta caracteriza-se, entre outros sinais e sintomas, por dor abdominal entre as contrações e sangramento genital em quantidade variável.
- III- O manejo ativo na prevenção da hemorragia pós-parto inclui administração de uterotônicos, clampeamento tardio do cordão e massagem uterina a cada 15 minutos, durante as primeiras duas horas pós-parto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**04.** O técnico de enfermagem deverá estar atento a sinais e sintomas mais comuns de hipoglicemia e hiperglicemia na gestante e comunicá-los imediatamente ao enfermeiro. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando hipoglicemia e hiperglicemia aos seus respectivos sinais e sintomas.

- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| (1) Hipoglicemia  | ( ) Fadiga e fraqueza              |
| (2) Hiperglicemia | ( ) Sonolência e sede              |
|                   | ( ) Palidez e pele úmida           |
|                   | ( ) Náusea ou vômito e constipação |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 1 – 2.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 2 – 1 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2 – 1.
- (E) 2 – 2 – 2 – 1.

**05.** Considere as afirmações abaixo sobre trabalho de parto prematuro (TPP).

- I - Conceitua-se gravidez pré-termo aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 e 35 semanas.
- II - Idade materna menor do que 15 anos e ausência de controle pré-natal são fatores de risco para TPP.
- III- A nifedipina é o agente tocolítico de primeira escolha para inibir as contrações uterinas no TPP.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**06.** Com relação aos cuidados com recém-nascido a termo (RN) logo após o nascimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Manter temperatura ambiente de, no mínimo, 26°C na sala de parto e na sala onde são realizados os procedimentos com o RN.
- (B) Retirar o vernix da região ocular com gaze seca ou umedecida com soro fisiológico e instilar uma gota de nitrato de prata a 1% em cada olho.
- (C) A antropometria inclui exclusivamente o comprimento e os perímetros cefálico, torácico e abdominal do RN.
- (D) Para prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K, administrar 1mg de vitamina K por via intramuscular ou endovenosa.
- (E) O RN estável deve ser transportado ao alojamento conjunto logo após a acomodação da mãe na unidade.

**07.** Considere as afirmações abaixo relativas ao alojamento conjunto (AC), de acordo com o guia *Atenção à Saúde do Recém-Nascido* (Ministério da Saúde, 2014), assinando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O AC é uma prática opcional para os hospitais públicos e conveniados do Brasil.
- ( ) Uma das vantagens do AC é a diminuição do risco de infecção hospitalar.
- ( ) Não existem evidências de que a prática de AC tenha efeito sobre o tempo de amamentação.
- ( ) O AC favorece a interação da mãe e sua família com os profissionais de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – V – F.

**08.** Com relação ao atendimento de mãe soropositiva para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e do seu recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- (A) Na sala de parto os profissionais devem adotar as precauções básicas e universais para evitar a sua própria contaminação na manipulação de sangue e secreções. Recomenda-se o uso de luvas e óculos, não sendo necessário o uso de máscaras e aventais de proteção.
- (B) O RN deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que esteja estável. Somente após a remoção de secreções maternas pode-se administrar medicações injetáveis.
- (C) A mulher deve receber zidovudina (AZT) por meio de infusão endovenosa, desde o momento da dequitação.
- (D) A profilaxia com antirretroviral deve ser administrada à criança somente após os testes confirmatórios da mãe.
- (E) O aleitamento materno é fortemente recomendado.

**09.** Conforme o guia *Atenção à Saúde do Recém-Nascido* (Ministério da Saúde, 2014), considere o trecho sobre manejo de hipoglicemia.

Quanto ao recém-nascido \_\_\_\_\_ com glicemia baixa, entre \_\_\_\_\_, deve ser alimentado, preferencialmente, com \_\_\_\_\_. A dosagem da glicemia deverá ser repetida em 30 a 60 minutos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) assintomático – 20 e 40mg/dL – fórmula láctea
- (B) assintomático – 20 e 40mg/dL – leite materno
- (C) assintomático – 25 e 45mg/dL – leite materno
- (D) sintomático – 25 e 45mg/dL – leite materno
- (E) sintomático – 20 e 40mg/dL – fórmula láctea

**10.** Considera-se taquipneia do RN quando, em repouso ou durante \_\_\_\_\_, a frequência \_\_\_\_\_ do recém-nascido mantém-se persistentemente acima de \_\_\_\_\_ movimentos por minuto.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) o choro – cardíaca – 60
- (B) a vigília – respiratória – 60
- (C) o banho – cardíaca – 40
- (D) a amamentação – respiratória – 40
- (E) o sono – respiratória – 60

**11.** Considere as afirmações abaixo sobre os mecanismos de perda de calor em recém-nascidos (RNs).

- I - Evaporação corresponde à perda insensível de água pela pele do RN, causada por cobertas molhadas, baixa umidade do ambiente ou ar inspirado.
- II - Convecção é a forma pela qual ocorre perda de calor da pele do RN para o ar ao seu redor.
- III- Condução ocorre quando há perda de calor da pele do RN para uma superfície fria com a qual ele não está em contato.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**12.** Com relação ao aleitamento materno (AM), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Calcula-se que 22% das mortes neonatais poderiam ser evitadas com a amamentação na primeira hora de vida.
- ( ) A concentração de gordura no leite materno diminui no decorrer de uma mamada, assim, o leite do início da mamada é mais rico em energia e sacia mais a criança.
- ( ) Recomenda-se que, nos primeiros meses de vida, a criança seja amamentada em horários regulares, para formação de hábito alimentar.
- ( ) O Brasil possui legislação que proíbe doação ou venda de mamadeiras, bicos e chupetas em serviços públicos de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.  
 (B) F – F – V – F.  
 (C) V – F – F – V.  
 (D) V – V – F – V.  
 (E) F – F – F – V.

**13.** Quanto ao posicionamento e pega adequados no momento da amamentação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O bebê está com os braços livres e com corpo e cabeça alinhados.
- (B) O braço inferior do bebê está entre seu corpo e o corpo da mãe, e seu pescoço está fletido.
- (C) A mãe está relaxada e bem apoiada, e as nádegas do bebê estão firmemente apoiadas.
- (D) A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama, e a boca está abaixo do nível do mamilo.
- (E) O queixo do bebê toca a mama, e sua língua está sobre a gengiva inferior.

**14.** Assinale a alternativa que apresenta sinal ou sintoma indicativo de técnica adequada de amamentação.

- (A) Mais aréola visível acima da boca do bebê do que abaixo.
- (B) Ruídos causados pela língua do bebê.
- (C) Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
- (D) Mamilo apresentando estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta a mama.
- (E) Dor na amamentação.

**15.** Quanto ao posicionamento para colocar o recém-nascido para dormir e prevenir a síndrome da morte súbita do lactente, assinale a alternativa que apresenta a recomendação dada pelo Ministério da Saúde.

- (A) Decúbito lateral esquerdo.  
 (B) Decúbito lateral direito.  
 (C) Posição supina.  
 (D) Decúbito ventral.  
 (E) Posição prona.

**16.** Com relação ao contato pele a pele entre mãe e RN, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) Após o nascimento, o bebê deve ser secado com um pano limpo e seco e, se estiver ativo e reativo, pode ser colocado de bruços sobre o abdome da mãe e coberto com um cobertor seco e quente.
- ( ) O contato pele a pele garante o aquecimento adequado do RN, não sendo necessário colocar gorro ou pano na sua cabeça.
- ( ) As práticas rotineiras de cuidado ao recém-nascido, como banho e antropometria, podem afetar negativamente o contato com a mãe logo após o nascimento, assim como o início da amamentação.
- ( ) O contato pele a pele apresenta benefícios imediatos para a mãe, como melhorar o comportamento de afeto e vínculo.
- ( ) O contato pele a pele não deve estar limitado à sala de parto; deve ser praticado tão frequentemente quanto possível durante os primeiros dias de vida, para manter a temperatura do recém-nascido e promover a amamentação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – V – V – F.

**17.** A Escala Visual Analógica (EVA) consiste em um instrumento de avaliação subjetiva da intensidade da dor em obstetrícia e pode ser utilizada durante todo o atendimento hospitalar. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à aplicação da EVA.

- (A) Na ausência de dor, a classificação é zero.
- (B) O nível de dor máxima suportável (ou imaginada) pela paciente é 10.
- (C) Se a dor for leve, seu nível de referência é de 1 a 3.
- (D) Se a dor for moderada, seu nível de referência é de 4 a 6.
- (E) Se a dor for intensa, seu nível de referência é de 7 a 9.

**18.** Com relação à escala *Neonatal Infant Pain Scale* (NIPS) para a avaliação da dor em recém-nascidos, considere os seguintes parâmetros.

- I - Expressão facial e respiração.
- II - Choro e estado de alerta.
- III- Taquicardia e diminuição da motilidade da atividade gástrica.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

**19.** Avalie as afirmações abaixo referentes à segurança do paciente, assinando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) O processo de contagem manual de todos os instrumentais e compressas no começo e na conclusão da cirurgia é uma prática padronizada em várias organizações de enfermagem.
- ( ) As contagens de instrumentais e compressas devem ser registradas em um formulário próprio ou em um relatório de enfermagem. O resultado deve ser registrado como correto e incorreto.
- ( ) Instrumentais e compressas intencionalmente deixados no paciente devem ser registrados na documentação do paciente.
- ( ) Qualquer ação realizada na ocorrência de uma discrepância de contagem ou contagem incorreta de instrumentais e compressas deve ser registrada na documentação do paciente.
- ( ) Razões para não realizar contagem de instrumentais e compressas nos casos em que normalmente a contagem é necessária devem ser registradas na documentação do paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – V – V – V.

**20.** De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, é correto afirmar que:

- (A) o uso de luvas substitui adequadamente a lavagem das mãos.
- (B) é vedada a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim.
- (C) é permitido o consumo de lanches rápidos nos postos de trabalho.
- (D) o reencape e a desconexão manual de agulha devem ser realizados pelo trabalhador que utilizou esse material.
- (E) acidente do trabalhador com possível exposição a agentes biológicos deve ser comunicado depois de comprovada a presença de contaminação.

**21.** A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. O \_\_\_\_\_ é a droga de eleição para tal, devendo ser mantido por \_\_\_\_\_ após o parto, se foi iniciado antes do mesmo. A dose de ataque é realizada em infusão endovenosa \_\_\_\_\_. A dose de manutenção endovenosa requer bomba de infusão e deverá ser suspensa caso a diurese seja inferior a \_\_\_\_\_ durante as quatro horas precedentes.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) diazepam – 12 horas – rápida – 200mL
- (B) diazepam – 24 horas – lenta – 100mL
- (C) sulfato de magnésio – 24 horas – lenta – 100mL
- (D) sulfato de magnésio – 12 horas – lenta – 200mL
- (E) sulfato de magnésio – 24 horas – rápida – 200mL

**22.** Com relação à Portaria nº 1.153, de 2014, do Ministério da Saúde, sobre a habilitação na Iniciativa Hospital Amigo da Criança, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) É recomendado que a mulher em trabalho de parto fique em jejum.
- ( ) Um dos dez passos para o sucesso do aleitamento materno é não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes.
- ( ) Uma das práticas recomendadas é, se a paciente o desejar, incentivá-la a andar e a se movimentar durante o trabalho de parto.
- ( ) A prática de alojamento conjunto mãe-bebê pode ser interrompida durante a noite, para que a mulher se recupere mais rapidamente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – F – F – V.

**23.** Considere as afirmações abaixo referentes ao funcionamento vesical e intestinal das puérperas em Alojamento Conjunto, assinalando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- ( ) A puérpera deve urinar espontaneamente de 6 a 8 horas após o parto.
- ( ) É desnecessário mensurar o volume urinário nas primeiras micções, pois seu valor é irrelevante.
- ( ) Diminuição do tônus vesical, edema por trauma ou medo do desconforto são algumas das dificuldades para o esvaziamento da bexiga.
- ( ) O uso de analgésicos narcóticos, suplementos de ferro e sulfato de magnésio não está relacionado à constipação intestinal.
- ( ) A distensão vesical pode causar atonia uterina e sangramento aumentado após o parto.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – F – V – F – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – F.

**24.** Quanto à imunoglobulina anti-Rh aplicada na puérpera com fator Rh negativo, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração da imunoglobulina anti-Rh deve ser feita por via oral.
- (B) A data de validade do frasco da imunoglobulina deve ser checada antes de sua administração.
- (C) O recém-nascido também necessita receber a imunoglobulina anti-Rh.
- (D) A imunoglobulina anti-Rh deve ser administrada em uma única dose que não poderá ultrapassar o quinto dia do puerpério.
- (E) A imunoglobulina anti-Rh não necessita ser administrada em pacientes após abortamento.

**25.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de trabalho de parto às suas respectivas características.

- (1) Trabalho de parto verdadeiro
- (2) Trabalho de parto falso
  
- ( ) As contrações ocorrem de forma irregular.
- ( ) As contrações podem ser interrompidas pela utilização de medidas de conforto.
- ( ) As contrações são sentidas na região lombar, irradiando para a parte inferior do abdome.
- ( ) As contrações tornam-se mais intensas ao caminhar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 2 – 1 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 1 – 2.
- (E) 2 – 2 – 1 – 1.