

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 38

ENFERMEIRO I (Neonatologia)

01.	E	11.	A	21.	B	31.	E
02.	A	12.	A	22.	C	32.	A
03.	B	13.	B	23.	D	33.	D
04.	C	14.	E	24.	E	34.	D
05.	D	15.	D	25.	B	35.	D
06.	C	16.	D	26.	B	36.	A
07.	A	17.	B	27.	C	37.	E
08.	A	18.	C	28.	C	38.	C
09.	C	19.	E	29.	B	39.	D
10.	C	20.	B	30.	E	40.	E

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 02/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 38 - ENFERMEIRO I (Neonatologia)

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____



INSTRUÇÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão** portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 O candidato deverá responder a Prova Escrita, utilizando-se, preferencialmente, de caneta esferográfica de tinta azul. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.
- 7 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número **41**, serão desconsideradas.
- 8 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 9 A duração da prova é de **três horas e meia (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 10 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 11 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 12 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa prova!

01. No momento da internação de um recém-nascido (RN) a termo para fototerapia, o enfermeiro deve atentar para cuidados e orientações sobre amamentação. O diagnóstico de enfermagem indicado para ser levantado neste momento é

- (A) nutrição desequilibrada: abaixo das necessidades corporais.
- (B) leite materno insuficiente.
- (C) padrão ineficaz de alimentação do lactente.
- (D) deglutição prejudicada.
- (E) amamentação interrompida.

02. Em um RN foi identificada a necessidade do término da ventilação mecânica invasiva assistida. Entretanto, após a extubação, esse RN necessitou de oxigenoterapia por campânula para manter sua saturação de oxigênio capilar em níveis normais. Não apresentou, em nenhum momento, alteração nos níveis normais de gasometria. Nesse caso, qual diagnóstico de enfermagem deve ser excluído e qual deve ser incluído?

- (A) Ventilação espontânea prejudicada e padrão respiratório ineficaz.
- (B) Troca de gases prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz.
- (C) Ventilação espontânea prejudicada e troca de gases prejudicada.
- (D) Troca de gases prejudicada e ventilação espontânea prejudicada.
- (E) Perfusão tissular periférica ineficaz e padrão respiratório ineficaz.

03. Considere as afirmações abaixo sobre a vitalidade do RN ao nascer.

- I - Imediatamente após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida da vitalidade do concepto.
- II - Gestação a termo, ausência de mecônio, movimentos respiratórios, choro e presença de tônus muscular são aspectos a serem avaliados.
- III- A necessidade de reanimação independe da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Segundo o Guia para Profissionais de Saúde: Atenção à Saúde do Recém-nascido, do Ministério da Saúde, (2011) "Nos recém-nascidos que não precisam de procedimentos de reanimação ao nascer, a _____ com _____ situa-se ao redor de 60-65%, só atingindo valores de _____ no _____ de vida".

As palavras ou expressões que completam, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima são:

- (A) saturação de oxigênio – cinco minutos de vida – 87%-92% – décimo minuto
- (B) frequência respiratória – cinco minutos de vida – 90%-95% – décimo minuto
- (C) saturação de oxigênio – um minuto de vida – 87%-92% – quinto minuto
- (D) saturação de oxigênio – um minuto de vida – 90%-95% – quinto minuto
- (E) frequência respiratória – um minuto de vida – 90%-95% – quinto minuto

05. Em relação ao desenvolvimento sensorial do feto humano intra útero, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () As experiências sensoriais do feto são irregulares, mediadas pelos ritmos circadianos da mãe, e coordenadas e integradas em um esquema padronizado e imprevisível.
- () O sistema visual é o primeiro a se desenvolver, o que ocorre em duas fases. A primeira fase inicia por volta da 10ª semana de gestação, e a segunda por volta da 18ª semana.
- () O segundo sistema a se desenvolver é o vestibular, que recebe muitos estímulos sensoriais durante o tempo em que o feto está dentro do útero.
- () O sistema olfativo está desenvolvido desde 29ª à 32ª semana, podendo o feto exibir respostas de sucção ou de acordar frente a odores agradáveis e de fuga para odores aversivos.
- () O quarto sistema a amadurecer, em termos anatômicos e fisiológicos, é o auditivo.
- () O sistema tátil é o último sistema sensorial a se desenvolver e também é o que apresenta maturação mais lenta.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F – V.
- (B) F – V – V – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – V – F.
- (D) F – F – V – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – F – V.

06. As alternativas abaixo correspondem a sinais de estresse autonômico do RN, **EXCETO**:

- (A) palidez e moteamento.
- (B) cianose central e pletora.
- (C) diminuição do peristaltismo e do resíduo gástrico.
- (D) respiração irregular e apneia.
- (E) tremores e sustos.

07. Considere as afirmações abaixo sobre os estágios da evolução do desenvolvimento comportamental neurossocial do RN pré-termo.

- I - O RN com menos de 32 semanas passa por um período de reorganização fisiológica, no qual os bebês geralmente não suportam muita estimulação.
- II - O RN de 34 a 35 semanas passa por um período de reciprocidade ativa com o meio social, podendo haver discrepâncias individuais devido ao estado clínico de cada bebê.
- III- O RN de 36 a 40 semanas atinge uma capacidade mínima de manter a homeostase e começa a responder prontamente à interação social.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

08. No que se refere à diminuição da produção de calor no RN, considere as condições abaixo.

- I - O menor estoque de gordura marrom.
- II - A maior área de superfície corporal.
- III- A maior quantidade de tecido subcutâneo.

Quais são fatores responsáveis pela diminuição da produção de calor no RN?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

09. A aferição da temperatura central do RN pode ser obtida de forma

- (A) intermitente, por via oral.
- (B) contínua, por via axilar.
- (C) contínua, com sensor abdominal.
- (D) intermitente, com sensor nos membros inferiores.
- (E) intermitente, por via retal.

10. Em relação à hipotermia no RN, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso), as afirmações abaixo.

- () Refere-se à temperatura corporal abaixo de 36,5°C.
- () A prematuridade, a hipóxia e a restrição de crescimento intrauterino são condições que aumentam o seu risco.
- () Para evitá-la, deve-se manter o RN em temperatura ambiental de, no mínimo, 24°C.
- () Sucção débil, tremores e quedas de saturação de oxigênio são manifestações clínicas do RN.
- () Diminuição da produção de surfactante e aumento do consumo de oxigênio são algumas das alterações provocadas pela hipotermia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) V – V – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V – F.

11. Em relação ao exame físico geral do RN, é correto afirmar que

- (A) é importante avaliar o aspecto geral, a movimentação e o estado de hidratação.
- (B) o exame físico deve ser realizado sempre no sentido craniocaudal.
- (C) na avaliação da pele, deve-se testar a presença do fenômeno de Arlequim.
- (D) a presença de choro durante o exame é um sinal de pouca importância.
- (E) o RN prematuro não apresenta vérnix caseoso.

12. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as alterações da pele do RN com as respectivas definições.

- (1) Eritema tóxico
 (2) Impetigo
 (3) Máculas vasculares
 (4) Hemangiomas
 (5) Manchas mongólicas
- () Infecção piogênica, mais comumente causada por *Staphylococcus aureus*, inicia-se com lesões eritematosas puntiformes que evoluem para vesículas, que após se pustulizam ou se tornam bolhas.
- () Manchas cor salmão que desaparecem à pressão, presentes principalmente na nuca, pálpebra superior e fronte.
- () Lesão eritematosa multiforme (pápulas, máculas e até vesículas), esparsa ou confluyente.
- () Manchas azul-acinzentadas, localizadas no dorso e nas regiões glútea e lombossacra, podendo ser disseminadas.
- () Formas vasculares mais extensas e elevadas, que podem ter significado patológico.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
 (B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3.
 (C) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
 (D) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
 (E) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.

13. São achados comuns no exame físico do RN a termo saudável:

- (A) pele fina e seca, de cor rosada.
 (B) frequência respiratória média de 40 a 60 incursões por minuto.
 (C) tórax assimétrico, de forma cilíndrica.
 (D) frequência cardíaca acima de 180bpm.
 (E) abdome globoso, com perímetro abdominal cerca de 2 a 3cm maior que o cefálico.

14. Em relação ao exame físico do crânio do RN a termo, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O cefálo-hematoma representa edema das partes moles na área de apresentação, não respeita o limite dos ossos do crânio e é depressível.
- () Na bossa serossanguínea, há rompimento de vaso subperiosteal secundário ao traumatismo do parto, e sua consistência é de conteúdo líquido, restringindo-se ao limite do osso.
- () Fazendo-se pressão suave sobre os ossos do crânio, pode-se detectar uma área depressível, assemelhando-se à palpação de bola de pingue-pongue, chamado craniotabes.
- () Os cavalgamentos de suturas, sobreposição das bordas dos ossos do crânio, são ocorrências comuns, especialmente no parto normal.
- () Fontanelas abauladas estão associadas à desidratação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – V.
 (B) V – V – V – F – F.
 (C) F – F – F – V – V.
 (D) V – V – V – F – V.
 (E) F – F – V – V – F.

15. Assinale a alternativa que **NÃO** é um reflexo primitivo do recém-nascido.

- (A) Sucção.
 (B) Moro.
 (C) Cutâneo-plantar.
 (D) Ortolani.
 (E) Magnus-De-Kleijn.

16. Considere as afirmações sobre a nutrição do RN prematuro.

- I - Deve ser iniciada o mais breve possível, pois o RN possui energia suficiente para apenas alguns dias.
- II - É um processo complexo que envolve comportamento, respostas tácteis, controle fisiológico e coordenação sucção-deglutição-respiração.
- III- A dieta enteral tem sido mantida em pacientes gravemente enfermos, com instabilidade metabólica e hemodinâmica.
- IV- A gavagem simples é a forma mais comum de administração da dieta.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
 (B) Apenas II e III.
 (C) Apenas I, II e III.
 (D) Apenas I, II e IV.
 (E) I, II, III e IV.

17. Sobre o aleitamento materno do RN pré-termo, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) para a efetivação da amamentação, é importante orientar a ordenha da mama nas primeiras horas após o nascimento.
- (B) o estímulo à ordenha deve ser feito a cada três horas somente quando o bebê tiver iniciado a sucção.
- (C) o contato pele a pele é apontado como estratégia de promoção da amamentação.
- (D) a composição do leite de mães de RNs pré-termos promove efeitos anti-inflamatórios mais exuberantes que o leite de mães de RNs a termo.
- (E) a técnica da alimentação por copinho é útil quando a mãe encontra-se ausente temporariamente ou está incapacitada para amamentar.

18. Qual alternativa **NÃO** indica uma resposta comportamental que identifica dor no RN?

- (A) Choro.
- (B) Estado de sono e vigília.
- (C) Alteração da frequência cardíaca.
- (D) Movimentação facial.
- (E) Atividade corporal.

19. As alternativas indicam intervenções não farmacológicas, recomendadas para o alívio e manejo da dor durante procedimentos dolorosos, **EXCETO**:

- (A) administração de substâncias adocicadas por via oral.
- (B) sucção não nutritiva.
- (C) amamentação.
- (D) contato pele a pele.
- (E) aumento da estimulação tátil.

20. Em relação às alterações do RN em sofrimento respiratório, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) *Head Bobbing*
- (2) Apneia
- (3) Batimento de asas nasais
- (4) Gemido expiratório
- (5) Retrações torácicas

- () Resulta do fechamento parcial da glote durante a expiração.
- () Aparecem quando os pulmões apresentam-se com complacência baixa ou quando há obstrução de vias aéreas superiores ou alterações estruturais do tórax.
- () É um sinal de aumento do trabalho respiratório e representa o movimento para cima e para baixo da cabeça, a cada respiração.
- () Pausa respiratória superior a 20 segundos, ou, entre 10 e 15 segundos, se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio.
- () Abertura e fechamento cíclico das narinas durante a respiração espontânea.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (B) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- (C) 5 – 4 – 1 – 3 – 2.
- (D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

21. Qual cuidado de enfermagem é importante para evitar o aumento da pressão intracerebral do RN com encefalopatia hipóxico-isquêmica?

- (A) Manter a cabeça do RN lateralizada, com acline de cerca de 30 graus.
- (B) Manter a cabeça do RN na linha média, com acline de cerca de 30 graus.
- (C) Manter a cabeça do RN lateralizada, com acline de cerca de 45 graus.
- (D) Manter a cabeça do RN lateralizada, sem acline.
- (E) Manter a cabeça do RN na linha média, sem acline.

22. Em relação à hipotermia terapêutica leve, está correto afirmar que

- (A) o resfriamento corporal total deve ser iniciado após 6 horas de vida do RN, mantendo temperaturas inferiores a 32°C.
- (B) o aquecimento corporal total deve ser iniciado antes de 6 horas de vida do RN, mantendo temperatura axilar entre 32°C e 34°C.
- (C) o resfriamento corporal total deve ser iniciado antes de 6 horas de vida do RN, mantendo temperatura retal entre 32°C e 34°C.
- (D) o resfriamento corporal total deve ser iniciado após 6 horas de vida do RN, mantendo temperatura retal entre 32°C e 36°C.
- (E) o aquecimento corporal total deve ser iniciado após 6 horas de vida do RN, mantendo temperatura entre 35°C e 36°C.

23. Em relação aos cuidados com o uso do óxido nítrico, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) os procedimentos abaixo.

- () Monitorar continuamente a pressão arterial média e a frequência cardíaca.
- () Monitorar os níveis de metemoglobinemia periodicamente.
- () Controlar o fluxo de óxido nítrico por fluxômetro de oxigênio.
- () Administrar o óxido nítrico no ramo expiratório do circuito do respirador.
- () Monitorar a saturação de oxigênio nas regiões pré e pós-ductal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F – F.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) F – F – F – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – F – F – V – V.

24. Considere as afirmações abaixo sobre os cuidados com a administração da prostaglandina E1 (PGE1) no RN com cardiopatia congênita.

- I - A infusão da PGE1 deve ser administrada em acesso venoso profundo, preferencialmente central.
- II - A interrupção da infusão da medicação pode, em poucos minutos, provocar um novo fechamento do canal arterial.
- III- Os efeitos colaterais da PGE1 são apneia, hipotensão, hipertermia, irritabilidade, edema de mãos e pés e erupção cutânea.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Considere as recomendações abaixo sobre o uso do surfactante no RN.

- I - Aquecer o frasco nas mãos durante 20 minutos, com movimentos circulatórios.
- II - De preferência, não interromper a ventilação mecânica, utilizando uma cânula de duplo lúmen.
- III- Aspirar a cânula endotraqueal 15 minutos após a instilação do surfactante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

26. São cuidados frente à crise epiléptica neonatal, **EXCETO**:

- (A) garantir vias aéreas livres.
- (B) manter decúbito plano.
- (C) monitorar a saturação de oxigênio.
- (D) manter sonda gástrica aberta.
- (E) garantir acesso venoso em veia calibrosa.

27. Em relação à enterocolite necrosante, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Alterações
 (2) Prevenção
 (3) Complicações
 (4) Fatores de risco
 (5) Etiopatogenia
- () Oferta inadequada de oxigênio ao trato gastrointestinal e existência de flora bacteriana entérica patogênica.
 () Asfixia neonatal, persistência do canal arterial, avanço rápido na alimentação enteral.
 () Distensão abdominal, resíduo gástrico bilioso, muco e/ou sangue nas fezes.
 () Higienização das mãos e limpeza criteriosa do material e equipamentos.
 () Estenoses intestinais, a maioria delas no cólon.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
 (B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
 (C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
 (D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
 (E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

28. Assinale a alternativa correta em relação à hiperglicemia em RN prematuro, com muito baixo peso.

- (A) O diagnóstico clínico da hiperglicemia é dificultado quando há desidratação.
 (B) Níveis de glicemia acima de 80mg/dL podem causar polaciúria e dano renal irreversível.
 (C) Níveis de glicemia acima de 250mg/dL podem causar diurese osmótica e hemorragia cerebral.
 (D) O uso de aminoácidos na nutrição parenteral diminui a secreção de insulina.
 (E) O uso precoce de aminoácidos na nutrição aumenta a chance de hiperglicemia.

29. Em relação ao canal arterial, é correto afirmar que

- (A) apresenta fechamento espontâneo até o 10º dia de vida do RN.
 (B) na transição normal da circulação fetal para a neonatal, a constrição do canal arterial inicia-se logo após o nascimento.
 (C) quanto maior for o diâmetro do canal arterial, maior é o fluxo sanguíneo sistêmico na 1ª semana de vida do RN.
 (D) a diminuição da amplitude dos pulsos centrais e periféricos confirma a persistência do canal arterial.
 (E) displasia broncopulmonar e insuficiência cardíaca não são complicações da persistência do canal arterial.

30. Em relação à retinopatia da prematuridade (ROP), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () É uma das principais causas de cegueira e baixa visão infantil.
 () A realização da crioterapia e fotocoagulação a *laser* da retina periférica como formas de tratamento representou grande avanço na prevenção da cegueira.
 () A proporção de cegueira causada não é muito influenciada pelo nível de cuidado neonatal.
 () O desenvolvimento dos vasos sanguíneos retinianos inicia-se no 5º mês de gestação.
 () O nascimento prematuro interrompe o crescimento vascular normal, com adicional obliteração de alguns vasos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
 (B) F – V – V – F – V.
 (C) V – F – F – V – F.
 (D) F – F – F – V – F.
 (E) V – V – F – F – V.

31. No que se refere a eventos adversos, considere as situações abaixo.

- I - Administração do medicamento em dose incorreta.
- II - Erro na identificação do paciente.
- III- Erro de diagnóstico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

32. Considere as afirmações abaixo sobre o exame oftalmológico da ROP.

- I - O primeiro exame deve ser realizado entre a 4ª e 6ª semana de vida.
- II - No exame, há necessidade de se utilizar um oftalmoscópio binocular direto.
- III- A Classificação Internacional da Retinopatia da Prematuridade não deve ser utilizada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

33. Em relação à infecção pelo citomegalovírus (CMV), considere as afirmações abaixo.

- I - A infecção pelo CMV pode ocorrer antes, durante ou após o nascimento.
- II - Infecção congênita pelo CMV não é um importante problema de saúde pública.
- III- A restrição do crescimento intrauterino é um sinal clínico da infecção congênita por CMV.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

34. Em relação a infecções no RN, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Na suspeita de sepse precoce, recomenda-se coletar hemocultura antes do início da antibioticoterapia.
- () O hemograma e a proteína C reativa (PCR) deverão ser coletados preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida.
- () A suspensão da antibioticoterapia pode ser realizada, independentemente da evolução clínica, em 72 horas após o início do tratamento.
- () Considera-se o valor normal da PCR maior que 1mg/dL – pelos métodos quantitativos.
- () A síndrome do desconforto respiratório pode elevar a PCR.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – F – V – V.

35. Considere as afirmações abaixo sobre aleitamento materno do RN internado.

- I - Enquanto o bebê não estiver sugando vigorosamente, a mãe deve ser estimulada e orientada quanto à amamentação.
- II - O leite materno não interfere no alívio da dor do RN.
- III- Fatores da mãe ou da criança que limitem o esvaziamento das mamas podem causar diminuição na produção de leite.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

36. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as definições a seus respectivos conceitos.

- (1) Segurança do paciente
 (2) Dano
 (3) Incidente
 (4) Evento adverso
 (5) Gestão de risco
- () Incidente que resulta em dano ao paciente.
 () Aplicação de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de risco e eventos adversos que afetam a segurança do paciente.
 () Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde do paciente.
 () Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
 () Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
 (B) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
 (C) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.
 (D) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
 (E) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.

37. Em relação aos direitos da criança e do adolescente, considere as situações abaixo.

- I - Não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão alheia ao melhor tratamento de enfermidade.
 II - Pais ou responsáveis participando ativamente em seu diagnóstico, tratamento ou prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será submetido.
 III- Não ser objeto de ensaio clínico, provas diagnósticas e terapêuticas, sem o consentimento informado de seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver discernimento para tal.

Quais se constituem direitos da criança e do adolescente?

- (A) Apenas II.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

38. Em relação à Bioética, considere as afirmações abaixo.

- I - Atualmente, Bioética é definida como o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão moral, decisões, conduta e políticas – das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar.
 II - A Bioética aborda os novos problemas sempre da mesma maneira, pois as respostas tradicionais são as mais adequadas para esclarecer as dúvidas e resolver os problemas.
 III- A Bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço de diálogo interdisciplinar, ou seja, de colaboração e interação de diferentes áreas de conhecimento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

39. De acordo com a Lei n.º 7489/86, é atividade privativa do enfermeiro

- (A) participar da programação da assistência de enfermagem.
 (B) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
 (C) participar em projetos de construção ou reformas de unidade de internação.
 (D) organizar e dirigir serviços de enfermagem.
 (E) participar de programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar.

40. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considere abaixo as obrigadoriedades no que se refere a hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares.

- I - Propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
- II - Identificar o RN mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III- Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.