



EDITAL Nº 03/2019
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 17 - MÉDICO I
(Clínico: Medicina Ocupacional)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____ - _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Mulher de 42 anos de idade consulta pela persistência de queixas de tosse, coriza e dor de garganta há cinco dias. Informa febre de 38°C no início do quadro. Ao exame, encontra-se afebril e sem adenopatias cervicais. A orofaringe está normal e apresenta discreta dor à palpação de seios da face à direita. Com relação a esse caso, considere as condutas abaixo.

- I - Solicitar raio X de seios da face.
- II - Prescrever amoxicilina + clavulanato.
- III- Prescrever analgésicos e lavagem salina intranasal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

02. A seguir, são apresentadas três situações de pessoas que procuram atendimento médico com queixa de dor lombar intensa há duas semanas.

- I - Homem de 38 anos de idade apresentando dor lombar, após ter feito esforço físico (carregou caixas na mudança de um vizinho).
- II - Mulher de 71 anos de idade referindo dor lombar, após ter varrido o pátio da sua casa. Ela traz à consulta um raio X de coluna lombar realizado há quatro anos, evidenciando alterações degenerativas de coluna e diminuição do espaço intervertebral.
- III- Mulher de 60 anos de idade, com quadro de dor lombar, após sessão de Pilates. Refere que fez tratamento para câncer de mama há cinco anos.

Em quais das situações acima está indicada a realização de raio X da coluna lombar?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Mulher de 36 anos de idade, consulta na Unidade de Saúde, informando cefaleia pulsátil holocraniana há três dias, de média a forte intensidade. Exceto pela presença de náusea, nega outros sintomas associados. Já teve outros episódios semelhantes no passado, sendo o último há cerca de dois meses. Desde o início do quadro atual, vem fazendo uso de dois a três comprimidos ao dia de uma associação de orfenadrina 35mg + dipirona 300mg + cafeína 50mg (Dorflex®), com alívio apenas parcial.

O exame físico revela TA = 140/95mmHg, estando, o restante do exame, normal.

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta nessa situação.

- (A) Prescrição de naratriptano 2,5mg via oral.
- (B) Solicitação de tomografia computadorizada de crânio.
- (C) Prescrição de codeína 30mg via oral.
- (D) Prescrição de ibuprofeno 600mg via oral, de oito em oito horas.
- (E) Prescrição de prednisona 40mg via oral.

04. Mulher de 24 anos de idade busca atendimento na Unidade de Saúde por tosse e chiado leve no peito há cinco dias. Refere diagnóstico de asma desde a infância e uso de beclometasona *spray* oral, uma vez ao dia, apenas durante os meses de inverno, tendo parado esse tratamento há um ano. Refere que a crise atual iniciou logo após um quadro de resfriado comum. O exame físico evidencia roncos e sibilos expiratórios leves, esparsos à ausculta respiratória, e ausência de febre. A paciente teve melhora importante após nebulização com fenoterol na própria Unidade.

Assinale a alternativa que indica a melhor prescrição para essa paciente.

- (A) Nebulização com fenoterol, de quatro em quatro horas, com revisão em 24 horas.
- (B) Nebulização com fenoterol + ipratrópio, de quatro em quatro horas, prednisona 40mg, via oral, uma vez ao dia por cinco dias.
- (C) Amoxicilina 500mg, de oito em oito horas por sete dias.
- (D) Prednisona 40mg, via oral, uma vez ao dia por cinco dias, amoxicilina 500mg, de oito em oito horas por sete dias.
- (E) Nebulização com fenoterol + ipratrópio, de quatro em quatro horas, prednisona 40mg, via oral, uma vez ao dia por cinco dias, amoxicilina 500mg, de oito em oito horas por sete dias.

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as situações clínicas aos respectivos tratamentos.

- (1) Dor miofascial
- (2) Dor neuropática
- (3) Dor por compressão radicular
- (4) Dor crônica

- () Agulhamento seco
- () Gabapentina
- () Ibuprofeno
- () Amitriptilina

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3 – 4.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

06. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta diagnóstico diferencial de sífilis primária, caracterizada por lesão ulcerativa única, indolor e de cerca de 1cm, com fundo limpo.

- (A) Cancro mole
- (B) Herpes genital
- (C) Donovanose
- (D) Linfogranuloma venéreo
- (E) Gonorreia

07. Em relação à dor pélvica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A doença inflamatória pélvica (DIP) é facilmente diagnosticada pela presença de dor no abdômen, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo.
- (B) Durante a investigação deve-se avaliar a presença de abdômen agudo e sinais como hipotensão, taquicardia, taquipneia e febre, que indicam encaminhamento imediato para emergência.
- (C) O diagnóstico da maioria dos casos de DIP é feito pela história clínica e pelo exame físico, não sendo necessários exames complementares para justificar o tratamento.
- (D) O diagnóstico diferencial inclui causas ginecológicas, urológicas, musculoesqueléticas, gastrointestinais, vasculares e metabólicas.
- (E) Em caso de atraso menstrual, a solicitação de Beta HCG é mandatória.

08. Em relação à Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), considere os itens abaixo.

- I - A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
- II - O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- III- O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

Quais itens apresentam ações que devem ser vedadas pelo empregador?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Sobre as doenças da tireoide, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a dosagem do hormônio estimulador da tireoide (TSH), pela sua elevada sensibilidade, é o melhor método na avaliação inicial do hipotireoidismo e do hipertireoidismo.
- (B) não há necessidade de dosagem de tri-iodotironina (T3) para o diagnóstico e o acompanhamento do hipotireoidismo.
- (C) o anticorpo antirreceptor do TSH (TRAb) é específico para doença de Graves, mas não é indispensável para o diagnóstico desta.
- (D) o propiltiouracil é a medicação de primeira escolha para o tratamento farmacológico da maioria dos pacientes com hipertireoidismo.
- (E) a presença de sopro sobre a glândula tireoide é patognomônica de doença de Graves.

10. Com relação ao tratamento da cardiopatia isquêmica, considere as afirmações abaixo.

- I - As estatinas devem ser prescritas para todos os indivíduos com cardiopatia isquêmica documentada, independentemente dos níveis de colesterol.
- II - Os inibidores da enzima conversora da angiotensina têm indicação no tratamento sintomático da angina e reduzem eventos isquêmicos em pacientes com doença arterial coronariana e hipertensão arterial sistêmica associada.
- III- O uso de betabloqueadores está indicado para aqueles pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda, infarto do miocárdio ou têm disfunção ventricular esquerda; além disso, tem eficácia no alívio da angina *pectoris*.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

11. Com relação ao edema de membros inferiores, considere as afirmações abaixo.

- I - O edema bilateral está mais associado à insuficiência cardíaca, insuficiência venosa crônica, hipertensão arterial pulmonar sem disfunção ventricular esquerda.
- II - Entre os fármacos que podem causar edema de membros inferiores estão os bloqueadores dos canais de cálcio, os betabloqueadores, os corticosteroides e a hidralazina.
- III- Na presença de edema unilateral, é fundamental excluir trombose venosa profunda.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

12. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as doenças aos aspectos das lesões cutâneas.

- (1) Herpes simples
 (2) Foliculite bacteriana
 (3) Escabiose
 (4) Psoríase vulgar
 (5) Pitiríase alba
- () Lesões papuloescamosas
 () Lesões pustulares
 () Lesões vesicobolhosas
 () Lesões papulonodulares
 () Lesões esbranquiçadas

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5.
 (B) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
 (C) 4 – 3 – 2 – 5 – 1
 (D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
 (E) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.

13. Em relação às doenças infecciosas, assinale a alternativa correta.

- (A) É definido como caso suspeito de rubéola todo indivíduo que, independentemente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.
- (B) É definido como caso suspeito de sarampo todo indivíduo que, independentemente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de linfadenopatia retroauricular, occipital ou cervical.
- (C) Entre os sinais de alarme de dengue, pode-se citar: vômitos incoercíveis, dor abdominal intensa e contínua, desconforto respiratório, sonolência ou irritabilidade excessiva, hipotermia.
- (D) Os antibióticos betalactâmicos são a primeira opção para o tratamento específico de febre amarela.
- (E) Levofloxacina é a primeira opção para o tratamento específico de leptospirose.

14. As alternativas abaixo apresentam atribuições dos médicos que atendem o trabalhador, independentemente do local em que atuam, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Dar conhecimento aos empregadores sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho.
- (B) Identificar riscos químicos na investigação denexo causal entre transtornos de saúde e atividades do trabalhador.
- (C) Propor mudanças no contexto do trabalho, quando indicadas, com vistas ao melhor resultado do tratamento.
- (D) Fornecer cópia dos exames ocupacionais ao trabalhador e aos responsáveis pelo contrato de trabalho.
- (E) Produzir relatório com descrição dos riscos ocupacionais do trabalhador por solicitação do médico assistente ou especialista.

15. Analise as afirmativas abaixo sobre acidentes do trabalho.

- I - Equipara-se ao acidente do trabalho a ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho.
- II - Nos períodos destinados à refeição ou ao descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.
- III- Equipara-se ao acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado no percurso da residência para o local de trabalho em veículo de propriedade do segurado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Considere a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Em relação à emissão de atestado médico, analise as afirmações abaixo.

- I - O médico que atua em serviço de Saúde do Trabalhador está dispensado de elaborar atestado médico para fins de perícia médica, cabendo ao médico do trabalho fazê-lo.
- II - Quando requerido pelo representante legal do trabalhador enfermo, para fins de perícia médica, deverá o atestado médico observar alguns itens, como prognóstico e consequências à saúde do trabalhador.
- III- Somente aos médicos que trabalham em urgências e emergências é facultada a emissão de atestado médico de afastamento do trabalho.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. São considerados ou equiparam-se ao acidente do trabalho, para efeitos da lei, os casos apresentados abaixo, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) O acidente sofrido pelo segurado, no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão.
- (B) A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
- (C) O acidente sofrido pelo segurado, no local do trabalho, ainda que não produza incapacidade laborativa.
- (D) A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade.
- (E) O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.

18. Considere a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

As Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) são prevalentes nos ambulatórios de atendimento ao trabalhador. Sobre as DORTs, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O desenvolvimento das sinovites e tenossinovites, como de outras LERs/DORTs, é multicausal, sendo importante analisar os fatores de risco direta ou indiretamente envolvidos.
- () A realização de exame físico criterioso para a detecção precoce dos casos é mais importante do que a realização de exames complementares.
- () Quando há suspeita de relação entre a doença e o trabalho, o médico deve orientar o empregador para que adote recursos e gerenciamento adequados para eliminar ou controlar os fatores de risco.
- () O exame médico periódico pode prescindir de informações epidemiológicas na identificação de sinais e sintomas para detecção precoce da doença do trabalhador.
- () A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve basear-se na análise criteriosa e global da organização do trabalho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) F – F – F – V – V.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) V – V – V – F – V.
- (E) F – F – V – F – V.

19. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser considerada doença relacionada ao trabalho. Sobre a tuberculose, assinale a afirmação correta.

- (A) A tuberculose é doença de notificação compulsória e investigação obrigatória nos serviços de atenção terciária à saúde.
- (B) O quadro clínico mais comum é caracterizado por ausência de dispneia, tosse produtiva, expectoração esverdeada e hemoptise frequente.
- (C) O raio X de tórax mostra acometimento predominante dos segmentos inferiores e anteriores dos pulmões, caracterizados por infiltrados reticulonodulares, adenopatias mediastinais, cavitações de paredes espessas.
- (D) O teste tuberculínico, isoladamente, indica tuberculose pulmonar quando maior ou igual a 10mm (reator forte).
- (E) Trabalhadores com tuberculose de evolução arrasada com demora de negatificação do escarro têm menor probabilidade de apresentar sequelas ou disfunções prolongadas.

20. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa estabelecida no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Sobre vacinação ocupacional, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de vacinas às suas respectivas indicações.

- (1) Vacina contra Hepatite B
- (2) Vacina contra Difteria, Tétano e Coqueluche (dTpa)
- (3) Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (Tríplice Viral)
- (4) Vacina contra *Influenza*
- (5) Vacina contra Varicela

- () Não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina para profissionais de saúde com esquema vacinal completo.
- () Em relação à vacinação de profissionais lotados em serviços de saúde, considerar antecipar reforço para cinco anos após a última dose de vacina especialmente para profissionais da neonatologia, pediatria e os que lidam com pacientes pneumopatas.
- () A vacinação é indicada para todas as categorias profissionais por ser a maior causa de absenteísmo no trabalho e pela grande frequência com que desencadeia surtos no ambiente de trabalho.
- () Está indicada a vacinação para todos os profissionais de saúde susceptíveis, em duas doses, com intervalo de um a dois meses.
- () A vacina está indicada aos profissionais de saúde em três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (D) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (E) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

21. Assinale a afirmação **INCORRETA** em relação aos transtornos mentais.

- (A) Retardo psicomotor está presente em alguns casos graves de depressão.
- (B) Presença de ideação suicida em um quadro depressivo confirma diagnóstico de mania.
- (C) Hipervigilância, pesadelos e imagens intrusivas estão presentes em quadros de transtorno de estresse pós-traumático.
- (D) Medo de ficar em ambientes onde se supõe ser difícil escapar caracteriza agorafobia.
- (E) Transtorno de ansiedade generalizada pode apresentar sintomas cardiológicos e neurológicos variados.

22. Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade, é correto afirmar que:

- (A) o tratamento com antibióticos deve aguardar o resultado dos exames culturais.
- (B) o antibiótico indicado para pacientes saudáveis e que não tenham usado antibiótico nos últimos três meses é uma fluoroquinolona respiratória.
- (C) indica-se internação para todos os pacientes que apresentem como comorbidade, insuficiência renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica ou alcoolismo.
- (D) o raio X de controle é indicado após sete dias de tratamento.
- (E) a vacinação para pneumococo, no paciente imunocompetente, é útil para prevenção ou diminuição da severidade da infecção.

23. São causas de hipertensão arterial sistêmica, as doenças abaixo, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Doença renal crônica
- (B) Apneia do sono
- (C) Hiperaldosteronismo primário
- (D) Síndrome de Liddle
- (E) Hipocalcemia

24. Em relação à asma brônquica, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Os corticosteroides são agentes anti-inflamatórios potentes, com efeito tanto na fase aguda como crônica da doença, o que resulta no aumento do fluxo respiratório.
- () Indica-se vacinação anual contra gripe para todos os pacientes. A vacina antipneumocócica está indicada após pneumonia prévia ou presença de outras comorbidades.
- () Exacerbações severas de asma devem receber oxigenioterapia imediatamente.
- () Doença do refluxo gastroesofágico, obesidade e rinosinusites são condições comórbidas que dificultam o manejo da asma.
- () Cromoglicato dissódico pode melhorar a função respiratória de pacientes com asma induzida pelo exercício físico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – V – F.

25. Sobre litíase ureteral, é correto afirmar que:

- (A) hiper-hidratação parenteral é indicada para facilitar o processo de descida do cálculo.
- (B) tansulosina, associada a corticosteroide em doses altas, pode ser usada para facilitar a eliminação do cálculo.
- (C) os impedimentos à descida do cálculo ureteral ocorrem em três locais distintos: junção pelviureteral, cruzamento do ureter com vasos ilíacos e junção ureterovesical.
- (D) é indicado prescrever butilbrometo de escopolamina como primeira opção analgésica.
- (E) pacientes com cálculos ureterais menores que 10mm não têm indicação de encaminhamento para urologista.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2019 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 17

MÉDICO I (Clínico: Medicina Ocupacional)

01.	C	11.	E	21.	B
02.	C	12.	A	22.	ANULADA
03.	D	13.	C	23.	E
04.	A	14.	D	24.	B
05.	A	15.	E	25.	C
06.	E	16.	B		
07.	A	17.	C		
08.	E	18.	D		
09.	D	19.	A		
10.	C	20.	E		