



**EDITAL Nº 01/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)**

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

**PS 07 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Hemodiálise)**

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Quem não tem cão, caça com gato.



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Com relação à elevação da pressão venosa do sistema de hemodiálise, considere os itens abaixo.

- I - Pressão alcançando níveis de até 250-280 mmHg, quando o acesso utilizado for enxerto arteriovenoso.
- II - Alto fluxo de sangue com utilização de agulha venosa relativamente pequena (16G).
- III- Coagulação da agulha venosa ou no ramo venoso do acesso vascular.
- IV - Estenose (ou espasmo) no ramo venoso do acesso vascular.

Quais apresentam causas para elevação da pressão venosa do sistema de hemodiálise?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

02. Segundo as Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica – Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde/2014, qual, dentre os fatores abaixo, **NÃO** é fator de risco para desenvolver a Doença Renal Crônica (DRC)?

- (A) Ser diabético, ser hipertenso, ser idoso.
- (B) Possuir histórico de doenças do aparelho circulatório e respiratório.
- (C) Possuir histórico de DRC na família.
- (D) Fazer uso de agentes nefrotóxicos, ser tabagista.
- (E) Ser obeso (IMC maior que 30kg/m²).

03. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as complicações relacionadas ao paciente durante a hemodiálise a seus respectivos sinais e sintomas.

- (1) Síndrome do desequilíbrio
- (2) Embolia gasosa
- (3) Hemólise
- (4) Reação pirogênica
- (5) Hipotensão

- () Afebril antes da diálise e febril durante a diálise.
- () Tonturas, atordoamento, redução do estado de alerta.
- () Náuseas, vômitos, inquietação e cefaleia.
- () Dorsalgia, opressão torácica e dispneia.
- () Dispneia, tosse, opressão torácica e arritmia.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- (C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- (D) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- (E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.

04. A Síndrome Urêmica é decorrente de efeitos tóxicos dos altos níveis sanguíneos de escórias nitrogenadas. Assinale a alternativa que descreve os sinais e sintomas que caracterizam essa Síndrome.

- (A) Náuseas e vômitos em jato, perda de apetite, mialgia, fraqueza, tremores, convulsões generalizadas e frequentes, confusão e coma.
- (B) Vômitos, principalmente, à noite, perda do apetite, polidipsia, poliúria, confusão mental e dor abdominal em cólicas.
- (C) Náuseas, principalmente, pela manhã, cansaço, fraqueza, confusão mental, poliúria, tremores, dores no corpo, mioclonia multifocal e coma.
- (D) Perda do apetite, polidipsia, poliúria, mialgia, cefaleia, asterixe, convulsões e coma.
- (E) Náuseas e vômitos logo após despertar, perda de apetite, cansaço, fraqueza, tremores, asterixe, mioclonia multifocal ou convulsões, confusão e coma.

05. Leia as considerações abaixo sobre os cuidados com a fístula arteriovenosa, conforme Veronese (2019), e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Realizar exame físico no acesso, seguindo os passos de inspeção, palpação e ausculta.
- () Fazer antissepsia em múltiplas direções no local a ser puncionado com gaze estéril e solução antiséptica.
- () Manter pelo menos 3 cm entre a punção arterial e a venosa.
- () Puncionar o ramo arterial a 1 cm da anastomose.
- () Retirar os curativos dos locais de punção após 24 horas do término da sessão de hemodiálise.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – V.
- (B) V – F – F – F – F.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) F – V – V – V – F.

06. Leia as considerações abaixo sobre os cuidados com cateteres para hemodiálise e assinale-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Deve-se realizar as trocas das tampas das vias arterial e venosa sempre que os lúmens do cateter forem manuseados.
- () Deve-se avaliar o local de implante do cateter ou ósteo, pelo menos, uma vez por semana, em busca de sinais flogísticos ou secreção.
- () Deve-se fixar os lúmens do cateter, evitando que eles fiquem tracionados ou deslocados do seu trajeto original.
- () Deve-se investir em orientações sistemáticas para pacientes e familiares sobre cuidados domiciliares com o cateter.
- () É permitido que o paciente deambule ou flexione as pernas com cateter duplo-lúmen de longa permanência ou tunelizado implantado em veias femorais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – F – F – F – F.
- (C) F – V – V – F – V.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) F – V – F – V – F.

07. Segundo Veronese (2019), entre as principais complicações após Transplante Renal encontram-se a _____ e as infecções, que são causas de morbidade e mortalidade nessa população. É importante que o paciente e a família reconheçam os sinais e sintomas de alerta, como _____, alterações urinárias e dor no local do enxerto.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) internação hospitalar – hiperglicemia
- (B) sessão de hemodiálise – febre
- (C) rejeição – dor na fístula arteriovenosa
- (D) câimbra – hiperpotassemia
- (E) rejeição – febre

08. Quanto aos principais sinais e sintomas das doenças renais, assinale a alternativa correta.

- (A) Oligúria, anúria, nictúria, urgência urinária, infecção do trato urinário, poliúria, edema de ocular e cólicas.
- (B) Anúria, oligúria, poliúria, disúria, polaciúria, hematúria, urgência miccional, edema e dor lombar.
- (C) Oligúria ou anúria, edema, hematúria, cefaleia, convulsões e coma.
- (D) Nictúria, urgência urinária, oligúria, edema generalizado e cefaleia frontal.
- (E) Poliúria, febre, hipertensão, glicemia capilar alterada, disúria, polaciúria, nictúria e noctúria.

09. Segundo Daugirdas (2016), o peso seco ou peso-alvo de um paciente em diálise é determinado, tendo como base alguns critérios clínicos. Considere a afirmação acima e assinale a alternativa que corresponde a critérios clínicos de avaliação do peso seco.

- (A) Volume de ultrafiltração e uso de sódio plasmático alto.
- (B) Hematócrito alto e uso de diuréticos.
- (C) Pressão arterial, edema e tolerância do volume de ultrafiltração até o peso escolhido.
- (D) Grande aumento de volume interdialítico e uso de anti-hipertensivos.
- (E) Edema generalizado e anemia severa.

10. As alternativas abaixo apresentam fatores que favorecem a coagulação do sistema extracorpóreo, **EXCETO** uma delas. Assinale-a.

- (A) Fluxo sanguíneo baixo.
- (B) Taxa de ultrafiltração alta.
- (C) Hematócrito baixo.
- (D) Recirculação do acesso.
- (E) Transfusão de sangue.

11. Com relação à ocorrência de reação tipo anafilactoide causada pela administração de ferro endovenoso, assinale a alternativa que apresenta os sintomas característicos desse tipo de reação.

- (A) Hipotensão, dispneia, rubor e dorsalgia.
- (B) Cefaleia imediata, dispneia e rubor de face.
- (C) Calor, hipertensão e dor torácica.
- (D) Tonturas, convulsão generalizada e coma.
- (E) Taquicardia, dor torácica intensa e fibrilação atrial.

12. A Diálise Peritoneal (DP) é uma modalidade que utiliza a membrana peritoneal para realizar trocas entre o sangue e a solução de diálise. Com relação a esse tema, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) O cateter mais comumente utilizado nessa modalidade é o cateter reto com dois *cuffs* chamado de Swan-Ganz.
- (B) A DP é um tratamento dialítico domiciliar, e seu sucesso depende, principalmente, do paciente e do seu cuidador, que precisam ser capazes de manter o tratamento.
- (C) As peritonites em DP permanecem como complicação importante e continuam sendo a causa mais frequente de falência desse método dialítico.
- (D) Peritonites, habitualmente, evoluem com efluente peritoneal turvo, dor abdominal, náuseas, vômitos e, menos frequentemente, com febre.
- (E) Na DP, comparativamente à hemodiálise, a anemia é menos prevalente.

13. Baseado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, "recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal" e "garantir a continuidade da assistência de Enfermagem" são, respectivamente:

- (A) deveres e direitos.
- (B) responsabilidades e proibições.
- (C) direitos e proibições.
- (D) direitos e deveres.
- (E) deveres e responsabilidades.

14. A Lei nº 7.498/86 regulamenta o exercício da Enfermagem. Sendo assim, cabe, especialmente, ao técnico de enfermagem:

- (A) realizar consulta de Enfermagem.
- (B) prescrever a assistência de Enfermagem.
- (C) realizar consultorias, auditorias e emissão de pareceres sobre matéria de Enfermagem.
- (D) prescrever medicamentos estabelecidos em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (E) participar da programação da assistência de Enfermagem.

15. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as ações abaixo, que orientam parâmetros para implementação de ações de humanização na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na atenção Hospitalar.

- () Implementar mecanismos de escuta para a população e para os trabalhadores.
- () Garantir locais para o acolhimento da população, com atuação da equipe multiprofissional.
- () Garantir a continuidade da assistência, com ativação de redes de cuidados para viabilizar a atenção integral.
- () Promover atividades de valorização e de cuidados aos trabalhadores de saúde, contemplando ações para promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.
- () Implementar mecanismos de hospitalização permanente, visando práticas de cuidados especializados e contínuos no ambiente hospitalar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V – V.
- (B) V – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) F – F – V – F – F.
- (E) V – V – F – F – V.

16. A Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Com relação a esse tema, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () O uso de luvas não substitui a lavagem de mãos, esta deve ocorrer somente após o uso das luvas.
- () Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- () Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo a desinfecção e fácil higienização.
- () Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte.
- () São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F – F.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

17. A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11, de 13 de março de 2014, dispõe sobre os Requisitos de Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras providências. Com relação a essa resolução, considere as afirmativas abaixo.

- I - O serviço de diálise deve dispor de normas, procedimentos e rotinas escritas e atualizadas.
- II - Deve-se verificar e registrar as características físicas e organolépticas da água potável, pelo menos, uma vez por semana.
- III- O serviço de diálise deve registrar no prontuário todas as informações referentes à evolução clínica e à assistência prestada ao paciente.
- IV - São obrigatórias, ao final de cada dia, a limpeza e a desinfecção da máquina de diálise.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III e IV.

18. Sobre higienização de mãos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A higienização de mãos influencia na segurança do paciente e é considerada uma prioridade em saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
- (B) As mãos são consideradas as principais vias de disseminação de infecções relacionadas à assistência de saúde.
- (C) A técnica de higienização das mãos torna-se inadequada na prática diária devido ao esquecimento de algumas etapas, pois os profissionais preocupam-se mais com a quantidade do que com a qualidade deste ato.
- (D) A adesão à higiene de mãos não é influenciada por comportamentos individuais dos profissionais.
- (E) Todos os profissionais de saúde devem conhecer e seguir os cinco momentos para a lavagem de mãos.

19. Infecções por germes multirresistentes (GMR) são frequentes, e sua disseminação deve ser evitada. Com relação a esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - Infecções por GMR aumentam o tempo de internação dos pacientes e elevam os custos hospitalares.
- II - Em caso de contato com paciente portador de *Clostridium difficile*, a higiene de mãos não deve ser realizada com solução alcoólica.
- III- Indica-se limpeza das superfícies em torno do paciente portador de GMR uma vez ao turno, dessa forma, ao tocar nessas superfícies, não é necessário uso de luvas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

20. Centros de diálise devem seguir algumas normas no que concerne ao controle de infecção e segurança do paciente. Neste contexto é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a cada troca de turno na hemodiálise deve-se realizar uma limpeza terminal no ambiente.
- (B) deve existir um sistema específico para tratamento de água destinada à hemodiálise, seguindo normas vigentes na legislação brasileira.
- (C) todo centro de diálise deve conter um Núcleo de Segurança ao Paciente.
- (D) pacientes com sorologia positiva para hepatite B (HbsAg+) devem ser atendidos por profissional exclusivo durante toda terapia.
- (E) pacientes em hemodiálise possuem risco para quedas.

21. O SARS-CoV-2 é um vírus identificado como causa de um surto de doença respiratória e possui uma alta e sustentada transmissibilidade entre as pessoas. Em relação às formas de transmissão da COVID-19, considere as afirmações abaixo.

- I - A transmissão pré-sintomática ocorre, em geral, 24 horas antes do início dos sintomas.
- II - É possível que pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 possam transmitir o vírus antes que sintomas significativos se desenvolvam.
- III- O SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por pessoas sintomáticas, e sua presença é mais alta no trato respiratório superior (nariz e garganta) no início do curso da doença.
- IV- A transmissão assintomática caracteriza-se pela confirmação laboratorial do SARS-CoV-2 em um indivíduo que não desenvolve sintomas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

22. A triagem realizada pelo profissional de saúde busca identificar sinais e sintomas sugestivos de diferentes patologias. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta sinal ou sintoma relacionado à COVID-19.

- (A) Febre.
- (B) Tosse.
- (C) Falta de ar.
- (D) Hipotensão.
- (E) Anosmia.

23. Baseado nas recomendações da Nota Técnica nº 04/2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a sequência correta da desparamentação realizada ainda dentro do quarto/box do paciente suspeito ou contaminado pelo novo Coronavírus é, respectivamente:

- (A) retirar luvas – higienizar as mãos – retirar avental.
- (B) retirar gorro – retirar luvas – higienizar as mãos.
- (C) retirar luvas – retirar avental – higienizar as mãos.
- (D) retirar avental – retirar luvas – higienizar as mãos.
- (E) retirar luvas – higienizar as mãos – retirar gorro.

24. Em relação às Orientações para Serviços de Diálise contidas na Nota Técnica nº 04/2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Deve-se reforçar aos pacientes e aos profissionais de saúde as instruções sobre a higiene das mãos, higiene respiratória/etiqueta da tosse.
- () Pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus devem, preferencialmente, ser dialisados em uma sala separada, bem ventilada e com a porta aberta.
- () Deve-se fazer a coorte de profissionais para o atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus.
- () Deve-se manter a distância mínima de dois metros entre as instalações que serão utilizadas para o tratamento.
- () Deve-se disponibilizar máscaras de tecido para aqueles pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V – F.

25. Sobre a temática de Prevenção de Quedas, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Depressão ou ansiedade não são fatores de risco para queda de pacientes.
- () A prevenção de quedas compreende uma das metas internacionais de segurança do paciente.
- () A escala de Morse pode ser utilizada para avaliar o risco de quedas nos pacientes.
- () A mudança no estado de volume hídrico pode expor o paciente em diálise a maior risco de quedas, se comparado à população em geral.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – F – F.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 07

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Hemodiálise)

01.	E	11.	A	21.	E
02.	B	12.	A	22.	D
03.	A	13.	D	23.	C
04.	E	14.	E	24.	B
05.	B	15.	B	25.	A
06.	D	16.	A		
07.	E	17.	C		
08.	B	18.	D		
09.	C	19.	D		
10.	C	20.	A		